

تم تحميل وعرض المادة من :



# موقع واجباتي

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترقي بمعجال التعليم على الإنترت ويستطيع الطالب تصفح حلول الكتب مباشرة لجميع المراحل التعليمية المختلفة



حمل التطبيق من هنا



قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# الكيمياء ٣

التعليم الثانوي - نظام المسارات  
السنة الثالثة

قام بالتأليف والمراجعة  
فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولابدّ

طبعة 2023-1445

ح) وزارة التعليم ، 1444هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم

الكيمياء 3. / وزارة التعليم. - الرياض ، 1444هـ .

ص 178؛ 21×27 سم

ردمك : 978-603-511-329-8

1- الكيمياء - تعليم - السعودية 2- التعليم الثانوي - السعودية -  
كتب دراسية. أ. العنوان

1444 /2767

ديوی 540,712

رقم الإيداع : 1444/2767

ردمك : 978-603-511-329-8

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:  
يسعدنا تواصلكم: لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## المخاطر والاحتياطات اللازم مراعاتها

العلاج	الاحتياطات	الأمثلة	المخاطر	رموز السلامة
تخلص من المخلفات وفق تعليمات المعلم.	لا تتخلص من هذه المواد في المفسلة أو في سلة المهملات.	بعض المواد الكيميائية، والمخلفات الحية.	مخلفات التجربة قد تكون ضارة بالإنسان.	 التخلص من المخلفات
أبلغ معلمك في حالة حدوث ملامسة للجسم، واغسل يديك جيداً.	تجنب ملامسة الجلد لهذه المادة، وارتد كمامه وقفازين.	البكتيريا، الفطريات، الدم، الأنسجة غير المحفوظة، المواد النباتية.	مخلفات ومادة حية قد تسبب ضرراً للإنسان.	 ملوثات حيوية بيولوجية
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	استعمال قفازات واقية.	غليان السوائل، السخانات الكهربائية، الجليد الجاف، التيتروجين السائل.	الأشياء التي قد تحرق الجلد بسبب حرارتها أو بروقتها الشديدة.	 درجة الحرارة المؤذية
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	تعامل بحكمة مع الأداة، واتبع إرشادات استعمالها.	المقصات، الشفرات، السكاكين، الأدوات المدببة، أدوات التسريح، الزجاج المكسور.	استعمال الأدوات والزجاجيات التي تخرج الجلد بسهولة.	 الأجسام الحادة
اترك المنطقة، وأخبر معلمك فوراً.	تأكد من وجود تهوية جيدة، ولا تشم الأبخرة مباشرة، وارتد كمامه.	الأمونيا، الأستون، الكبريت الساخن، كرات العث (النفاثتين).	خطر محتمل على الجهاز التنفسى من الأبخرة.	 الأبخرة الضارة
لا تحاول إصلاح الأعطال الكهربائية، واستعن بمعلمك فوراً.	تأكد من التوصيات الكهربائية للأجهزة بالتعاون مع معلمك.	تأريض غير صحيح، سوائل منسكية، تماس كهربائي، أسلاك معراة.	خطر محتمل من الصعق الكهربائية أو الحريق.	 الكهرباء
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	ضع واقياً للفبار، وارتد قفازين، وتعامل مع المواد بحرص شديد.	حبوب اللقاح، كرات العث، سلك المواتين، ألياف الزجاج، برمنجنات البوتاسيوم.	مواد قد تبيح الجلد أو الغشاء المخاطي للقناة التنفسية.	 المواد المهيجة
اغسل المنطقة المصابة بالماء، وأخبر معلمك بذلك.	ارتد نظارة واقية، وقفازين، والبس معطف المختبر.	المبيضات مثل فوق أكسيد البيرودجين والأحماض، كحض الكبريت، القواعد كالأمونيا وهيدروكسيد الصوديوم.	المادة الكيميائية التي قد تتفاعل مع الأنسجة والمواد الأخرى وتتلفها.	 المواد الكيميائية
اغسل يديك جيداً بعد الانتهاء من العمل، واذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	اتبع تعليمات معلمك.	الزنبق، العديد من المركبات الفلزية، اليود، النباتات السامة.	مواد تسبب التسمم إذا ابتلعت أو استنشقت أو لمست.	 المواد السامة
أبلغ معلمك طلباً للإسعاف الأولي، واستخدم مطفأة الحريق إن وجدت.	تجنب مناطق اللهب عند استخدام الكيماويات.	الكحول، الكبروسين، الأستون، برمنجنات البوتاسيوم، الملابس، الشعر.	بعض الكيماويات يسهل اشتعالها باللهب، أو بالشرر، أو عند تعرضها للحرارة.	 مواد قابلة للاشتعال
أبلغ معلمك طلباً للإسعاف الأولي، واستخدم مطفأة الحريق إن وجدت.	اربط الشعر إلى الخلف (للطالبات)، ولا تلبس الملابس الفضفاضة، واتبع تعليمات المعلم عند إشعال اللهب أو إطفائه.	الشعر، الملابس، الورق، المواد القابلة للاشتعال.	ترك اللهب مفتوحاً يسبب الحريق.	 اللهب المشتعل
<b>غسل اليدين</b> اغسل يديك بعد كل تجربة بالماء والصابون قبل نزع النظارة الواقية.		<b>نشاط إشعاعي</b> يظهر هذا الرمز عند استعمال مواد مشعة.		<b>سلامة العين</b> يجب دائماً ارتداء نظارة واقية عند العمل في المختبر.
			<b>وقاية الملابس</b> يظهر هذا الرمز عندما تسبب المادة بقعاً أو حريقاً للملابس.	

## الإسعافات الأولية في المختبر

أخبر معلمك في الحال عن أي حوادث قد تقع، وعليك أن تكون على علم بما يلي:

- احتياطات السلامة في المختبر.
- كيف ومتى تبلغ عن حادث، أو إصابة أو جرح، أو مادة مسكونة.
- مكان صندوق الإسعافات الأولية ومستلزماتها، ومواقع كل من أجهزة إنذار الحرائق والهاتف ومكتب الممرض في المدرسة.

الموقف	الاستجابة الآمنة
الحرق	يُسكب عليها الماء البارد بغزاره .
الجرح والكدمات	اتباع التعليمات والإرشادات الموجودة في صندوق الإسعافات الأولية.
الصدمات الكهربائية	تزويد الشخص بالهواء المنعش، وتمديد الشخص المصاب في وضع يكون فيه الرأس منخفضاً عن باقي الجسم، وإجراء عملية التنفس الاصطناعي إذا كان ضرورياً.
الإغماء أو الانهيار	ارجع إلى الإستجابة في موقف الصدمة الكهربائية.
الحرق	إغلاق جميع مصادر اللهب وإغلاق صناییر الغاز، ولف المصاب ببطانية الحرائق، استعمال طفاعة الحرائق لإخماد النار. لا يجب استخدام الماء لإطفاء الحرائق؛ لأن الماء يتفاعل مع المواد المحترقة، مما يتسبب في ازدياد الحرائق.
مادة مجهولة في العين	غسل العين بالماء النظيف.
التسمم	معرفة العامل المسبب للتسمم، وإبلاغ المعلم للقيام باللازم.
النزف الشديد	الضغط على الجرح لوقف النزيف، وطلب المساعدة الطبية في الحال.
المواد المسكونة	غسل المنطقة المصابة بكمية كبيرة من الماء.

# المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه  
أجمعين، وبعد:

يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق أحد التزامات رؤية المملكة العربية السعودية (2030) وهو: "إعداد مناهج تعليمية متطرفة ترتكز على الممارسات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية"، وذلك من منطلق تطوير التعليم وتحسين مخرجاته ومواكبة التطورات العالمية على مختلف الصعد.

ويأتي كتاب الكيمياء 3 لنظام المسارات السنة الثالثة في التعليم الثانوي داعماً لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) نحو الاستثمار في التعليم "عبر ضمان حصول كل طالب على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة"، بحيث يكون الطالب فيها هو محور العملية التعليمية. والكيمياء فرع من العلوم الطبيعية يتعامل مع بنية المادة ومكوناتها وخصائصها النشطة. ولأن المادة هي كل شيء يشغل حيزاً في الفراغ وله كتلة، إذن فالكيمياء تهتم بدراسة كل شيء يحيط بها، ومن ذلك السوائل التي نشربها، والغازات التي تنفسها، والمواد التي يتكون منها جهازنا الخلوي، وطبيعة الأرض تحت أقدامنا. كما تهتم بدراسة جميع التغيرات والتحولات التي تطرأ على المادة. فالنفط الخام يحول إلى منتجات نفطية قابلة للاستخدام بطرق كيميائية، وكذلك تحويل بعض المنتجات النفطية إلى مواد بلاستيكية. والمواد الخام المعdenية يستخلص منها الفلزات التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة، وفي صناعة السيارات والطائرات. والأدوية المختلفة تستخلص من مصادر طبيعية ثم تفصل وتركب في مختبرات كيميائية. ويتم في هذه المختبرات تعديل مواصفات هذه الأدوية لتتوافق مع المواصفات الصيدلانية، وتلبى متطلبات الطب الحديث. وقد تم بناء محتوى كتاب الطالب بطريقة تتيح ممارسة العلم كما يمارسه العلماء، وجاء تنظيم المحتوى بأسلوب مشوق يعكس الفلسفة التي بنيت عليها سلسلة مناهج العلوم من حيث إتاحة الفرص المتعددة للطالب لممارسة الاستقصاء العلمي بمستوياته المختلفة، المبني والموجه والمفتوح. فقبل البدء في دراسة محتوى كل فصل من فصول الكتاب، يقوم الطالب بالاطلاع على الفكرة العامة للفصل التي تقدم صورة شاملة عن محتواه. ثم يقوم بتنفيذ أحد أشكال الاستقصاء المبني تحت عنوان التجربة الاستهلالية التي تساعده أيضاً على تكوين النظرة الشاملة عن محتوى الفصل. وتتيح التجربة الاستهلالية في نهايتها ممارسة شكل آخر من أشكال الاستقصاء الموجه من خلال سؤال الاستقصاء المطروح. وتتضمن النشاطات التمهيدية للفصل إعداد مطوية تساعده على تلخيص أبرز الأفكار والمفاهيم التي سيتناولها الفصل. وهناك أشكال أخرى من

النشاطات الاستقصائية الأخرى التي يمكن تنفيذها من خلال دراسة المحتوى، ومنها مختبرات تحليل البيانات، أو حل المشكلات، أو التجارب العملية السريعة، أو مختبر الكيمياء في نهاية كل فصل، الذي يتضمن استقصاءً مفتوحاً في نهايته، بما يعزز أيضاً مبدأ رؤية (2030) "نعمل لنعمل". وعندما تبدأ دراسة المحتوى تجد في كل قسم ربطاً بين المفردات السابقة والمفردات الجديدة، وفكرة رئيسة خاصة بكل قسم ترتبط مع الفكرة العامة للفصل. وتتجدد أدوات أخرى تساعدك على فهم المحتوى، منها ربط المحتوى مع واقع الحياة، أو مع العلوم الأخرى، وشرحًا وتفسيرًا للمفردات الجديدة التي تظهر مظللة باللون الأصفر، وتتجدد أيضًا أمثلة محلولة يليها مسائل تدريبية تعمق معرفتك وخبراتك في فهم محتوى الفصل. وتتضمن كل قسم مجموعة من الصور والأشكال والرسوم التوضيحية بدرجة عالية الوضوح تعزز فهمك للمحتوى. وتتجدد أيضًا مجموعة من الشرح والتفسيرات في هوامش الكتاب، ومنها ما يتعلق بالربط بمحاور رؤية (2030) وأهدافها الاستراتيجية، وبالمهن أو التمييز بين الاستعمال العلمي والاستعمال الشائع لبعض المفردات، أو إرشادات للتعامل مع المطوية التي تudedها في بداية كل فصل.

وقد وظفت أدوات التقويم الواقعي في مستويات التقويم بأنواعه الثلاثة، التمهيدي والتكتوني والختامي؛ إذ يمكن توظيف الصورة الافتتاحية في كل فصل بوصفها تقويمًا تمهدياً لتعريف ما يعرفه الطالب عن موضوع الفصل، أو من خلال مناقشة الأسئلة المطروحة في التجربة الاستهلالية. ومع التقدم في دراسة كل جزء من المحتوى تجد سؤالاً تحت عنوان «ماذا قرأت؟»، وتتجدد تقويمًا خاصًا بكل قسم من أقسام الفصل يتضمن أفكار المحتوى، وأسئلة تعزز فهمك لما تعلمت وما ترغب في تعلمه في الأقسام اللاحقة. وفي نهاية الفصل تجد دليلاً لمراجعة الفصل يتضمن تذكيراً بالفكرة العامة والأفكار الرئيسية والمفردات الخاصة بأقسام الفصل، وخلاصة بالأفكار الرئيسية التي وردت في كل قسم. ثم تجد تقويمًا للفصل في صورة أسئلة متنوعة تهدف إلى إتقان المفاهيم، وحل المسائل، وأسئلة خاصة بالتفكير الناقد، والمراجعة العامة، والمراجعة التراكمية، ومسائل تحدّ، وتقويمًا إضافيًّا يتضمن تقويم مهارات الكتابة في الكيمياء، وأسئلة خاصة بالمستندات تتبع بنتائج بعض التقارير أو البحوث العلمية. وفي نهاية كل فصل تجد اختباراً مقتنياً يهدف إلى تقويم فهمك للموضوعات التي قمت بتعلمها سابقاً.

والله نسأل أن يحقق الكتاب الأهداف المرجوة منه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقديمه وازدهاره.

# قائمة المحتويات

## دليل الطالب

9 ..... كيف تستفيد من كتاب الكيمياء؟

## الفصل 4

132 .....	الكيمياء الكهربائية .....
134 .....	4-1 الخلايا الجلوفانية .....
144 .....	4-2 البطاريات .....
154 .....	4-3 التحليل الكهربائي .....
159 .....	كيف تعمل الأشياء؟ منظم ضربات القلب .....

## الفصل 1

12 .....	المخاليط والمحاليل .....
14 .....	1-1 أنواع المخاليط .....
19 .....	1-2 تركيز محلول .....
29 .....	1-3 العوامل المؤثرة في الذوبان .....
38 .....	4-1 الخواص الجامعية للمحاليل .....
45 .....	في الميدان: مهن: كيميائي البيئة .....

## الملاحق

170 .....	المصطلحات .....
176 .....	الجدول الدوري .....

## الفصل 2

54 .....	الأحماض والقواعد .....
56 .....	2-1 مقدمة في الأحماض والقواعد .....
66 .....	2-2 قوة الأحماض والقواعد .....
72 .....	2-3 أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني .....
81 .....	2-4 التعادل .....
91 .....	الكيمياء من واقع الحياة: تفاعلات الأحماض والقواعد وعملية الخبز .....

## الفصل 3

102 .....	تفاعلات الأكسدة والاختزال .....
104 .....	1-3 الأكسدة والاختزال .....
113 .....	2-3 وزن معادلات الأكسدة والاختزال .....
121 .....	في الميدان: المهنة: محقق البحث الجنائي .....

# كيف تستفيد من كتاب الكيمياء؟

هذا الكتاب ليس كتاباً أدبياً أو رواية خيالية، بل يصف ظواهر ونظريات وقوانين وحقائق علمية، ويربطها بحياة الناس، وتطبيقات تقنية؛ لذا فأنت تقرؤه طلباً للعلم والمعلومات. وفيما يلي بعض الأفكار والإرشادات التي تساعدك على قراءته:

The image shows the cover of the first chapter of a chemistry textbook. The title 'المixالوط والمحاليل' (Mixtures and Solutions) is at the top. Below it is the number '1'. A large photograph of a tall building under construction is the background. Two circular insets highlight specific parts of the building: one showing a concrete mixer truck and another showing a fire at a construction site.

**المixالوط والمحاليل**

**1**

**Mixtures and Solutions**

**المixرة** **الناتجة** مخلخل المسوائل والغازات  
والماء العضلي التي تكون عالياً على المixالوط

**1-1 أنواع المخاليل** **المixالوط** إما متجلسة أو غير متجلسة.

**1-2 تركيز محلول** **المixرة** يمكن التغير من التركيز بدلاً من النسبة المئوية أو المولارات.

**1-3 العوامل المؤثرة في المixالوط** **المixة** يتأثر تركيز المحلول بعوامل منها الحرارة والضغط والقطبية.

**1-4 الخواص الجماعية للمخاليل** **المixرة** تتحدد الخواص الجماعية على عدد جسيمات المذاب في المحلول.

**حقائق كيميائية**

- يتبع حوالي 42-3% من الفولاذ ستونياً عن إعادة التدوير.
- المixالوط هو المكون الأساسي للفرولا، لكن يمكن إضافة عناصر منها النيكل والمنجنيز والكورن ولفافوروم والتجميد - بحسب الواردات الفولاذية.
- يتحمل المixالوط في مساحة المخاليل الأساسية ومواد البناء لتقويتها، وجعلها تحمل العوامل البيئية العادمة.
- يتبع نحو 6 بلايين متر مكعب من المخاليل الأساسية ستونياً، أي ما يعادل 1 متر مكعب لكل شخص سنتيًّا ( $1\text{m}^3$ ).

12

يبدأ كل فصل بتجربة استهلالية تقدم المادة التي يتناولها. نفذ التجربة الاستهلالية، لتكشف المفاهيم التي سيتناولها الفصل.

## لتحصل على رؤية عامة عن الفصل

- اقرأ عنوان الفصل للتعرف موضوعاته.
- تصفح الصور والرسوم والتعليقات والجدوال.
- ابحث عن المفردات البارزة والمظللة باللون الأصفر.
- أعمل مخططاً للفصل باستخدام العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية.

## قبل أن تقرأ

اقرأ كلاً من الفكرة **( العامة )** و **الفكرة** **( الرئيسة )** والتجربة **( الاستهلالية )**؛ فهي تزوحك بنظرة عامة تمهيدية لهذا الفصل.

لكل فصل  **فكرة ( عامة )** تقدم صورة شاملة عنه. ولكل قسم من أقسام الفصل  **فكرة ( رئيسة )** تدعم فكرته العامة.

### نشاطات تمهيدية

#### تجربة استهلالية

كيف تغير الطاقة عند تكوين المخاليل؟

تتغير الطاقة عند تكوين المخلخل بتجربة تأثير قوين: قوى التجاذب بين الجسيمات الذاتية في المحلول، وقوى التجاذب بين جسيمات الماء والذباب معاً. كيف يمكن ملاحظة هذا التغير؟



خطوات العمل

1. اقرأ بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية.

2. وزن 8 g من كلوريد الأمونيوم  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ، ثم ضعها في كأس 100 mL.

3. قس 30 mL من الماء بمixer مدرج سعته 50 mL، ثم أخفف الماء إلى  $\text{NH}_4\text{Cl}$  في الكأس، وحرك المحلول بسباق الترnik.

4. حمس أسفل الكأس من الخارج، وسجل ملاحظاتك.

5. كرر الخطوات 2-4 مستعملاً كلوريد الكالسيوم  $\text{CaCl}_2$  بدلاً من  $\text{NH}_4\text{Cl}$ .

6. خلص من المخاليل بسكها في المنسنة.

التحليل

1. قارن أي العينتين السابقتين كانت طاردة للحرارة، وأيها كانت ماءً؟

2. استنتج اكتساب الماء من واقع جياثك على عمليات ذوبان طاردة للحرارة، وأخرى ماءً؟

استفهام إذا أردت زيادة التفسير في درجة الحرارة، فأيها يجب إضافتها بكمية أكبر: الماء أم الملح؟ قس إجابتك.

# كيف تستفيد من كتاب الكيمياء؟

## عندما تقرأ

ستجده في كل قسم أداة تعمق فهمك للموضوعات التي ستدرسها، وأدوات أخرى لاختبار مدى استيعابك لها.

### الربط مع الحياة: يصف ارتباط المحتوى مع الواقع.

النسبة المئوية بدلالة الكتلة هي نسبة كتلة المذاب إلى كتلة محلوله، ويعبّر عنها بنسبة مئوية. وكتلة محلول هي مجموع كتلة المذاب والمذيب.

$$\text{النسبة المئوية بدلالة الكتلة} = \frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة محلول}} \times 100$$

أدخل معلومات من هذا القسم في ملوكيلتك.

مثال 1-1

حساب النسبة المئوية بدلالة الكتلة للساحفنة على تركيز كلوريد الصوديوم NaCl في حوض الأسماك، كما هو في ماء البحر، يجب أن يحتوي حوض الأسماك على 3.6 g NaCl لكل 100 g ماء. ما النسبة المئوية بدلالة الكتلة لكلوريد الصوديوم NaCl في محلول؟

١ تحويل المسألة

إن كتلة كلوريد الصوديوم في 100 g ماء معروفة، والنسبة المئوية بدلالة الكتلة هي نسبة كتلة المذاب إلى كتلة محلول (التي هي مجموع كتلة المذاب والمذيب معاً).

المطلوب  
النسبة المئوية = ?

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة محلول}} \times 100$$

٢ حساب المطلوب

$$\text{كتلة محلول} = \text{كتلة المذاب} + \text{كتلة الماء}$$

$$\text{موض عن كتلة الماء} = 100.0 \text{ g} - 3.6 \text{ g} = 96.4 \text{ g}$$

$$\text{احسب النسبة المئوية المنشورة بدلالة الكتلة}$$

$$\text{اكتب معادلة النسبة المئوية بدلالة الكتلة}$$

$$\text{النسبة المئوية بدلالة الكتلة} = \frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة محلول}} \times 100$$

$$= \frac{3.6 \text{ g}}{103.6 \text{ g}} \times 100 = 3.5\%$$

٣ تقويم الإجابة

تكون النسبة المئوية بدلالة الكتلة صغيرة؛ لأن كتلة كلوريد الصوديوم الذائبة في 100 g ماء صغيرة.

مسائل تدريبية  
٩. ما النسبة المئوية بدلالة الكتلة لمحلول يحتوي على 20.0 g من كربونات الصوديوم الصيروجينية NaHCO<sub>3</sub> مذابة في 600.0 mL من الماء H<sub>2</sub>O؟

١٠. إذا كانت النسبة المئوية بدلالة الكتلة لمحلول كلوريد الصوديوم NaOCl في محلول مبيض الملابس هي 3.62%， وكان لديك 1500.0 g من محلول قي كتلة NaOCl في محلول؟

١١. ما كتلة المذيب في محلول المذكور في السؤال ١٠؟

١٢. تحضر النسبة المئوية لكتلة كلوريد الكالسيوم في محلول في محلول 50.0 g في كتلة محلول؟

### أنواع المخلوطات Types of Mixtures

الأهداف

٤ تعرّف أنواع المخلوطات غير المتجانسة أو غير متجانسة.

الربط مع الحياة إدامات كأساً زجاجياً به البحر فسوف تلاحظ أن بعض المواد تترسب في قاع الكأس، ويظل الماء مالحاً منها من الوقت. لماذا تترسب بعض المواد دون غيرها؟

٤ فقارن بين خصائص المخلوطات المعلقة والمخلوطات الغروية والمحاليل.

٤ تصف الفوائد الكهروستاتيكية الكيميائية، وأن المخلوط غير المتجانسة لا تترسب مكوناتها تماماً معًا، أي يمكن تمييز كل منها.

٤ هناك نوعان من المخلوطات غير المتجانسة، هما المعلق والغروي.

٤ المخلوط الغروي: مادة تسلوب في المذيب لتكون محلول.

٤ المخلوط المعلق: غروط غير متجانس عالي على جسيمات يمكن أن تترسب بالتزويق.

٤ وذلك يترك فترة دون غريزة. انظر الشكل ١-١؛ فالوحول الذي تشاهد **مخلوط معلق**.

٤ وعند تحرير المخلوط المعلق السائل خلال ورقة ترشيح فحصل الجسيمات المعلقة. وقد تفصل بعض المخلوط المعلقة إلى طبقتين وأصبحت إذا تركت قسيمة دون غريزة، حيث تتكون مادة شبه صلبة في القاع، وطبقات فوقها، ولكن عند تحرير المخلوط المعلق سرعان ما تبدأ المادة شبه الصلبة في الانسماخ، وكأنها سائل، وهناك أنواع من العيون تتحول إلى مادة شبه صلبة بسرعة: استجابة للheat أو الحرارة، وهي تستخدم في مناطق الزلازل الأرضية، فتشهد المانيا فوقها.

٤ المفردات الجديدة

٤ المخلوط المعلق

٤ المخلوط الغروي

٤ الحركة البراونية

٤ تأثير تبدل المادة الذاتية

٤ المادة غير الذاتية

٤ الشكل ١-١ يمكن فصل المخلوط المعلق إذا ترك دون تحرير فترة من الزمن، أو فصله بالترشيح.



١٤

## مهارات قرائية

- ٠ أسأل نفسك: ما الفكرة العامة؟ وما الرئيسي؟
- ٠ اربط المعلومات التي درستها في هذا الكتاب مع المجالات العلمية الأخرى.
- ٠ توقع أحداً ونتائج من خلال توظيف المعلومات التي تعرفها من قبل.
- ٠ غير توقعاتك وأنت تقرأ وتجمع معلومات جديدة.

10

٢٠

# كيف تستفيد من كتاب الكيمياء؟

## بعدما قرأت

اقرأ الخلاصة، وأجب عن الأسئلة لتقويم مدى فهمك لما درسته.

### التفويم 1-1

1. صفات خصائص المحلول مستخدماً ماء البحر كمثال.
2. مزيج بين المخلوط الغروي والمخلوط المعلن.
3. جملة الأنواع المختلفة للمحاليل.
4. فسر مستخدماً تأثير تبادل، لماذا تكون قيادة السيارات خلال أجواء الصباب باستخدام الأشوار العالية أصعب منقيادة باستخدام الأشوار المخففة؟
5. اذكر الأنواع المختلفة للمحلول الغروي.
6. فسر لماذا تغير جسيمات المثاب في المخلوط الغروي متشربة فيه؟
7. تفسّر ما الذي يسبب الحركة البراونية؟
8. قارن بين جدولًا تقارن فيه بين خصائص المخلوط المعلن والمخلوط الغروي والمحلول.
9. يمكن أن يكون المثاب في المحلول غازاً أو سائلًا أو صلبةً.

يختتم كل قسم بتفوييم يحتوي على خلاصة وأسئلة.  
الخلاصة تراجع المفاهيم الرئيسية، بينما تختبر الأسئلة  
فهمك لما درسته.

18

ستجد في نهاية كل فصل دليلاً للمراجعة متضمناً  
المفردات والمفاهيم الرئيسية. استعمل هذا الدليل  
للمراجعة وللتتأكد من مدى استيعابك.

## طرائق أخرى للمراجعة

### • اكتب الفكرة (العامة).

### • اربط الفكرة (الرئيسية) مع الفكرة (العامة)

- استعمل كلماتك الخاصة لتوضح ما قرأت.
- وظف المعلومات التي تعلمتها في المنزل، أو في موضوعات أخرى تدرسها.
- حدد المصادر التي يمكن أن تستخدمها للبحث عن مزيد من المعلومات حول الموضوع.

### دليل مراجعة الفصل

1

الفكرة العامة: معلم السائل والغازات والمادة المعلنة التي تكون عالياً مخلوط.

#### 1-1 أنواع المحلول

- الفكرة: المحلول يتألف من مكونات المخلوط غير المتجانسة.
- يمكن تغيير مكونات المخلوط غير المتجانس.
  - هناك نوعان من المخلوط غير المتجانسة، هما المعلن والغروي.
  - الحركة البراونية حركة عشوائية لجزيئات المخلوط الغروي.
  - ظهور المخلوط الغروي والمعلنة تأثير تبادل.
  - قد يوجد محلول في إحدى الحالات السائلة أو الغازية أو الصلبة، اعتماداً على الحالة الفيزيائية للمحلول.
  - يمكن أن يكون المثاب في المحلول غازاً أو سائلاً أو صلبةً.

#### 1-2 تركيز المحلول

- الفكرة: يمكن التعبير عن التركيز بدالة النسبة المئوية أو المولات.
- يقيس التركيز كثافة ونوعاً.
  - الولاية هي عدد مولات المثاب في 1L من المحلول.
  - الولاية هي نسبة عدد مولات المثاب في 1 kg من المثاب.
  - عدد المولات قبل التخفيف = عدد المولات بعد التخفيف  $M_1V_1 = M_2V_2$ .

#### 1-3 العوامل المؤثرة في الذوبان

- الفكرة: يتأثر تكون المحلول بعوامل، منها الطارة والضغط والقطبية.
- تضمن عملية الذوبان إحداث جسيمات المذيب جسيمات المذاب.
  - يمكن المحلول غير مثبت أو مثبت أو فوق مثبت.
  - يمكن قانون هنري على أن ذائبة الغاز في سائل تتناسب طردياً مع ضغط الغاز فوق السائل عند درجة حرارة معينة.

#### 1-4 الخواص الجماعية للمحاليل

- الفكرة: تتحدد الخواص الجماعية على عدد الأفكار الرئيسية.
- تجعل المادة المذابة غير المتطابقة الضغط البخاري للمحلول.
  - يرتبط الانفاس في درجة الغليان مباشرةً بسولالية المحلول.
  - يمكن التناقض في درجة التجمد للمحلول أقل من درجة تجمد المذيب.
  - يعتمد الضغط الأسموزي على عدد جسيمات المذاب في سحجم معين.
  - الانفاس في درجة الغليان = الضغط الأسموزي.

47

# المixاليط والمحاليل

## Mixtures and Solutions



**الفكرة العامة** معظم السوائل والغازات والمواد الصلبة التي تكون عالمنا مخاليط.

### 1-1 أنواع المخاليط

**الفكرة الرئيسية** المخاليط إما متجانسة أو غير متجانسة.

### 1-2 تركيز المحلول

**الفكرة الرئيسية** يمكن التعبير عن التركيز بدالة النسبة المئوية أو المولات.

### 1-3 العوامل المؤثرة في الذوبان

**الفكرة الرئيسية** يتأثر تكون المحلول بعوامل، منها الحرارة والضغط والقطبية.

### 1-4 الخواص الجامعة للمحاليل

**الفكرة الرئيسية** تعتمد الخواص الجامعة على عدد جسيمات المذاب في المحلول.

## حقائق كيميائية

- يتوج حوالي 42.3% من الفولاذ سنويًا عن إعادة التدوير.
- الحديد هو المكون الأساسي للفولاذ، لكن يمكن إضافة عناصر - منها النيكل والمنجنيز والكروم والفناديوم والتنجستون - بحسب المواصفات المطلوبة.
- يستعمل الأسمنت في صناعة الخلطات الأساسية ومواد البناء لقويتها، وجعلها تحمل العوامل البيئية العادمة.
- يتوج نحو 6 بلايين متر مكعب من الخلطات الأساسية سنويًا، أي ما يعادل 1 متر مكعب ( $1m^3$ ) لكل شخص سنويًا.



## نشاطات تمهيدية

التركيز اعمل المطوية  
الآتية لتساعدك على تنظيم  
المعلومات حول تراكيز  
المحاليل.

### المطويات

منظمات الأفكار

الورقة الأولى



الورقة الثانية

**الخطوة 1** اطرو ورقتين  
من المتصرف أفقياً.

**الخطوة 2** اقطع 3 cm  
على طول خط الثاني  
لأحدى الورقتين من كلا  
الجانبين. وقص الورقة  
الثانية على طول خط  
الثاني أيضاً من وسطها مع  
ترك 3cm من كلا  
الجانبين دون قص.

**الخطوة 3** أدخل  
الورقتين إحداهم في  
الأخرى لعمل كتاب  
من أربع صفحات.



### المطويات استعمل هذه المطوية مع القسم 1-2

في أثناء قراءتك لهذا القسم، استعمل المطوية لتسجيل  
ما تعلمته عن طرائق التعبير عن تراكيز المحاليل،  
مستعيناً بأمثلة حسابية.



## تجربة استهلاكية

### كيف تتغير الطاقة عند تكوين المحاليل؟

تغير الطاقة عند تكوين محلول نتيجة تأثير قوتين: قوى التجاذب بين الجسيمات الذائبة في محلول، وقوة التجاذب بين جسيمات المذاب والمذيب معاً. كيف يمكن ملاحظة هذا التغيير؟



### خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. زن 10 g من كلوريد الأمونيوم  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ، ثم ضعها في كأس سعتها 100 mL.
3. قس 30 mL من الماء بمخار مدرج سعته 50 mL، ثم أضف الماء إلى  $\text{NH}_4\text{Cl}$  في الكأس، وحرك محلول بساق التحرير.
4. تحسس أسفل الكأس من الخارج، وسجل ملاحظاتك.
5. كرر الخطوات 4-2 مستعملاً كلوريد الكالسيوم  $\text{CaCl}_2$  بدلاً من  $\text{NH}_4\text{Cl}$ .
6. تخلص من المحاليل بسكبها في المغسلة.

### التحليل

1. قارن أي العمليتين السابقتين كانت طاردة للحرارة، وأيهما كانت ماصة لها؟
2. استنتاج اكتب أمثلة من واقع حياتك على عمليات ذوبان طاردة للحرارة، وأخرى ماصة لها.

استقصاء إذا أردت زيادة التغيير في درجة الحرارة، فأيهما يجب إضافته بكمية أكبر: المذاب أم المذيب؟ فسر إجابتك.

الحل بالصفحة التالية



## نشاطات تمهيدية

### التحليل

1. قارن أي العمليتين السابقتين كانت طاردة للحرارة، وأيهما كانت ماصة لها؟

يدوب كلوريد الكالسيوم معطياً طاقة ويدوب كلوريد الأمونيوم ماصاً طاقة

2. استنتاج اكتب أمثلة من واقع حياتك على عمليات ذوبان طاردة للحرارة، وأخرى ماصة لها.

الكمادات الباردة والحرارة المستعملة للأغراض الطبية

استقصاءً إذا أردت زيادة التغير في درجة الحرارة، فأيهما يجب إضافته بكمية أكبر: المذاب أم المذيب؟ فسر إجابتك.

ستؤدي إضافة المذاب، إلى حد معين إلى تغير أكبر في درجات حرارة محلول.

# 1-1

## الأهداف

- تعرف أنواع المخالفط غير المتتجانسة والمخالفط المتتجانسة (المحاليل).
- قارن بين خصائص المخالفط المعلقة والمخالفط الغروية والمحاليل.

- تصف القوى الكهروستاتيكية في المخالفط الغروية.

## مراجعة المفردات

**المذاب**: مادة تذوب في المذيب لتكوين محلول.

## المفردات الجديدة

المخلوط المعلق  
المخلوط الغروي  
الحركة البراونية  
تأثير تندال  
المادة الذائبة  
المادة غير الذائبة

## أنواع المخالفط


**الفكرة الرئيسية** المخالفط إما متتجانسة أو غير متتجانسة.

**الربط مع الحياة** إذا ملأت كأساً زجاجية باء البحر فسوف تلاحظ أن بعض المواد تترسب في قاع الكأس، ويظل الماء مالحاً منها من الوقت. لماذا تترسب بعض المواد دون غيرها؟

### Heterogeneous Mixtures المخالفط غير المتتجانسة

لا بد أنك تتذكر أن المخلوط مزيج من مادتين نقيتين أو أكثر، تحفظ فيه كل مادة بخصائصها الكيميائية، وأن المخالفط غير المتتجانسة لا تمتزج مكوناتها تماماً معًا؛ أي يمكن تمييز كل منها. هناك نوعان من المخالفط غير المتتجانسة، هما المعلق والغروي.

**المخلوط المعلق** مخلوط غير متتجانس يحتوي على جسيمات يمكن أن تترسب بالترويق؛ وذلك بتركه فترة دون تحريك. انظر الشكل 1-1؛ فالوحل الذي تشاهده مخلوط معلق. وعند ترير المخلوط المعلق السائل خلال ورقة ترشيح تفصل الجسيمات المعلقة. وقد تنفصل بعض المخالفط المعلقة إلى طبقتين واضحتين إذا تركت فترة دون تحريك؛ حيث تتكون مادة شبه صلبة في القاع، وسائل فوقها، ولكن عند تحريك المخلوط المعلق سرعان ما تبدأ المادة شبه الصلبة في الانسياب، وكأنها سائل. وهناك أنواع من الطين تتحول إلى مادة شبه صلبة بسرعة؛ استجابة للهز أو الحركة، وهي تستخدم في مناطق الزلازل الأرضية، فتشيد المباني فوقها.



الشكل 1-1 يمكن فصل المخلوط المعلق إذا ترك دون تحريك فترة من الزمن، أو فصله بالترشيح.




أنواع المخاليط الغروية وأمثلة عليها			الجدول 1-1
التصنيف	مثال	الجسيمات المنتشرة	وسط الانتشار
صلب في صلب	الأحجار الكريمة الملونة	صلب	صلب
صلب في سائل	الدم، الجيلاتين	صلب	سائل
مستحلب صلب	الزبد، الجبن	سائل	صلب
مستحلب	الحليب، المايونيز	سائل	سائل
رغوة صلبة	الصابون الذي يطفو، حلوى الخطمي	غاز	صلب
* الهباء الجوي الصلب	الدخان، الغبار في الهواء	صلب	غاز
* الهباء الجوي السائل	الغيوم، الضباب، رذاذ مزيل العرق	سائل	غاز

**المخاليط الغروية** لأن أحجام جسيمات المخلوط المعلق أكبر كثيراً من أحجام جسيمات الوسط فإنها قد ترسب في المخلوط. ويسمى المخلوط غير المتجانس الذي يتكون من جسيمات متوسطة الحجم **المخلوط الغروي**. وتتراوح أقطار الجسيمات في المخلوط الغروي بين  $1\text{ nm}$  و  $1000\text{ nm}$ ، ولا ترسب. فعلى سبيل المثال، يعد الحليب مخلوطاً غروياً لا يمكن فصل مكوناته المتجانسة بالترويق أو الترشيح.


تسمى المادة الأكثر توافراً في المخلوط وسط الانتشار. وتصنف المخاليط الغروية تبعاً للحالة الفизيائية لكل من الجسيمات المنتشرة ووسط الانتشار. فالحليب مستحلب غروي؛ لأن الجسيمات المنتشرة السائلة تنتشر بين جسيمات وسط الانتشار السائل. ويظهر الجدول 1-1 وصف أنواع أخرى من المخاليط الغروية. تمنع الجسيمات المنتشرة من الترسب في المخاليط الغروية؛ وذلك لوجود مجموعات ذرية أو قطبية مشحونة على سطحها، تقوم بجذب المناطق الموجبة أو السالبة لجسيمات وسط الانتشار، فت تكون طبقات كهروستاتيكية حول الجسيمات، كما هو موضح في الشكل 2-1، مما يجعل الطبقات يتناول بعضها مع بعض عندما تصطدم الجسيمات المنتشرة معاً، لذا تبقى الجسيمات في المخلوط الغروي ولا ترسب.

وإذا تدخلنا في الطبقات الكهروستاتيكية فسوف تترسب الجسيمات المنتشرة في المخلوط الغروي. فعند تحريك مادة متأينة (إلكتروليتية) في مخلوط غروي مثلاً تتجمع الجسيمات المنتشرة معاً، وتتلف المخلوط الغروي. كما أن التسخين أيضاً يتلف المخلوط الغروي؛ لأن الحرارة تعطي الجسيمات المتصادمة طاقة حرارية كافية للتغلب على القوى الكهروستاتيكية، ثم ترسبها في المخلوط.

الشكل 2-1 تكون جسيمات الوسط طبقات مشحونة حول الجسيمات المنتشرة، حيث تتناول هذه الطبقات بعضها مع بعض، وتمنع الجسيمات المنتشرة من الترسب.



\* الهباء: مخلوط غروي يتكون من جسيمات دقيقة صلبة أو سائلة منتشرة في الهواء أو غاز آخر



(1) (2)

الشكل 3-1

تشتت الجسيمات في المخلوط الغروي الضوء كما يظهر في الشكل (2)، ولا يحدث ذلك في المحلول (شكل 1). ويسمى ذلك تأثير تندال. لذا ترى حزمة الضوء في المخلوط (2) الغروي.

حدد أى المخلوط الظاهر في الصورة غروي؟

المخلوط الذي يظهر في الكأس الأيمن في الصورة والذي تظهر فيه الحزمة الضوئية، هو المخلوط الغروي

تنتج الحركة البراونية عن تصادم جسيمات الوسط مع الجسيمات المنتشرة؛ بحيث تمنع هذه التصادمات الجسيمات المنتشرة من الترسب في المخلوط.

**ماذا قرأت؟** اشرح سببين لعدم ترسب جسيمات المخلوط الغروي.

**تنجذب جسيمات المذاب في المخلوط الغروي إلى المناطق الموجبة أو السالبة الشحنة لجسيمات المذيب التي تحتوي على مجموعات قطبية، هذا بالإضافة إلى منع الحركة البراونية**

### لجسيمات المخلوط الغروي من الترسب

تأثير تندال يظهر المخلوط الغروي المركز عادةً معتماً أو معكراً، ولكن المخلوط الغروي المخفف يظهر أحياناً صافياً كالمحاليل. وتبعد المخلوط الغروي المخففة كالمحاليل المتجانسة؛ لأن عدد الجسيمات المنتشرة فيها قليل جداً، إلا أنها تعمل على تشتيت الضوء، وتسمى هذه الظاهرة تأثير تندال. يُظهر الشكل 3-1 مرور حزمة من الضوء في خلال مخلوطين مجهولين. ويمكنك ملاحظة كيف تعمل الجسيمات المنتشرة في المخلوط الغروي على تشتيت الضوء.

وُتُظهر المخلوط المعلقة أيضاً تأثير تندال، أما المحاليل فلا يمكن أن تظهر هذه الظاهرة. كما يمكنك ملاحظة تأثير تندال عندما تشاهد مرور أشعة الشمس خلال الهواء المشبع بالدخان، أو مرور ضوء خلال الضباب. ويستخدم تأثير تندال في تحديد كمية الجسيمات المنتشرة في المخلوط المعلق.

### المخلوط المتجانسة Homogeneous Mixtures

لقد تعلمت سابقاً أن المحاليل مخلوطات متجانسة تحتوي على مادتين أو أكثر، تسمى المذاب والمذيب. والمذاب هو المادة التي تذوب. أما المذيب فهو الوسط الذي يذيب المذاب. ولا يمكنك التمييز بين المذاب والمذيب عند النظر إلى المحلول.

**أنواع المحاليل** لقد تعلمت أن معظم التفاعلات الكيميائية تحدث في المحاليل المائية، وهي المحاليل التي يكون فيها الماء مذيباً. فالماء أكثر المذيبات شيوعاً في المحاليل السائلة. وقد توجد المحاليل في أشكال مختلفة، وقد تكون المواد الذائبة في المحاليل غازية أو سائلة أو صلبة، اعتماداً على الحالة الفيزيائية للمذيب، كما هو موضح في الجدول 2-1. الهواء محلول غازي والمذيب فيه هو غاز النيتروجين. وقد تكون أسلاك تقويم الأسنان التي تضعها على أسنانك مصنوعة من النيترينول، وهو محلول صلب يتكون من التيتانيوم المذاب في النيكل، إلا أن معظم المحاليل تكون في الحالة السائلة.

**تكوين المحاليل** تسمى المادة التي تذوب في المذيب **المادة الذائبة**. فمثلاً ذوبان السكر في الماء حقيقة يمكن أن تكون قد تعلمتها من إذابة السكر في الماء لعمل

### الكيمياء في واقع الحياة

#### ظاهرة تندال



تشكل أشعة الشمس عند مرورها داخل الغيوم لوحة فنية رائعة الجمال بقدرة الله عز وجل. ويمكنك ملاحظة ظاهرة تندال عند مرور أشعة الشمس من خلال الهواء المشبع بالدخان أو من خلال الضباب أو الغيوم.



## مختبر تحليل البيانات

### تصميم تجربة

#### التفكير الناقد

1. حدد المتغيرات التي يمكن أن تستخدم للربط بين قدرة الضوء على المرور خلال السائل وعدد الجسيمات في المخلوط الغروي.
2. اربط بين المتغيرات التي استخدمتها في التجربة والعدد الحقيقي للجسيمات في المخلوط الغروي.
3. حلل ما احتياطات السلامة التي يجب اتخاذها؟
4. حدد المواد الازمة لقياس تأثير تندال، واختر تقنية لجمع أو تفسير البيانات.

#### الإجابة في الصفحة التالية

كيف يمكنك قياس التunkر؟ وضع هيئة المواصفات والمقاييس ماء الشرب مجموعة من المعاير والمواصفات لضمان سلامته. ومن المواصفات التي يتم مراقبتها التunkr، وهو مقياس لدرجة الضبابية في الماء، الناتجة عن المواد الصلبة المعلقة في الماء، والتي تكون مرتبطة غالباً مع التلوث ومع الفيروسات والطفيليات والبكتيريا. تأتي معظم هذه الجسيمات الغروية من التعرية، والنشاط الصناعي، وفضلات الإنسان، ونمو الطحالب، ومن الأسمدة، وتحلل المواد العضوية.

#### البيانات والملاحظات

يمكن استخدام تأثير تندال في قياس تعكر الماء. والهدف تصميم تجربة وتطوير مقياس لتفسير البيانات.

شراب محلّى كالشاي أو عصير الليمون. وتسمى المادتان السائلتان اللتان تذوب إحداهما في الأخرى بأي نسبةٍ المواد القابلة للامتزاج، ومنها مانع التجمد المذكور في الجدول 2-1. وتُسمى المادة التي لا تذوب في المذيب مادة غير ذاتية. فالرمل مثلاً لا يذوب في الماء. وتسمى السوائل التي تمتزج معًا فترة قصيرة عند خلطها، ثم تنفصل بعدها - السوائل غير الممتزجة. فالزيت مثلاً لا يمتزج مع الخل؛ أي أنَّ الزيت لا يذوب في الخل.

#### أنواع المحاليل وأمثلة عليها

الجدول 2-1

المذاب	المذيب	مثال	أنواع المحاليل
الأكسجين (غاز)	النيتروجين (غاز)	الهواء	غاز
ثاني أكسيد الكربون (غاز)	الماء (سائل)	ماء غازي	سائل
الماء (سائل)	الهواء الجوي (غاز)	الرطوبة	غاز
الإيثيلين جلايكول (سائل)	الماء (سائل)	مانع التجمد	سائل
كلوريد الصوديوم (صلب)	الماء (سائل)	ماء البحر	سائل
الزئبق (سائل)	الفضة (صلب)	ملغم الأسنان	صلب
الكربون (صلب)	الحديد (صلب)	الفولاذ	صلب



## التفكير الناقد

1. حدد المتغيرات التي يمكن أن تستخدم للربط بين قدرة الضوء على المرور خلال السائل وعدد الجسيمات في المخلوط الغروي.

أن كمية التعرّك تتساوى مع عدد نقاط الحليب المستخدمة في تكوين المخلوط الغروي، ومن ثم يكون المتغير المستقل هو تركيز الحليب في مخلوط الماء واللبن، كما يمكن أن تكون المسافة التي يمكن رؤيتها العلامة عندها أسفل المخارط المدرج هي المتغير التابع، أما العامل الضابط فهو الماء النقي.

2. اربط بين المتغيرات التي استخدمتها في التجربة والعدد الحقيقي للجسيمات في المخلوط الغروي.

يستطيع الطالب من خلال البحث تقدير عدد جزيئات البروتين في عينة لبن معيارية بالاعتماد على تركيبها، ويمكن بعد ذلك استقراء عدد جسيمات المخلوط الغروي عند كل تركيز من العينة

3. حلل ما احتياطات السلامة التي يجب اتخاذها؟

قد يذكر الطالب سلامة الماء، كما يمكن أن تتضمن الإجابات احتياطات السلامة، منها القفازات والنظارات لتجنب التعرض للملوثات المحتملة

4. حدد المواد الازمة لقياس تأثير تندال، واختر تقنية جمع أو تفسير البيانات.

قد تتضمن المواد الممكنة: اللبن، والماء، والمسطرة، والقطارة، والمخارط المدرج الذي في أسفله علامة ( لتحديد العمق الذي ينعدم عنده رؤية هذه العلامة )

1. **الفكرة الرئيسية** صف خصائص المحلول مستخدماً ماء البحر كمثال.

**أن ماء البحر يُعد مخلوطاً غير متجانس لوجود جسيمات الطين والأوساخ فيه، ويُعد مخلوطاً متجانساً لوجود المواد الذائبة.**

2. **ميّز بين المخلوط الغروي والمخلوط المعلق.**  
جسيمات المخلوط المعلق أكبر من جسيمات المخلوط الغروي، وتترسب جسيمات المخلوط المعلق، في حين لا تترسب جسيمات المخلوط الغروي.

3. **حدد الأنواع المختلفة للمحاليل.**  
تُعد المحاليل جميعها مخلوطات متجانسة تحتوي على مادتين أو أكثر. ويمكن أن يكون محلول سائلاً أو صلباً أو غازياً.  
 **وأنواع المحاليل مذكورة في الجدول 2-1 في الصفحة 17 من كتابك المدرسي.**

4. **فسر مستخدماً تأثير تندال، لماذا تكون قيادة السيارات خلال أحوال الضباب باستخدام الأنوار العالية أصعب من القيادة باستخدام الأنوار المنخفضة؟**

**تعطي الحزم الضوئية العالية مجالاً للرؤية أبعد على الطريق من الحزم الضوئية المنخفضة. ولأن الضباب يُشتت الضوء، تكون كمية الضوء الناتج عن الحزم الضوئية العالية لإنارة الطريق أقل من الضوء الناتج عن الحزم الضوئية المنخفضة، إضافة إلى أن الحزم الضوئية العالية تدخل مباشرة في الضباب، ومن ثم ينعكس معظمها في اتجاه السائق مما يزيد من صعوبة الرؤية.**

5. اذكر الأنواع المختلفة للمخاليط الغروية.

**ارجع إلى الجدول 1-1 في الصفحة 15 من كتابك المدرسي  
للاطلاع على أوصاف أنواع المخاليط الغروية.**

6. فسر لماذا تبقى جسيمات المذاب في المخلوط الغروي منتشرة فيه؟

**لا تترسب الجسيمات لأنها قطبية، أو تحيط بها طبقات مشحونة؛ مما يؤدي إلى تناحر هذه الطبقات معًا مانعة الجسيمات من الترسب أو الانفصال.**

7. لخص ما الذي يسبب الحركة البراونية؟

**تنتُج الحركة البراونية عن تصادم جسيمات المذاب والمذيب معًا.**

8. قارن كُوئن جدولًا تقارن فيه بين خصائص المخلوط المعلق والمخلوط الغروي والمحلول.

المخاليط المعلقة، والغروية، والمحاليل			
هل تُظهر ظاهرة تندال؟	هل ستترسب الجسيمات؟	حجم الجسيمات	
نعم	نعم	كبيرة (اختلاف كبير)	المخاليط المعلقة
نعم	لا	1 nm - 1000 nm	المخاليط الغروية
لا	لا	التدريج الذري (ذرة، أيون، وجزيء)	المحاليل

# 1-2

## الأهداف

- تصف التركيز باستعمال وحدات مختلفة.
- تحدد تركيز المحاليل.
- تحسب مولارية محلول.

## مراجعة المفردات

**المذيب:** المادة التي تذيب المذاب لتكوين محلول.

## المفردات الجديدة

التركيز

المولارية

المولالية

الكسر المولي

**الشكل 1-4** تعكس شدة اللون تركيز الشاي، فتركيز الشاي ذو اللون الغامق أعلى من تركيز الشاي ذي اللون الفاتح.



## تركيز محلول Solution Concentration

**الفكرة الرئيسية** يمكن التعبير عن التركيز بدالة النسبة المئوية أو بالمولات.

**الربط مع الحياة** هل تذوقت يوماً كأس شاي فوجده مُرّاً؟ إنك لكي تعدل طعمه سوف تقوم بإضافة السكر لتحليلته، أو تضيف الماء لتخفيقه. وما تقوم به في كلتا الحالتين هو تغيير تركيز الجسيمات المذابة في الماء.

### التعبير عن التركيز Expressing Concentration

يعد تركيز محلول مقياساً يعبر عن كمية المذاب الذائبة في كمية محددة من المذيب أو محلول. ويمكن التعبير عن التركيز وصفياً باستعمال كلمة "مركز" أو "خفف". لاحظ إبريق الشاي في الشكل 4-1؛ فأحد الإبريقين يحوي شاياً أكثر تركيزاً من الآخر. وعموماً يحتوي محلول المركز على كمية كبيرة من المذاب. فالشاي الغامق يحتوي على جسيمات شاي أكثر من الشاي الفاتح، والعكس صحيح؛ إذ يحتوي محلول المخفف على كمية أقل من المذاب؛ فالشاي الفاتح في الشكل 4-1 محلول مخفف يحتوي على جسيمات شاي أقل من الشاي الغامق.

وعلى الرغم من أن التعبير الوصفي عن التركيز مفيد، إلا أنه غالباً ما يتم التعبير عن التركيز كمياً. ومن أكثر التعبيرات الكمية عن التركيز شيئاًًا النسبة المئوية بالكتلة أو النسبة المئوية بالحجم أو التعبير عن التركيز بدالة المولات مستخدماً المولارية أو المولالية. وكل هذه الطرائق تعبر عن التركيز بوصفه نسبة بين كمية المذاب وبين كمية المذيب أو محلول كله. ويشمل الجدول 3-1 وصفاً لكل طريقة.

كيف يمكن تحديد الطريقة المستخدمة للتعبير عن تركيز محلول؟ يعتمد استعمال الطريقة على نوع محلول الذي يتم تحليله، فإذا كان أحد الكيميائيين مثلاً يعمل على تفاعل في محلول مائي فسوف يستعمل المولارية غالباً للتعبير عن تركيز محلول؛ لأنّه يحتاج إلى معرفة عدد الجسيمات المشاركة في التفاعل.

### نسب التركيز

### الجدول 3-1

النسبة	وصف التركيز
$\frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة محلول}} \times 100$	النسبة المئوية بدالة الكتلة
$\frac{\text{حجم المذاب}}{\text{حجم محلول}} \times 100$	النسبة المئوية بدالة الحجم
$\frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{حجم محلول (L)}} = M$	المولارية (التركيز المولاري)
$\frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{كتلة المذيب kg}}$	المولالية (التركيز المولالي)
$\frac{\text{عدد مولات المذاب أو المذيب}}{\text{عدد مولات المذاب + عدد مولات المذيب}}$	الكسر المولي



**النسبة المئوية بدلالة الكتلة** هي نسبة كتلة المذاب إلى كتلة محلول، ويعبّر عنها بنسبة مئوية. وكتلة محلول هي مجموع كتل المذاب والمذيب.

#### المطويات

أدخل معلومات من هذا القسم في مطويتك.

$$\text{النسبة المئوية بدلالة الكتلة} = \frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة محلول}} \times 100$$

#### مثال 1-1

حساب **النسبة المئوية بالكتلة** للمحافظة على تركيز كلوريد الصوديوم  $\text{NaCl}$  في حوض الأسماك، كما هو في ماء البحر، يجب أن يحتوي حوض الأسماك على  $3.6\text{ g NaCl}$  لكل  $100\text{ g}$  ماء. ما النسبة المئوية بدلالة الكتلة لكلوريد الصوديوم  $\text{NaCl}$  في محلول؟

#### 1 تحليل المسألة

إن كتلة كلوريد الصوديوم في  $100\text{ g}$  ماء معروفة. والنسبة المئوية بدلالة الكتلة هي نسبة كتلة المذاب إلى كتلة محلول (التي هي مجموع كتل المذاب والمذيب معاً).

#### المطلوب

النسبة المئوية = ?

#### المعطيات

كتلة المذاب  $3.6\text{ g} = \text{NaCl}$

كتلة المذيب  $100\text{ g} = \text{H}_2\text{O}$

#### 2 حساب المطلوب

أوجد كتلة محلول

كتلة محلول = كتلة المذيب + كتلة المذاب

عوض عن كتلة المذاب =  $100.0\text{ g}$ ، وكتلة المذيب =  $3.6\text{ g}$

احسب النسبة المئوية بدلالة الكتلة

اكتب معادلة النسبة المئوية بالكتلة

$$\text{النسبة المئوية بدلالة الكتلة} = \frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة محلول}} \times 100$$

عوض عن كتلة المذاب =  $3.6\text{ g}$ ، وكتلة محلول =  $103.6\text{ g}$

#### 3 تقويم الإجابة

تكون النسبة المئوية بدلالة الكتلة صغيرة؛ لأن كتلة كلوريد الصوديوم الذائبة في  $100\text{ g}$  ماء صغيرة.

#### مسائل تدريبية

9. ما النسبة المئوية بدلالة الكتلة لمحلول يحتوي على  $20.0\text{ g}$  من كربونات الصوديوم الهيدروجينية  $\text{NaHCO}_3$  مذابة في  $600.0\text{ mL}$  من الماء  $? \text{H}_2\text{O}$ ؟

10. إذا كانت النسبة المئوية بدلالة الكتلة هيبوكلوريت الصوديوم  $\text{NaOCl}$  في محلول مبيض الملابس هي  $3.62\%$ ، وكان لديك  $1500.0\text{ g}$  من محلول فما كتلة  $\text{NaOCl}$  في محلول؟

11. ما كتلة المذيب في محلول المذكور في السؤال 10؟

12. تحضير النسبة المئوية لكتلة كلوريد الكالسيوم في محلول هي  $2.62\%$ ، فإذا كانت كتلة كلوريد الكالسيوم المذابة في محلول  $50.0\text{ g}$  فما كتلة محلول؟

9. ما النسبة المئوية بدلالة الكتلة محلول يحتوي على 20.0 g من كربونات الصوديوم الهيدروجينية  $\text{NaHCO}_3$  مذابة في 600.0 mL من الماء  $\text{H}_2\text{O}$ ؟

**احسب كتلة محلول بالجرامات:**

$$600.0 \text{ mL H}_2\text{O} \times 1.0\text{g/mL} = 600.0\text{g H}_2\text{O}$$

**احسب النسبة المئوية بالكتلة:**

$$\frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة محلول}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية بالكتلة}$$

$$= \frac{20\text{g NaHCO}_3}{600\text{g H}_2\text{O} + 20\text{g NaHCO}_3} \times 100 = 3\%$$

10. إذا كانت النسبة المئوية بدلالة الكتلة هيبوكلوريت الصوديوم  $\text{NaOCl}$  في محلول مبيض الملابس هي 3.62%， وكان لديك 1500.0 g من محلول  $\text{NaOCl}$  فما كتلة  $\text{NaOCl}$  في محلول؟

$$3.62\% = \frac{\text{كتلة NaOCl}}{1500.0 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{كتلة NaOCl}}{1500.0 \text{ g}} = 54.3 \text{ g}$$

11. ما كتلة المذيب في محلول المذكور في السؤال 10؟

$$1500.0\text{g} - 54.3\text{g} = 1445.7\text{g}$$

12. تحفيز النسبة المئوية لكتلة كلوريد الكالسيوم في محلول هي 2.62%， فإذا كانت كتلة كلوريد الكالسيوم المذابة في محلول 50.0 g فما كتلة محلول؟

$$\frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة محلول}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية بالكتلة}$$

$$2.65\% = \frac{50\text{g CaCl}_2}{\text{كتلة محلول}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{كتلة محلول}}{50\text{g CaCl}_2} \times 100\% = 1886.79 \text{ g}$$

## الكيمياء في واقع الحياة

### الديزل الحيوي



يعد الديزل الحيوي وقوداً بديلاً نظيف الاحتراق، وهو ينتج عن موارد متتجدد مثل الزيوت النباتية، والدهون الحيوانية، ويستعمل في محركات الديزل مع القليل من التحسينات أو دونها. والديزل الحيوي سهل الاستعمال وقابل للتحلل الحيوي، وغير سام، ولا يحتوي على الكبريت أو المركبات الأромاتية (العطرية)، كما أنه لا يحتوي على النفط، ولكن يمكن مزجه مع ديزل "النفط" لتكوين الديزل الحيوي الممزوج؛ الذي يتكون من 20 % بالحجم ديزل حيوي و 80 % بالحجم ديزل من النفط.



**النسبة المئوية بدلالة الحجم** تصف عادة المحاليل التي يكون فيها المذيب والمذاب في الحالة السائلة. والنسبة المئوية بدلالة الحجم هي النسبة بين حجم المذاب إلى حجم محلول، ويعبر عنها بنسبة مئوية. وحجم محلول هو مجموع حجم المذاب وحجم المذيب. إن حسابات النسبة المئوية بدلالة الحجم تشبه حسابات النسبة المئوية بدلالة الكتلة.

$$\text{النسبة المئوية بدلالة الحجم} = \frac{\text{حجم المذاب}}{\text{حجم محلول}} \times 100$$

✓ **ماذا قرأت؟** قارن بين النسبة المئوية بدلالة الكتلة والحجم.

**النسبة المئوية بالكتلة هي مقارنة بين كتلة المذاب إلى الكتلة الكلية للمحلول، بينما النسبة المئوية بالحجم هي مقارنة بين حجم المذاب والحجم الكلي للمحلول**

### مسائل تدريبية

13. ما النسبة المئوية بدلالة الحجم للإيثانول في محلول يحتوي على 35 mL إيثانول مذاب في 155 mL ماء؟

14. ما النسبة المئوية بدلالة الحجم لکحول أیزوپروپیل في محلول يحتوي على 24 mL من کحول الأیزوپروپیل مذاب في 1.1 L من الماء؟

15. تحضير إذا استعمل 18 mL من الميثانول لعمل محلول مائي منه تركيزه 15% بالحجم، فما حجم محلول الناتج بالمللتر؟

**المولارية (التركيز المولاري) (M)** إن النسبة المئوية بدلالة الكتلة وبدلالة الحجم طريقتان من طرائق التعبير الكمي عن تركيز محلول. ومن أكثر الوحدات شيوعاً المولارية Molarity. هي عدد مولات المذاب الذائبة في لتر من محلول، وتعرف أيضاً بالتركيز المولاري. فتركيز لتر من محلول يحتوي على مول من المذاب هو 1.0 M، كما أن تركيز لتر من محلول يحتوي على 0.1 mol من المذاب هو 0.1 M. ولحساب مولارية محلول يجب معرفة حجم محلول باللتر وعدد مولات المذاب.

$$\text{المولارية } M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}}$$

✓ **ماذا قرأت؟** احسب التركيز المولاري لمحلول حجمه 1.0 L، يحتوي على 0.5 mol من المذاب. **التركيز المولاري هو 0.5 M**

13. ما النسبة المئوية بدلالة الحجم للإيثانول في محلول يحتوي على 35 mL إيثانول مذاب في 155 mL ماء؟

$$\frac{\text{حجم المذاب}}{\text{حجم محلول}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية بالحجم}$$

$$= \frac{35 \text{ mL}}{155 \text{ mL} + 35 \text{ mL}} \times 100\% = 18\%$$

14. ما النسبة المئوية بدلالة الحجم لـكحول أيزوبروبيل في محلول يحتوي على 24 mL من كحول الأيزوبروبيل مذاب في 1.1 L من الماء؟

$$\frac{\text{حجم المذاب}}{\text{حجم محلول}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية بالحجم}$$

$$= \frac{24 \text{ mL}}{24 \text{ mL} + 1100 \text{ mL}} \times 100\% = 2.1\%$$

15. تحضير إذا استعمل 18 mL من الميثanol لعمل محلول مائي منه تركيزه 15% بالحجم، فما حجم محلول الناتج بـالملتر؟

$$\frac{\text{حجم المذاب}}{\text{حجم محلول}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية بالحجم}$$

$$15\% = \frac{18 \text{ mL}}{x \text{ mL}} \times 100\%$$

$$x = 120 \text{ mL}$$



### مثال 1-2

**حساب المolarية** يحتوي  $100.5 \text{ mL}$  من محلول حقن الوريد على  $5.10 \text{ g}$  من سكر الجلوكوز  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ . ما مolarية هذا محلول، إذا علمت أن الكتلة المolarية للجلوكوز هي  $180.16 \text{ g/mol}$ ؟

#### ١ تحليل المسألة

لقد أعطيت كتلة الجلوكوز الذائبة في حجم من الماء، ومolarية محلول هي النسبة بين عدد مولات المذاب إلى حجم محلول باللتر.

**المطلوب**

تركيز محلول =  $M$  ؟

**المعطيات**

كتلة المذاب  $5.10 \text{ g} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

الكتلة المolarية للجلوكوز  $= \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

حجم محلول  $= 100.5 \text{ mL}$

#### ٢ حساب المطلوب

احسب عدد مولات  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

بتطبيق العلاقة الرياضية

عدد مولات المذاب = الكتلة (g) / الكتلة المolarية

$$= 5.10 \text{ g C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \left( \frac{1 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}{180.16 \text{ g C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \right)$$

$$= 0.0283 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$$

اقسم كتلة  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

على الكتلة المolarية

وتحول حجم محلول إلى وحدة لتر

اكتب معادلة

المolarية

$$= 100.5 \text{ mL} \left( \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \right) = 0.1005 \text{ L}$$

عوض عن عدد مولات المذاب =  $0.0283 \text{ mol}$

وحجم محلول =  $0.1005 \text{ L}$

$$M = \frac{0.0283 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}{0.1005 \text{ L}} = 0.282 \text{ M}$$

اقسم الأرقام والوحدات

#### ٣ تقويم الإجابة

ستكون قيمة المolarية صغيرة؛ لأن كتلة الجلوكوز الذائبة في محلول صغيرة.

**مسائل تدريبية**

16. ما مolarية محلول مائي يحتوي على  $40.0 \text{ g}$  من الجلوكوز  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  في  $1.5 \text{ L}$  من محلول؟

17. احسب مolarية محلول حجمه  $1.60 \text{ L}$  مذاب فيه  $1.5 \text{ g}$  من بروميد البوتاسيوم  $\text{KBr}$ .

18. ما مolarية محلول مبيض ملابس يحتوي على  $9.5 \text{ g NaOCl}$  لكل لتر من محلول؟

19. تحضير ما كتلة هيدروكسيد الكالسيوم  $\text{Ca(OH)}_2$  بوحدة  $\text{g}$  التي تلزم لتحضير محلول مائي منها حجمه  $1.5 \text{ L}$  وتركيزه  $0.25 \text{ M}$

### مهن في الكيمياء

**فنيو الصيدلة** يستعين الكثير من الصيادلة بالفنين لتحضير الأدوية المناسبة للوصفات الطبية. يقرأ هؤلاء الفنيون تحاليل وتقارير المريض والوصفات الطبية من أجل تحضير التركيز المناسب أو الجرعة المناسبة من الأدوية التي ستعطى للمريض.





16. ما مolarية محلول مائي يحتوي على 40.0 g من الجلوكوز  $C_6H_{12}O_6$  في 1.5 L من محلول؟

احسب عدد مولات ،  $C_6H_{12}O_6$

$$\text{mol } C_6H_{12}O_6 = 40.0 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{180.16 \text{ g}} = 0.222 \text{ mol}$$

احسب المolarية:

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}} \text{ المolarية}$$

$$= \frac{\text{mol } C_6H_{12}O_6}{1.5 \text{ L}} = \frac{0.222 \text{ mol}}{1.5 \text{ L}} = 0.148 \text{ M}$$

17. احسب مolarية محلول حجمه 1.60 L مذاب فيه 1.5g من بروميد البوتاسيوم KBr.

احسب عدد مولات ، KBr

$$\text{mol KBr} = 1.5 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{119.0 \text{ g}} = 0.0130 \text{ mol KBr}$$

احسب المolarية :

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}} \text{ المolarية}$$

$$= \frac{\text{mol KBr}}{1.60 \text{ L solution}} = \frac{0.0130 \text{ mol}}{1.60 \text{ L}} \\ = 8.13 \times 10^{-3} \text{ M}$$



18. ما مolarية محلول مبيض ملابس يحتوي على 9.5 g NaOCl لكل لتر من المحلول؟

احسب عدد مولات  $\text{NaOCl}$ :

$$\text{mol NaOCl} = 9.5 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{74.44 \text{ g}} = 0.13 \text{ mol}$$

احسب المolarية:

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم المحلول (L)}} = \frac{\text{المولارية}}{\text{حجم المحلول (L)}}$$

$$= \frac{\text{mol NaOCl}}{1.00L} = \frac{0.128 \text{ mol}}{1.00L} \\ = 0.128 \text{ M}$$

19. تحفيز ما كتلة هيدروكسيد الكالسيوم  $\text{Ca(OH)}_2$  بوحدة g التي تلزم لتحضير محلول مائي منها حجمه L 1.5 وتركيزه M 0.25؟

احسب عدد مولات  $\text{Ca(OH)}_2$ :


$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم المحلول (L)}} = \frac{\text{المولارية}}{\text{حجم المحلول (L)}}$$

$$0.25 \text{ M} = \frac{x \text{ mol Ca(OH)}_2}{1.5 \text{ L}}$$

$$x = 0.38 \text{ mol Ca(OH)}_2$$

احسب كتلة  $\text{Ca(OH)}_2$  بالجرامات:

$$0.38 \text{ mol Ca(OH)}_2 \times \frac{74.08 \text{ g}}{\text{mol}} = 28 \text{ g Ca(OH)}_2$$



**خطوة 1** تفاصيل المذاب وتناسب إلى دورق حجمي مناسب.



**خطوة 2** يذاب المذاب في دورق حجمي مناسب في أقل كمية من الماء المقطر.



**خطوة 3** يضاف الماء المقطر إلى المذاب حتى يصل مستوى المحلول إلى العلامة المحددة على الدورق.

**الشكل 5-1** يبيّن خطوات تحضير محلول كبريتات النحاس.

**فسر** لماذا لا يمكنك وضع 375 g من كبريتات النحاس مباشرة في 1.0 L من الماء لتحضير محلول تركيزه 1.5 M

**لأنها تؤدي إلى زيادة حجم المحلول عن الحجم المطلوب.**

**تحضير المحاليل القياسية** تستعمل في المختبر محاليل لها تراكيز محددة تسمى المحاليل القياسية، ومنها محلول حمض الهيدروكلوريك HCl الذي تركيزه 1M

كيف يمكنك تحضير محلول مائي حجمه 1L وتركيزه 1.50M من كبريتات النحاس CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O؟ يحتوي محلول CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O الذي تركيزه 1.5mol على الصيغة CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O مذابة في 1 L من المحلول. فإذا عرفت أن الكتلة المولية للمركب CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O هي 249.70 g/mol، وأن المحلول يحتوي على 1.50 mol من CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O، فتكون كتلته 374.55 g ويمكن تقريبها إلى 375 g، وهي كتلة يمكن قياسها بالميزان

$$\frac{1.50 \text{ mol CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}{1 \text{ mol CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} \times \frac{249.7 \text{ g CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}{1 \text{ mol CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = \frac{375 \text{ g CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}{1 \text{ L من المحلول}}$$

ولكن لا يمكنك إضافة 375 g CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O إلى 1.0 L من الماء للحصول على محلول تركيزه 1.5 M بهذه البساطة؛ تعمل CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O مثل المواد الأخرى، على زيادة حجم المحلول عن الحجم المطلوب. لذلك يجب استعمال كمية من الماء تقل عن 1.0 L للحصول على 1.0 L من المحلول، كما هو موضح في الشكل 5-1.

أحياناً نجري تجارب تتطلب استعمال كميات صغيرة من المحلول. فعلى سبيل المثال، قد تحتاج إلى 100 mL من 1.50 M CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O لإجراء إحدى التجارب. بالرجوع إلى تعريف المolarية، ومن خلال الحسابات السابقة نجد أنَّ محلول CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O الذي تركيزه 1.50 M يحتوي محلول CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O الذي تركيزه 1.5 M على 1.5mol من CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O مذابة في 1L من المحلول على 375 g من كبريتات النحاس المائية CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O.

يمكن استعمال هذه العلاقة بوصفها معامل تحويل لحساب كمية المذاب اللازمة لتجربتك.

$$100 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \times \frac{375 \text{ g CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}{1 \text{ L}} = 37.5 \text{ g CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$$

لذلك تحتاج إلى قياس 37.5 g CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O لعمل 100 mL من محلول تركيزه 1.5 M.

### مسائل تدريبية

20. ما كتلة CaCl<sub>2</sub> الذائبة في 1 L من محلول تركيزه 0.10 M؟

21. ما كتلة CaCl<sub>2</sub> اللازمة لتحضير 500.0 mL من محلول تركيزه 0.20 M؟

22. ما كتلة NaOH في محلول مائي حجمه 250 mL وتركيزه 3.0 M؟

23. تحضير ما حجم الإيثanol في 100.0 mL من محلول تركيزه 0.15 M، إذا

علمت أن كثافة الإيثanol هي 0.7893 g/mL

الإجابة في الصفحة التالية

؟ 0.10 M ما كتلة  $\text{CaCl}_2$  الذائبة في 1 L من محلول تركيزه

احسب عدد مولات :  $\text{CaCl}_2$

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}}$$

$$0.10 \text{ M} = \frac{(\text{mol CaCl}_2)}{1.0 \text{ L}}$$

$$\begin{aligned}\text{mol CaCl}_2 &= (0.10 \text{ M})(1.0 \text{ L}) = (0.10 \text{ mol/L})(1.0 \text{ L}) \\ &= 0.10 \text{ mol CaCl}_2\end{aligned}$$

احسب كتلة :  $\text{CaCl}_2$

~~$$\text{CaCl}_2 \text{ كتلة} = 0.10 \text{ mol CaCl}_2 \times \frac{110.98 \text{ g}}{\text{mol}} = 11 \text{ g}$$~~

؟ 0.20 M ما كتلة  $\text{CaCl}_2$  اللازمة لتحضير 500.0 mL من محلول تركيزه

احسب عدد مولات :  $\text{CaCl}_2$

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}}$$

$$0.20 \text{ M} = \frac{(\text{mol CaCl}_2)}{0.5 \text{ L}}$$

$$\begin{aligned}\text{mol CaCl}_2 &= (0.20 \text{ M})(0.5 \text{ L}) = (0.20 \text{ mol/L})(0.5 \text{ L}) \\ &= 0.10 \text{ mol CaCl}_2\end{aligned}$$

احسب كتلة :  $\text{CaCl}_2$

~~$$\text{CaCl}_2 \text{ كتلة} = 0.10 \text{ mol CaCl}_2 \times \frac{110.98 \text{ g}}{\text{mol}} = 11 \text{ g}$$~~



؟3.0 م كتلة NaOH في محلول مائي حجمه 250 mL و تركيزه M احسب عدد مولات NaOH :

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{حجم محلول (L)}}$$

$$3.0 M = \frac{(mol NaOH)}{0.250 L}$$

$$\begin{aligned} mol NaOH &= (3.0 M)(0.250 L) \\ &= (3.0 mol/L)(0.250 L) \\ &= 0.750 mol \end{aligned}$$

احسب كتلة NaOH :

$$\begin{aligned} NaOH \text{ كتلة} &= 0.75 mol NaOH \times \frac{40.00 g}{mol} \\ &= 3.0 \times 10^1 g \end{aligned}$$

23. تحفيز ما حجم الإيثanol في 100.0 mL من محلول تركيزه M 0.15، إذا علمت أن كثافة الإيثanol هي 0.7893 g/mL؟

احسب عدد مولات C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH :

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{حجم محلول (L)}}$$

$$0.15 M = \frac{(mol C_2H_5OH)}{0.1 L}$$

$$mol C_2H_5OH = 0.015 mol$$

احسب كتلة C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH :

$$0.015 mol C_2H_5OH \times \frac{46 g}{1 mol} = 69 g C_2H_5OH$$

احسب حجم C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH :

$$69 g C_2H_5OH \times \frac{1 mL}{0.7893 g} = 0.87 mL C_2H_5OH$$



الشكل 6-1 يمكن تخفيف المحلول المركز بإضافة كمية من المذيب. لاحظ أن عدد مولات المذاب لا يتغير عند تخفيف المحلول المركز.

**تخفيف المحاليل المولارية** تذكر أن المحاليل المركزة تحتوي على كمية كبيرة من المذاب. ويمكنك تحضير محلول أقل تركيزاً عن طريق تخفيف كمية من المحلول القياسي بإضافة المزيد من المذيب، إذ يزيد عدد الجسيمات التي تتحرك خلاها جسيمات المذاب، كما هو موضح في الشكل 6-1، ومن ثم يقل تركيز المحلول.

كيف يمكنك تحديد حجم المحلول القياسي اللازم تخفيفه؟

$$\text{المولارية } M = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{حجم المحلول (L)}} ,$$

عدد مولات المذاب = المولارية × حجم المحلول باللتر.

ولأن عدد مولات المذاب لا يتغير بالتخفيف فإن عدد مولات المذاب في المحلول قبل التخفيف يساوي عدد مولات المذاب بعد التخفيف.

وبالتعميّض عن عدد مولات المذاب بالمولارية مضمورة في حجم المحلول باللتر يمكن التعبير عن هذه العلاقة في معادلة التخفيف الآتية:

#### معادلة التخفيف

$M_1 V_1 = M_2 V_2$

$M$  = المولارية

$V$  = الحجم

حيث أن  $M_1$ : المولارية قبل التخفيف، و  $V_1$ : الحجم قبل التخفيف، و  $M_2$ : المولارية بعد التخفيف، و  $V_2$ : الحجم بعد التخفيف.

تمثل  $M_1$  و  $V_1$  المولارية وحجم المحلول القياسي. وتمثل  $M_2$  و  $V_2$  مولارية وحجم المحلول المخفف. يحتوي المحلول المركز قبل التخفيف على نسبة عالية من جسيمات المذاب بالنسبة إلى جسيمات المذيب، لاحظ أن هذه النسبة تقل بعد إضافة كمية أخرى من المذيب.

#### المفردات

مفردات أكاديمية

**مركز** Concentrated

يُخفف قليلاً

كأن نقول مثلاً:

أضفنا ماء أكثر إلى عصير

الليمون؛ لأنه مركز جداً....

**تحضير محلول قياسي** إذا كنت تعرف حجم وتركيز المحلول المطلوب تحضيره يمكنك حساب حجم المحلول القياسي الذي تحتاج إليه. ما الحجم اللازم بـ mL لتحضير محلول من كلوريد الكالسيوم  $\text{CaCl}_2$  تركيزه 0.300 M وحجمه 0.5 L إذا كان تركيز محلوله القياسي 2.00 M؟

### ١ تحليل المسألة

لقد أعطيت مolarية محلول قياسي من كلوريد الكالسيوم  $\text{CaCl}_2$  والمolarية والحجم للمحلول بعد التخفيف، وباستعمال العلاقة بين المolarية والحجم يمكن إيجاد حجم المحلول القياسي اللازم بالـ L ثم تحويله إلى mL.

المطلوب	المعطيات
$V_1 = ? \text{ mL}$	$M_1 = 2.00 \text{ M CaCl}_2$
	$M_2 = 0.300 \text{ M}$
	$V_2 = 0.50 \text{ L}$

### ٢ حساب المطلوب

حل المعادلة لإيجاد حجم المحلول القياسي  $V_1$

اكتب معادلة التخفيف

حل لإيجاد  $V_1$

عوض  $V_2 = 0.50 \text{ L}$ ,  $M_2 = 0.300 \text{ M}$ ,  $M_1 = 2.00 \text{ M}$

اضرب واقسم الأرقام والوحدات

$$V_1 = (0.075 \text{ L}) \left( \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} \right) = 75 \text{ mL}$$

حول إلى mL باستعمال معامل التحويل 1000 mL/1L

قس 75 mL من المحلول القياسي، ثم خففه بكمية الماء الازمة للحصول على الحجم النهائي 0.5 L.

### ٣ تقويم الإجابة

تم حساب الحجم  $V_1$ ، وتحويله إلى mL، ويجب أن يكون أقل من الحجم النهائي للمحلول المخفف  $V_2$ ، وهو من معطيات المسألة.

### مسائل تدريبية

24. ما حجم المحلول القياسي KI الذي تركيزه 3.00 M اللازم لتحضير محلول مخفف منه تركيزه 1.25 M وحجمه 0.300 L؟

25. ما حجم المحلول القياسي  $\text{H}_2\text{SO}_4$  الذي تركيزه 0.50 M بـ mL لتحضير محلول مخفف منه حجمه 100 mL وتركيزه 0.25 M؟

26. تحضير إذا خفف 0.5 L من المحلول القياسي HCl الذي تركيزه 5 M ليصبح 2 L فما كتلة HCl في المحلول؟



24. ما حجم محلول القياسي KI الذي تركيزه 3.00 M اللازم لتحضير محلول مخفف منه تركيزه 1.25 M وحجمه 0.300 L

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$(3.00 \text{ M}) V_1 = (1.25 \text{ M}) (0.300 \text{ L})$$

$$V_1 = \frac{(1.25 \text{ M})(0.300 \text{ L})}{3.00 \text{ M}} = 0.125 \text{ L} = 125 \text{ mL}$$

25. ما حجم محلول القياسي  $\text{H}_2\text{SO}_4$  الذي تركيزه 0.50 M بالمللترات اللازم لتحضير محلول مخفف منه حجمه 100 mL وتركيزه 0.25 M

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$(5.0 \text{ M}) V_1 = (0.25 \text{ M}) (100.0 \text{ mL})$$

$$V_1 = \frac{(0.25 \text{ M})(100 \text{ mL})}{0.5 \text{ M}} = 50 \text{ mL}$$

26. تحفيز إذا خفف 0.5 L من محلول القياسي HCl الذي تركيزه 5 M ليصبح 2 L فما كتلة HCl في محلول؟

احسب عدد مولات :  $\text{HCl}$

$$\text{عدد مولات المذاب} = \frac{(\text{mol})}{\text{المولارية}}$$

$$\text{حجم محلول (L)}$$

$$5 \text{ M} = \frac{(\text{mol HCl})}{0.5 \text{ L}}$$

$$\text{mol HCl} = 2.5 \text{ mol}$$

احسب كتلة :  $\text{HCl}$

$$2.5 \text{ mol HCl} \times \frac{36.45 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 91.15 \text{ g HCl}$$



**المولالية (التركيز المولالي) ( $m$ )** يتغير حجم محلول عند تغيير درجة الحرارة؛ فقد يتمدد أو يتقلص، مما يؤثر في مolarية محلول. لكن لا تتأثر كتل المواد في محلول بدرجات الحرارة، لذا من المفيد أحياناً وصف المحاليل بعدد مولات المذاب في كتلة معينة من المذيب. ويسمى مثل هذا الوصف **المولالية**، ويرمز إليه بالرمز  $m$ . ويكون تركيز محلول الذي يحتوي على 1 mol من المذاب في 1 kg من المذيب  $m$  (1 محلول مولي).

### المولالية

$$\text{المولالية } m = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{كتلة المذيب} (\text{kg})}$$

### مثال 1-4

حساب المولالية أضاف طالب في إحدى التجارب 4.5 g من كلوريد الصوديوم إلى 100.0 g من الماء. احسب مolarية محلول.

#### 1. تحليل المسألة

لقد أعطيت كتلة المذيب والمذاب. حدد عدد مولات المذاب، ثم احسب المولالية.

#### المطلوب

$$m = ? \text{ mol/kg}$$

#### المعطيات

$$\text{كتلة الماء } 100.0 \text{ g} = \text{H}_2\text{O}$$

$$\text{كتلة كلوريد الصوديوم } 4.5 \text{ g} = \text{NaCl}$$

#### 2. حساب المطلوب

احسب عدد مولات NaCl

حول كتلة H<sub>2</sub>O من جرامات إلى كيلوجرامات  
باستعمال معامل التحويل 1kg / 1000 g

عرض بالمعطيات في معادلة المولالية.

اكتب معادلة المولالية

عرض عن عدد مولات المذاب 0.077 mol NaCl وكتلة المذيب 0.1000 kg H<sub>2</sub>O

$$\text{المولالية } (m) = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{كتلة المذيب kg}}$$

$$m = \frac{0.077 \text{ mol NaCl}}{0.1000 \text{ kg H}_2\text{O}} = 0.77 \text{ mol/kg}$$

#### 3. تقويم الإجابة

هناك أقل من 1 mol / 10 kg من المذاب في 1 / 10 Kg من الماء، لذا ستكون المولالية أقل من واحد، وهي كذلك.

#### مسائل تدريبية

27. ما مolarية محلول يحتوي على 10.0 g من كبريتات الصوديوم Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ذاتية في 1000.0 g ماء؟

28. تحفيز ما كتلة Ba(OH)<sub>2</sub> بالجرامات، اللازمة لتحضير محلول مائي تركيزه  $m = 1.00$

الإجابة في الصفحة التالية

27. ما مولالية محلول يحتوي على 10.0 g من كبريتات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  ذاتية في 1000.0 g ماء؟

احسب عدد مولات :  $\text{Na}_2\text{SO}_4$

$$\text{mol Na}_2\text{SO}_4 = 10.0 \text{ g Na}_2\text{SO}_4 \times \frac{1 \text{ mol}}{142.04 \text{ g}}$$

$$= 0.0704 \text{ mol Na}_2\text{SO}_4$$

احسب المولالية :

$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg) المولالية}}$$

$$= \frac{0.0704 \text{ mol Na}_2\text{SO}_4}{1.0000 \text{ Kg H}_2\text{O}} = 0.0704 \text{ m}$$

28. تحضير ما كتلة  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  بالجرامات، اللازمة لتحضير محلول مائي تركيزه  $m$  ؟ 1.00 m

احسب عدد مولات :  $\text{Ba}(\text{OH})_2$

$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg) المولالية}}$$

$$1.00 \text{ m} = \frac{(\text{mol Ba}(\text{OH})_2)}{1 \text{ kg}}$$


$$\text{mol Ba}(\text{OH})_2 = 1 \text{ mol}$$

احسب كتلة :  $\text{Ba}(\text{OH})_2$

~~$$1 \text{ mol Ba}(\text{OH})_2 \times \frac{171 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 171 \text{ g Ba}(\text{OH})_2$$~~



### محلول حمض الهيدروكلوريك



$$X_{\text{HCl}} + X_{\text{H}_2\text{O}} = 1.00 \\ 0.22 + 0.78 = 1.00$$

**الشكل 7-1** يشير الكسر المولي إلى عدد مولات المذاب والمذيب بالنسبة إلى عدد المولات الكلية في محلول. ويمكن النظر إلى الكسر المولي على أنه نسبة مئوية، فمثلاً إذا كان الكسر المولي للماء ( $X_{\text{H}_2\text{O}}$ ) يساوي 0.78؛ فهذا يعني أن محلول يحتوي 78% من الماء.

**الكسر المولي** إذا عرفت عدد مولات المذاب والمذيب يمكنك التعبير عن تركيز محلول بما يعرف بالكسر المولي، وهو نسبة عدد مولات المذاب أو المذيب في محلول إلى عدد المولات الكلية للمذيب والمذاب. يستعمل الرمز  $X$  عادة للكسر المولي مع الإشارة إلى المذيب أو المذاب. ويمكن التعبير عن الكسر المولي للمذيب والكسر المولي للمذاب  $X_A$  كما يأتي:

### الكسر المولي

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} \quad X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

$X_A$  يمثلان الكسر المولي لكل مادة.  
 $n_B$  و  $n_A$  يمثلان عدد مولات كل مادة.

فعلى سبيل المثال: يحتوي 100 g من محلول حمض الهيدروكلوريك على 36 g HCl و 64 g H<sub>2</sub>O، ولتحويل هذه الكتل إلى مولات عليك استعمال الكتل المولية بوصفها عوامل تحويل.

$$n_{\text{HCl}} = 36 \text{ g HCl} \times \frac{1 \text{ mol HCl}}{36.5 \text{ g HCl}} = 0.99 \text{ mol HCl}$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = 64 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18.0 \text{ g H}_2\text{O}} = 3.6 \text{ mol H}_2\text{O}$$

يُعبر عن الكسر المولي لكل من الماء وحمض الهيدروكلوريك كما يأتي كما هو موضح في الشكل 7-1 كما يأتي:

$$X_{\text{HCl}} = \frac{n_{\text{HCl}}}{n_{\text{HCl}} + n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{0.99 \text{ mol HCl}}{0.99 \text{ mol HCl} + 3.6 \text{ mol H}_2\text{O}} = 0.22$$

$$X_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{HCl}} + n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{3.6 \text{ mol H}_2\text{O}}{0.99 \text{ mol HCl} + 3.6 \text{ mol H}_2\text{O}} = 0.78$$

### مسائل تدريبية

29. ما الكسر المولي هيدروكسيد الصوديوم NaOH في محلول مائي منه يحتوي على 22.8% بالكتلة من NaOH؟

30. تحضير إذا كان الكسر المولي لحمض الكبريتيك H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> في محلول مائي يساوي 0.325 فما كتلة الماء بالجرامات الموجودة في 100 mL من محلول؟



29. ما الكسر المولي لهيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$  في محلول مائي منه يحتوي على  $22.8\%$  بالكتلة من  $\text{NaOH}$ ؟  
افرض أن لديك عينة وزنها **100.0 g**، عندئذٍ:

$$\text{NaOH}_{\text{كتلة}} = 22.8 \text{ g}$$

$$\text{H}_2\text{O}_{\text{كتلة}} = 100.0 \text{ g} - (\text{NaOH}_{\text{كتلة}}) = 77.2 \text{ g}$$

احسب عدد مولات كلّ من  $\text{H}_2\text{O}$ ،  $\text{NaOH}$ ، و  $\text{O}_2$ :

$$\text{mol NaOH} = 22.8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40.00 \text{ g}} = 0.570 \text{ mol NaOH}$$

$$\text{mol H}_2\text{O} = 77.2 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{18.02 \text{ g}} = 4.28 \text{ mol H}_2\text{O}$$

احسب الكسر المولي لهيدروكسيد الصوديوم:

$$X_{\text{NaOH}} = \frac{n_{\text{NaOH}}}{n_{\text{NaOH}} + n_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$= \frac{0.570 \text{ mol NaOH}}{0.570 \text{ mol NaOH} + 4.28 \text{ mol H}_2\text{O}} = \frac{0.570}{4.85}$$

$$= 0.118$$

30. تحضير إذا كان الكسر المولي لحمض الكبريتيك  $\text{H}_2\text{SO}_4$  في محلول مائي يساوي  $0.325$  فما كتلة الماء بالجرامات الموجودة في  $100 \text{ mL}$  من محلول؟

افرض أن عدد مولات العينة الكلية = **1.00 mol**. عندئذٍ:

$$^N\text{H}_2\text{O} = ^M\text{H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18 \text{ g H}_2\text{O}}$$

$$0.675 = ^M\text{H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18 \text{ g H}_2\text{O}}$$

$$^M\text{H}_2\text{O} = 0.675 \times 18 = 12.15 \text{ g}$$

31. **الفكرة الرئيسية** قارن بين خمس طرائق للتعبير عن تراكيز المحاليل كميّاً.

34. أوجد كتلة كلوريد الأمونيوم  $\text{NH}_4\text{Cl}$  بالجرams الالازم لتحضير محلول مائي حجمه 2.5 L وتركيزه 0.5 M ؟

$$\text{احسب عدد مولات } \text{NH}_4\text{Cl} : \\ \text{عدد مولات المذاب (mol)} = \frac{\text{المolarية (M)}}{\text{حجم المحلول (L)}} \\ 0.5 \text{ M} = \frac{(\text{mol } \text{NH}_4\text{Cl})}{2.5 \text{ L}}$$

$$\text{mol } \text{NH}_4\text{Cl} = 1.25 \text{ mol}$$

احسب كتلة  $\text{NH}_4\text{Cl}$  :

$$\text{كتلة } \text{NH}_4\text{Cl} = 1.25 \text{ mol } \text{NH}_4\text{Cl} \times \frac{53.49 \text{ g } \text{NH}_4\text{Cl}}{1 \text{ mol}} \\ = 66.86 \text{ g}$$

35. لخص الخطوات العملية لتحضير محلول مخفف بحجم معين من المحلول القياسي المركز.

احسب حجم المحلول القياسي الالازم، وأضفه إلى الدورق القياسي، ثم أضف الماء إلى أن تصل إلى العلامة المطلوبة على الدورق القياسي.

تعتمد المolarية والمولالية والكسر المولي على عدد مولات المذاب بالنسبة لكمية أخرى، وتعرف كل من النسبة المئوية والمolarية للحجم على أساس حجم المحلول. في حين تعتمد المولالية، والكسر المولي على كمية المذيب. وتبقى النسبة المئوية للحجم، والكتلة هما الوحيدةتان اللتان تتضمنان النسبة المئوية.

32.وضح التشابه والاختلاف بين M من محلول NaOH و m من NaOH محلول.

يحتوي كلا المحلولين على مذاب هو NaOH، ومذيب هو الماء، ويحتوي المحلول الذي تركيزه 1m على 1mol من 1M NaOH لكل Kg الماء، ويحتوي المحلول الذي تركيزه 1M على 1 mol NaOH لكل لتر (L) من المحلول.

33. احسب النسبة المئوية بالكتلة لكلوريد الصوديوم في علبة حساء الدجاج إذا احتوت على 450 mg كلوريد صوديوم في 240.0 g من الحساء.

$$\text{احسب كتلة NaCl بالجرام:} \\ 450 \text{ mg NaCl} \times \frac{1 \text{ g}}{1000 \text{ mg}} = 0.45 \text{ g NaCl}$$

$$\text{احسب النسبة المئوية بالكتلة لـ NaCl:} \\ \frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة المحلول}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية بالكتلة}$$

$$= \frac{0.45 \text{ g}}{240.0 \text{ g}} \times 100 = 0.19\%$$

# 1-3

## العوامل المؤثرة في الذوبان

## Factors Affecting Solvation


**الفكرة الرئيسية** يتأثر تكون المحلول بعوامل، منها الحرارة والضغط والقطبية.

**الربط مع الحياة** عند تحضير حساء من خليط جاف فإنك تضيف الماء البارد إلى الخليط، ثم تحركه، وسوف تلاحظ أن كمية قليلة من المسحوق ذابت في البداية، وبعد تسخينه وتحريكه مرة أخرى تجد أن المسحوق قد ذاب، وأصبح لديك حساء متسلق.

### عملية الذوبان The Solvation Process

عند وضع مذاب صلب في مذيب، تحيط جسيمات المذيب بسطح المذاب الصلب تماماً. فإذا كانت قوى التجاذب المكونة بين جسيمات المذاب والمذيب أكبر من قوى التجاذب بين جسيمات المذاب نفسه فسوف تجذب جسيمات المذيب جسيمات المذاب، وتفصل بعضها عن بعض وتحيط بها، ثم تبتعد جسيمات المذاب المحاطة بجسيمات المذيب عن المذاب الصلب، وتتجه نحو المحلول.

وتسمى عملية إحاطة جسيمات المذاب بجسيمات المذيب **الذوبان**، كما هو موضح في الشكل 1-8، فالمذيب يذيب شبيهه "like dissolves like"، قاعدة عامة تستعمل لتحديد ما إذا كانت عملية الذوبان تحدث في مذيب معين. ولتحديد ما إذا كان المذيب والمذاب متماثلين يجب دراسة قطبية المركبات ونوع الروابط بين الجزيئية فيها.



الشكل 1-8 يأخذ الملح في الانفصال عندما يوضع في الماء؛ إذ تسحب جسيمات المذاب وتحاط بجسيمات المذيب.

### الأهداف

- تصف تأثير قوى التجاذب بين الجزيئات في الذوبان.
- تعرف الذائية.
- تستنتج العوامل المؤثرة في الذوبان.

### مراجعة المفردات

طارد للحرارة: التفاعل الكيميائي الذي يطلق طاقة أكثر مما يحتاج لكسر روابط المواد المتفاعلة.

### المفردات الجديدة

الذوبان

حرارة الذوبان

المحلول غير المشبع


المحلول المشبع

المحلول فوق المشبع

قانون هنري



### ذوبان ملح الطعام $\text{NaCl}$ في الماء



**الشكل 1-9** يذوب كلوريد الصوديوم في الماء عندما تحيط جزيئات الماء بأيونات الصوديوم والكلوريد. لاحظ كيف تحيط جزيئات الماء القطبية بكل من أيونات الكلور السالبة وأيونات الصوديوم الموجبة.

### محاليل المركبات الأيونية

تعلم أن جزيئات الماء قطبية، وأنها في حركة مستمرة، بحسب نظرية الحركة الجزيئية. فعند وضع بلورة من مركب أيوني مثل كلوريد الصوديوم ( $\text{NaCl}$ ) في الماء تصطدم جزيئات الماء بسطح البلورة. وعندما تجذب أقطاب جزيئات الماء المشحونة أيونات الصوديوم الموجبة وأيونات الكلوريد السالبة. وهذا التجاذب بين الأقطاب والأيونات أكبر من التجاذب بين الأيونات في البلورة. لذلك تنزلق الأيونات متعددة عن سطح البلورة. وتحيط جزيئات الماء بالأيونات وتسحبها نحو محلول، معروضةً أيونات أخرى على سطح البلورة للذوبان، وهكذا تستمر عملية الذوبان حتى تذوب البلورة كلها، انظر الشكل 1-9.

لا يمكن إذابة جميع المركبات الأيونية في الماء؛ فالجبس مثلاً لا يذوب في الماء؛ لأن قوى التجاذب بين أيونات الجبس قوية؛ بحيث لا تستطيع قوى التجاذب بين جزيئات الماء والأيونات التغلب عليها. ولقد أسهمت اكتشافات محاليل ومخاليط معينة - ومنها الجبيرة الطبية المحضرة من الجبس - في تطوير الكثير من المنتجات والعمليات، كما هو موضح في

الشكل 1-10.



### الشكل 1-10 كيمياء المحاليل

أسهم العلماء العاملون في مجال المحاليل الكيميائية في تطوير منتجات وعمليات تتضمن مجالات التقنية الطبية، وتحضير الطعام وحفظه، والصحة العامة والسلامة.



1916م طور الأطباء محلول الجلسرول الذي يسمح بتخزين الدم عدة أسابيع بعد سحبه.


1883م أول نجاح لعملية طرد مركزي تستعمل الدوران السريع لفصل مكونات المخلوط.

1870



1866م كان اختراع السلولويد - وهو محلول من الكافور والسليلوز - إشارة إلى بدايات صناعة البلاستيك.

1899م سجلت براءة اختراع جديدة لأحدث تقنية تستخدم في التقلييل من حجم حبيبات الدهن الذائبة في الحليب؛ لمنع تكون طبقة زبد، في عملية تسمى التجانس.



**الشكل 11-1** يحتوي جزيء السكرور على 8 روابط H – O قطبية، وتكون جزيئات الماء القطبية روابط هيدروجينية مع الروابط H – O في السكرور، وتسحب جزيئات السكرور نحو المحلول.

**محاليل المركبات الجزيئية** يعد الماء مذيباً جيداً للكثير من المركبات الجزيئية. فسكر المائدة عبارة عن المركب الجزيئي السكرور، وتحتوي جزيئاته القطبية على عدة روابط من H – O، كما هو موضح في **الشكل 11-1**. وبمجرد ملامسة بلورات السكر الماء، تصطدم جزيئات الماء بالسطح الخارجي للبلورات، وتصبح كل رابطة H – O في السكرور موقعاً لتكون روابط هيدروجينية مع الماء، لذا يتم التغلب على قوى التجاذب بين جزيئات السكرور بقوى التجاذب التي تكون بين جزيئاته وجزيئات الماء القطبية، فتترك جزيئات السكرور البلورة، وتصبح ذائبة في الماء.

يتكون الزيت من الكربون والهيدروجين، ولا يكون محلولاً مع الماء؛ وذلك لأن قوى التجاذب التي تتكون بين جزيئات الماء القطبية وجزيئات الزيت غير القطبية ضعيفة. لذا يذوب الزيت في مذيب غير قطبي؛ لأن المذاب غير القطبي يذوب بسهولة أكبر في المذيب غير القطبي.

2003 طور العلماء عينات كيميائية تزيل الفلزات السامة، والمبيدات الحشرية، وتقتل مسببات الأمراض في مياه الشرب.

1964 اكتشف ستيفاني كوالك ألفاً اصطناعية من بلورات سائلة في محلول. وهي أكثر صلابة من الفولاذ وأخف من الألياف الزجاجية.



2010

1990

1970

1950

1980 تم تطوير نوع من ألواح الجبس لتشكل عازلاً يفصل بين المنزل ومحبيه الخارجي.

1943 أول كلية اصطناعية تخلص الجسم من السموم الذائبة في دم المريض.

**حرارة الذوبان** تفصل جسيمات المذاب بعضها عن بعض خلال عملية الذوبان، وتبتعد جسيمات المذيب لتسمح لجسيمات المذاب بالدخول بينها. ويلزم طاقة للتغلب على قوى التجاذب التي بين جسيمات المذاب والتي بين جسيمات المذيب، والتي تعرف طاقة الشبكة البلورية ويرمز لها بالرمز (طب) أو (U)، لذلك فكلتا الخطوتين ماصة للطاقة. وعند خلط جسيمات المذيب مع جسيمات المذاب تتجاذب جسيماتها وتنطلق طاقة تعرف طاقة التميه ويرمز لها بالرمز (طه) أو ( $H_{hyd}$ )، لذا فإن هذه الخطوة في عملية الذوبان طاردة للطاقة. ويسمى التغير الكلي للطاقة الذي يحدث خلال عملية تكون محلول **حرارة الذوبان**.

وكما لاحظت في التجربة الاستهلالية أن بعض المحاليل تُنتج طاقة في أثناء تكونها (طاردة للطاقة)، وبعضها الآخر يمتص طاقة في أثناء تكونه (ماصة للطاقة). فمثلاً بعد ذوبان نترات الأمونيوم في وعاء يحوي ماء يصبح الوعاء بارداً، أمّا بعد ذوبان كلوريد الكالسيوم في وعاء يحوي ماء فيصبح الوعاء ساخناً.

✓ **ماذا قرأت؟** فسر لماذا تنتج بعض المحاليل طاقة في أثناء تكونها بينما يمتص بعضها الآخر طاقة في أثناء تكونه؟



مكعب من السكر

يدبّب مكعب السكر في الشاي المثلج ببطء، وتزداد سرعة الذوبان عند تحريكه.



يدبّب السكر المطحون بسرعة أكبر من مكعب السكر في الشاي المثلج، كما يزيد التحريك من سرعة ذوبان السكر المطحون.



يدبّب السكر المطحون بسرعة كبيرة جداً في الشاي الساخن.

الشكل 1-12 يؤثر كل من التحريك، ومساحة السطح، ودرجة الحرارة في سرعة الذوبان.

**يجب توفير الطاقة للتغلب على قوى التجاذب بين جزيئات المذاب، وكذلك بين جزيئات المذيب، وتنتج الطاقة عند تجاذب كل من جسيمات المذاب والمذيب معاً، وتحدد محصلة التغيير في الطاقة لهاتين العمليتين ما إذا كان محلول ماصاً للطاقة، أو**

**طارداً لها**

### العوامل المؤثرة في الذوبان


#### Factors That Affect Solvation

يحدث الذوبان عند تصادم جسيمات المذاب والمذيب معاً. ويبيّن الشكل 1-12 ثلات طرائق شائعة لزيادة التصادمات بين جسيمات المذاب والمذيب وزيادة سرعة الذوبان، وهي: التحريك، وزيادة مساحة سطح المذاب، ورفع درجة حرارة المذيب.

**التحريك** يعمل تحريك محلول على إبعاد جسيمات المذاب عن سطوح التماس بسرعة أكبر، وبذلك يسمح بحدوث تصادمات أخرى بين جسيمات المذاب والمذيب. ومن دون تحريك محلول تتحرك الجسيمات الذائبة بعيداً عن مناطق التماس ببطء.

**مساحة السطح** إن تكسير المذاب إلى قطع صغيرة يزيد من مساحة سطحه. وتساعد الزيادة في مساحة السطح على زيادة عدد التصادمات التي تحدث بين جسيماته وجسيمات المذيب. لذا فإن ملعقة من السكر المطحون تذوب أسرع من الكمية نفسها التي تكون في صورة مكعبات.

**الحرارة** تتأثر سرعة الذوبان بدرجة الحرارة؛ فالمذيب الساخن يذيب كمية أكبر من المذاب مقارنة بالمذيب البارد. لذلك يستوعب الشاي الساخن سكرًا ذاتياً أكثر من الشاي المثلج، كما أن السكر يذوب فيه أسرع. ومع زيادة درجة الحرارة تسلك معظم المواد الصلبة سلوك السكر عند الذوبان. إلا أن ذوبان بعض المواد الأخرى، ومنها الغازات، يقل بزيادة درجة الحرارة، وهذا يجعل المشروبات الغازية تفقد طعمها اللاذع أسرع عند درجة حرارة الغرفة، مما لو كانت باردة.



**الشكل 1-13** تساوي سرعة الذوبان في المحلول  
المشبع سرعة التبلور، لذلك لا تغير كمية المذاب.

## **Solubilitys الذائبية**

تعرّف الذائبة على أنها أقصى كمية من المذاب يمكن أن تذوب في كمية محددة من المذيب عند درجة حرارة معينة. وكما يمكن فهم الذوبان على مستوى الجسيمات، يمكن كذلك فهم الذائبة على مستوى الجسيمات. تعتمد ذائبية المذاب على طبيعة كل من المذاب والمذيب؛ فعند إضافة المذاب إلى المذيب تتصادم جسيمات المذيب مع جسيمات سطح المذاب، وتبدأ جسيمات المذاب الذائبة في الاختلاط خلال جسيمات المذيب عشوائياً. إلا أنه مع زيادة عدد جسيمات المذاب الذائبة يزداد عدد تصادماتها مع بقية البلورة، مما يجعل بعضها يتتصق بسطح البلورة، أو يتبلور مرة أخرى، كما هو موضح في الشكل 13-1. ومع استمرار عملية الذوبان تزداد سرعة التبلور، بينما تبقى سرعة الذوبان ثابتة. ويستمر الذوبان ما دامت سرعة الذوبان أعلى من سرعة التبلور.

واعتئاداً على كمية المذاب، قد تتساوى سرعة الذوبان والتبلور في النهاية. وعند هذه النقطة لا يذوب المزيد من المذاب، ويصل محلول إلى حالة من الاتزان الديناميكي بين التبلور والذوبان إذا بقيت درجة الحرارة ثابتة.


**المحلول غير المشبع** يحتوي المحلول غير المشبع على كمية مذاب أقل مما في المحلول المشبع عند درجة حرارة وضغط معينين. أي أنه يمكن إضافة كميات أكبر من المذاب إلى المحلول غير المشبع.

**المحلول المشبع** رغم استمرار ذوبان جسيمات المذاب وتبلوّرها في المحلول الذي وصل إلى حالة الاتزان إلا أن كمية المذاب الذائبة في المحلول تبقى ثابتة. ويعرف مثل هذا المحلول الموضّح في الشكل 13-1 بال محلول المشبع، وهو يحتوي على أكبر كمية من المذاب ذائبة في كمية محددة من المذيب عند درجة حرارة وضغط معينين.

**درجة الحرارة والمحاليل فوق المشبعة** تتأثر الذائبية بارتفاع درجة حرارة المذيب؛ حيث تزداد طاقة حركة جسيماته، فتزداد التصادمات ذات الطاقة الكبيرة مقارنة بالتصادمات عند درجة حرارة منخفضة. إن ذائبية الكثير من المواد أكبر عند درجات الحرارة المرتفعة، كما في الشكل 14-1.

فذائبية كلوريد الكالسيوم  $\text{CaCl}_2$  تساوي 64g لكل 100g من  $\text{H}_2\text{O}$  عند درجة حرارة  $10^\circ\text{C}$ ، وعند زيادة درجة الحرارة إلى  $27^\circ\text{C}$  تزداد الذائبية بنسبة 50% تقريباً: 100 g  $\text{CaCl}_2$  لكل 100 g  $\text{H}_2\text{O}$  تقريباً.

تقل ذائبية بعض المواد - ومنها كبريتات السيريوم - عند زيادة درجة الحرارة، ولكنها تبقى ثابتة بعد الوصول إلى درجة حرارة معينة.



اختبار الرسم البياني ✓

حدد ذائبية NaCl عند درجة حرارة 80°C.

$\text{H}_2\text{O}$  100 g كل 40 g



الذائبية في الماء عند درجات حرارة مختلفة

الجدول 1-4

الذائبية في الماء عند درجات حرارة مختلفة				المادة
*(g/100 g H <sub>2</sub> O)				الصيغة الكيميائية
100°C	60°C	20°C	0°C	
89.0	59.2	36.4	31.2	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>
--	20.94	3.89	1.67	Ba(OH) <sub>2</sub>
0.076	0.121	0.173	0.189	Ca(OH) <sub>2</sub>
--	32.6	34.8	36.1	Li <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
56.3	45.8	34.2	28.0	KCl
39.2	37.1	35.9	35.7	NaCl
733	440	216	122	AgNO <sub>3</sub>
487.2	287.3	203.9	179.2	C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub>
--	200	680	1130	NH <sub>3</sub>
--	0.359	0.878	1.713	CO <sub>2</sub>
--	0.019	0.031	0.048	O <sub>2</sub>

.101 kPa \* في حالة الغاز عند الضغط الجوي القياسي L/1 L H<sub>2</sub>O \*


يمكن توضيح تأثير درجة الحرارة في ذائبية المواد من خلال البيانات الموجودة في الجدول 1-4. تلاحظ أن 203.9 g من السكرور C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub> تذوب في 100 g من الماء عند درجة حرارة 20°C. بينما يذوب 487.2 g من السكرور في 100 g من الماء عند درجة حرارة 100°C، وهذا يعني زيادة قابلية الذوبان 140% تقريباً. وحقيقة أن الذائبية تتغير عند تغيير درجة الحرارة وأن بعض المواد تصبح أكثر قابلية للذوبان عند زيادة درجة الحرارة، هي المفتاح الأساسي لتكوين المحاليل فوق المشبعة. يحتوي محلول فوق المشبع على كمية أكبر من المادة المذابة مقارنة بمحلول مشبع عند درجة الحرارة نفسها. ولعمل محلول فوق مشبع يتم تحضير محلول مشبع عند درجة حرارة عالية، ثم يبرد تدريجياً وبيطئاً؛ إذ يسمح التبريد البطيء لل المادة المذابة الزائدة أن تبقى مذابة في محلول عند درجات حرارة منخفضة، كما هو موضح في الشكل 1-15.

## المفردات

### أصل الكلمة

Saturated والتي تعني مُشبعاً مشتقة من الكلمة اللاتينية (Saturatus) وتعني يُشبّع أو يملأ...

الشكل 1-15 عند إضافة نواة التبلور إلى محلول فوق مشبع من السكرور تبلور المادة المذابة الزائدة.



بعد إضافة نواة التبلور

عند إضافة نواة التبلور

محلول فوق مشبع

نواة التبلور: هي عبارة عن قطعة أو مجموعة من القطع بلورة أحادية لمادة ما، والتي يتكون عن طريقها بلورات أكبر من المادة نفسها.



**الشكل 1-16** الرواسب المعدنية في الينابيع الحارة مثل (عيون الليث في المملكة العربية السعودية) تعتبر مثال على تكون البلورات من المحاليل فوق المشبعة.



المحاليل فوق المشبعة غير ثابتة؛ فعند إضافة قطعة صغيرة جدًا من مذاب - تسمى نواة التبلور - إلى محلول فوق مشبعة ترسب المادة المذابة الزائدة بسرعة، كما هو موضح في الشكل 1-15.

ويمكن أن يحدث التبلور عند كشط (Scratch) الجزء الداخلي من الكأس الزجاجية أو الوعاء الزجاجي المحتوي على محلول بساق تحريك زجاجية بلطاف أو تعرض محلول فوق المشبعة للحركة أو الرج.

وباستعمال يوديد الفضة  $\text{AgI}$  بوصفة نوى تكشف في الهواء فوق المشبعة ببخار الماء تتجمع جزيئات الماء في صورة قطرات قد تسقط على الأرض على هيئة مطر. تسمى هذه الآلة استمطار الغيوم. كما يتكون سكر النبات Rock Candy والرواسب المعدنية على حواف الينابيع المعدنية - كالتى تظهر في الشكل 1-16 - من محاليل فوق مشبعة.

**ذائبية الغازات** تقل ذائبية غازى الأكسجين وثاني أكسيد الكربون عند درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بدرجات الحرارة المنخفضة. وهذا سلوك متوقع لجميع المواد الغازية المذابة في المذيبات السائلة. هل تستطيع تفسير هذا السلوك؟ تذكر أن الطاقة الحرارية لجزيئات الغاز تسمح للجزيئات بالتحرر أو النفاذ من محلول بسهولة أكبر عند درجات الحرارة المرتفعة. ولذلك كلما زادت درجة حرارة محلول قلت ذائبية المذاب الغازي.

**الضغط وقانون هنري** يؤثر الضغط في ذائبية المواد الغازية المذابة في المحاليل؛ فكلما ازداد الضغط فوق محلول زادت ذائبية الغاز في أي مذيب. تعتمد المشروبات الغازية على هذا المبدأ؛ فهي تحتوى على غاز ثانى أكسيد الكربون المذاب في محلول مائي تحت ضغط أعلى من الضغط الجوى، وعند فتح علبة المشروب الغازي يكون ضغط غاز ثانى أكسيد الكربون داخل العلبة أعلى من الضغط الواقع خارج العلبة. ونتيجة لذلك تصاعد فقاعات غاز ثانى أكسيد الكربون من محلول إلى السطح وتتطاير. وتستمر هذه العملية حتى يفقد محلول غاز ثانى أكسيد الكربون كله تقريباً، ويصبح محلول بلا طعم. ويمكن وصف انخفاض ذائبية غاز ثانى أكسيد الكربون في المشروب الغازي بعد فتح العبوة بقانون هنري.

## الكيمياء في واقع الحياة

### الاستمطار في السعودية

تعد تجارب الاستمطار في المملكة العربية السعودية واحدة من تجارب عدة قامت في دول عربية مختلفة، حيث أجريت لأول مرة عام 1988م في منطقة عسير، بينما أجريت التجربة الثانية عام 2006م في ثلاث مناطق وسط المملكة (الرياض، والقصيم، وحائل).

### المفردات

الاستعمال العلمي مقابل

الاستعمال الشائع

**pressure**

الاستعمال العلمي: القوة المبذولة على وحدة المساحة.

خلال تسرب غاز ثانى أكسيد الكربون من محلول يزداد الضغط داخل القارورة المغلقة.

الاستعمال الشائع: الجهد الفيزيائى أو الإجهاد الذهنى.

يقع على الطلاب الكثير من الضغط فى أثناء الاختبارات.

ينص قانون هنري على أن "تناسب ذائبية الغاز في سائل (S) تناسبًا طرديًا مع ضغط الغاز (P) الموجود فوق السائل عند ثبوت درجة الحرارة". فعندما تكون قارورة المشروب الغازي مغلقة، كما هو موضح في الشكل 17-1، يعمل الضغط الواقع فوق محلول على إبقاء غاز ثاني أكسيد الكربون ذاتيًّا في محلوله. ويمكن تمثيل هذه العلاقة كما يلي:

**قانون هنري**

S يمثل الذائبية

P يمثل الضغط

يبقى ناتج قسمة الذائبية على الضغط ثابتاً عند درجة حرارة معينة.

غالبًا ما يستعمل قانون هنري لتحديد الذائبية  $S_2$  عند ضغط جديد  $P_2$ ، حيث  $P_2$  معروف. ويمكن استعمال قواعد الجبر الأساسية لحل معادلة قانون هنري لإيجاد أي من المتغيرات. والإيجاد  $S_2$  ابدأ باستعمال قانون هنري الأساسي.

$$\frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2}$$

بالضرب التبادلي نحصل على المعادلة:

$$P_1 S_2 = S_1 P_2$$

وبقسمة الطرفين على  $P_1$ :

$$\frac{P_1 S_2}{P_1} = \frac{S_1 P_2}{P_1} \rightarrow S_2 = \frac{S_1 P_2}{P_1}$$

الشكل 17-17 ثاني أكسيد الكربون  $CO_2$  مذاب في الصودا، كما يوجد بعضه فوق السائل.

عند إزالة الغطاء، يقل مقدار الضغط فوق المحلول، مما ينتج عنه انخفاض ذائبية ثاني أكسيد الكربون

**فقر** لماذا يتتصاعد غاز  $CO_2$  من محلول عند نزع الغطاء؟



يقل الضغط الذي فوق السائل عند فتح غطاء القارورة، لذا تقل ذائبية ثاني أكسيد الكربون.

يحافظ الضغط الذي فوق السائل في قارورة المشروب الغازي المغلقة على بقاء  $CO_2$  الفائق ذائبيًّا في محلوله ويعنده من التطاير.

قانون هنري إذا ذاب 0.85 g من غاز ما عند ضغط مقداره 4.0 atm في 1.0 L من الماء عند درجة حرارة 25°C، فكم يذوب منه في 1.0 L من الماء عند ضغط مقداره 1.0 atm ودرجة الحرارة نفسها؟

**1 تحليل المسألة**

أعطيت ذاتية الغاز عند الضغط الابتدائي، وثبات درجة حرارة الغاز مع تغير الضغط. ولأن تقليل الضغط يؤدي إلى تقليل ذاتية الغاز فإن كتلةً أقل من الغاز تذوب عند ضغط أقل.

**المطلوب**

$$S_2 = ? \text{ g/L}$$

$$S_1 = 0.85 \text{ g/L}$$

$$P_1 = 4.0 \text{ atm}$$

$$P_2 = 1.0 \text{ atm}$$

**2 حساب المطلوب**

اكتب قانون هنري

حل قانون هنري لايجد  $S_2$

عوض  $P_2 = 1.0 \text{ atm}$ .  $P_1 = 4.0 \text{ atm}$ .  $S_1 = 0.85 \text{ g/L}$

ثم اضرب واقسم الأرقام والوحدات.

**3 تقويم الإجابة**

قلت ذاتية، كما هو متوقع؛ فقد قلل الضغط فوق محلول من 4.0 atm إلى 1.0 atm، لذا يجب أن تنخفض ذاتية إلى ربع قيمتها الأصلية. الوحدة L/g هي وحدة ذاتية.

**مسائل تدريبية**

36. إذا ذاب 0.55 g من غاز ما في 1.0 L من الماء عند ضغط 20.0 kPa، فما كمية الغاز نفسه التي تذوب عند ضغط 110 kPa؟

**احسب ذاتية الغاز الابتدائية :**

$$S_1 = \frac{0.55 \text{ g}}{1.0 \text{ L}} = 0.55 \text{ g/L}$$

من المعادلة  $\frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2}$  احسب ذاتية الغاز النهائية:

$$S_2 = S_1 \times \frac{P_2}{P_1} = 0.55 \text{ g/L} \times \frac{110.0 \text{ kPa}}{20.0 \text{ kPa}} = 3.0 \text{ g/L}$$

37. ذائبية غاز عند ضغط 10 atm هي  $0.66 \text{ g/L}$ . ما مقدار الضغط الواقع على محلول حجمه 1.0 L ويحتوي على 1.5 g من الغاز نفسه؟

احسب ذائبية الغاز النهائية:

$$S_2 = \frac{1.5 \text{ g}}{1.0 \text{ L}} = 1.5 \text{ g/L}$$

من المعادلة  $\frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2}$  احسب الضغط:

$$P_2 = P_1 \times \frac{S_2}{S_1} = 10.0 \text{ atm} \times \frac{1.5 \text{ g/L}}{0.66 \text{ g/L}} = 23 \text{ atm}$$

38. تحفيز ذائبية غاز عند ضغط 7 atm تساوي  $0.52 \text{ g/L}$ . ما كتلة الغاز بالجرامات التي تذوب في لتر واحد إذا زاد الضغط إلى 10 atm؟

من المعادلة  $\frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2}$  احسب ذائبية الغاز النهائية:

$$S_2 = S_1 \times \frac{P_2}{P_1}$$

$$S_2 = (0.52 \text{ g/L}) \times \frac{10.0 \text{ atm}}{7.0 \text{ atm}}$$

$$S_2 = 0.73 \text{ g/L}$$

39. **ال فكرة الرئيسية** عدد العوامل المؤثرة في الذوبان.

**تؤثر مساحة السطح، ودرجة الحرارة، والضغط، والتحريك، في الذائبية.**

40. عرف الذائبية.

**الذائبية، أكبر كتلة من المذاب، تذوب في كمية معطاة من المذيب عند درجة حرارة وضغط محددين.**

41. اشرح كيف تؤثر قوى التجاذب بين الجزيئات في الذوبان؟

**تغلب قوة التجاذب بين جزيئات المذاب، والمذيب على قوى التجاذب بين جزيئات المذاب معاً، ومن ثم تؤدي إلى سحب جزيئات المذاب بعضها عن بعض.**

42. قارن كيف تتشابه طريقة تحضير محلول مائي من ملح الطعام، و محلول مائي من السكر؟

**في كلتا الحالتين، نقوم أولاً بتحديد كمية المذاب وإذابتها في الكمية المطلوبة من المذيب في دورق حجمي، ثم تحريك محلول جيداً لتمتزج مكوناته معاً.**

43. لخص ماذا يحدث إذا أضيفت نواة تبلور إلى محلول فوق مشبع؟ و بم تصف محلول الناتج؟


**يصبح محلول مشبعاً، بعد أن تتبلور جسيمات المذاب الزائدة خارج محلول.**



44. الرسم البياني استعمل المعلومات الموجودة في الجدول 4-1 لعمل رسوم بيانية لذائبية كبريتات الألومنيوم، وكبريتات الليثيوم، وكلوريد البوتاسيوم عند درجات حرارة  $0^{\circ}\text{C}$  و  $20^{\circ}\text{C}$  و  $60^{\circ}\text{C}$  و  $100^{\circ}\text{C}$ . أي المواد السابقة تتأثر ذائبتها أكثر بزيادة درجة الحرارة؟

**تُظهر كبريتات الألومنيوم أكبر تغير في الذائبية على مدى التغيير في درجات الحرارة كما هو مبين في الرسم البياني الآتي:**

الذائبية مقابل درجة الحرارة





رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

# 1-4

## الأهداف

- تصف الخواص الجامعة.
- تعرف أربع خواص جامعة للمحاليل.
- تحدد الارتفاع في درجة الغليان، والانخفاض في درجة التجمد للمحلول.

## مراجعة المفردات

**الأيون:** ذرة مشحونة كهربائياً.

## المفردات الجديدة

الخواص الجامعة

الانخفاض في الضغط البخاري

الارتفاع في درجة الغليان

الانخفاض في درجة التجمد

الخاصية الأسموزية

الضغط الأسموزي

## الخواص الجامعة للمحاليل

## Colligative Properties of Solutions

**الفكرة الرئيسية** تعتمد الخواص الجامعة على عدد جسيمات المذاب في المحلول.

**الربط مع الحياة** إذا كنت قد عشت في منطقة ذات طقس بارد جداً في الشتاء فلعلك لاحظت أن الناس يرشون الملح على الأرصفة والطرق لإزالة الثلج والجليد. كيف يساعد الملح على جعل القيادة في الشتاء أكثر أماناً؟

## المواد المتأينة والخواص الجامعة


### Electrolytes and Colligative Properties

تؤثر المواد المذابة في بعض الخواص الفيزيائية للمذيبات؛ فقد وجد الباحثون الأوائل أن تأثير المذاب في المذيب يعتمد فقط على كمية جسيمات المذاب في المحلول، لا على طبيعة المادة المذابة نفسها. وتسمى الخواص الفيزيائية للمحاليل التي تتأثر بعدد جسيمات المذاب وليس بطبعتها **الخواص الجامعة**. وتشمل الخواص الجامعة الانخفاض في الضغط البخاري، والارتفاع في درجة الغليان، والانخفاض في درجة التجمد، والضغط الأسموزي.

**المواد المتأينة في محلول مائي** درست سابقاً أن المركبات الأيونية مواد توصل محاليلها التيار الكهربائي، لذا تسمى مواد إلكترولية؛ وذلك لأنها تتفكك في الماء إلى أيونات، كما هو موضح في **الشكل 18-1**. كما تأمين القليل من المركبات الجزيئية في الماء وتكون أيضاً محلولاً متأيناً. وتسمى المواد المتأينة التي تنتج أيونات كثيرة في المحلول مواد متأينة قوية. أما التي تنتج عدداً قليلاً من الأيونات في المحلول فتسمى المواد المتأينة الضعيفة.


**الشكل 18-1** محلول كلوريد الصوديوم موصل جيد للكهرباء؛ وذلك لأنه محلول مادة متأينة، في حين لا يوصل محلول السكرورز التيار الكهربائي؛ لأنه محلول مادة غير متأينة.





الشكل 1-19 الضغط البخاري  
لمذيب نقي أكبر من الضغط البخاري  
ل محلول يحتوي على مذاب غير  
متطاير.

وكlorيد الصوديوم مادة متأينة قوية؛ حيث يتفكّك في المحلول ويُنتج أيونات  $\text{Na}^+$  و  $\text{Cl}^-$ .



فإذابة 1 mol من كلوريد الصوديوم في 1 kg من الماء لا تنتج محلولاً تركيزه أيوناته 1 m<sup>-1</sup>، بل تنتج 2 mol من جسيمات المذاب في المحلول، أي 1 mol لكل من أيوني  $\text{Na}^+$  و  $\text{Cl}^-$ .

**المواد غير المتأينة في المحلول المائي** تذوب الكثير من المركبات الجزيئية في المذيبات، ولكنها لا تتأين. ومثل هذه المحاليل لا توصل التيار الكهربائي، كما هو موضح في الشكل 18-1. وتسمى المواد المذابة مواد غير متأينة. والسكروز مثال على المواد غير المتأينة؛ حيث يحتوي محلول السكروز الذي تركيزه 1 mol على 1 mol فقط من جزيئات السكروز.

**ماذا قرأت؟** استنتاج أي المركبين له تأثير أكبر في الخواص الجامعية: كلوريد الصوديوم أم السكروز؟

**سيكون لكlorيد الصوديوم الأثر الأكبر؛ وذلك لأنَّه يتفكّك مكوناً ضعف عدد الجسيمات**

### الانخفاض في الضغط البخاري Vapor Pressure Lowering

الضغط البخاري هو الضغط الناتج عن بخار السائل عندما يكون في حالة اتزان ديناميكي مع سائله في وعاء مغلق عند درجة حرارة وضغط ثابتين، وعند هذه النقطة تتساوى سرعاتي التبخر والتكافث.

تظهر التجارب أن إضافة مذاب غير متطاير - له ميل قليل إلى التحول إلى غاز - إلى مذيب يقلل الضغط البخاري للمذيب. كما أن الجسيمات التي تحدث الضغط البخاري تتبخّر من سطح السائل. فعندما يكون المذيب نقياً كما في الشكل 1-19 a تشغّل جسيماته مساحة السطح كلها. أما عندما يحتوي المذيب على مذاب، كما في الشكل 1-19 b، فإن خليط جسيمات المذاب والمذيب يحتل مساحة سطح المحلول. وبسبب وجود كمية قليلة من جسيمات المذيب على السطح يتحول القليل منها إلى الحالة الغازية، ومن ثم ينخفض الضغط البخاري. وكلما ازداد عدد جسيمات المذاب في المذيب قل الضغط البخاري الناتج، لذا فإن **الانخفاض في الضغط البخاري** يعتمد على عدد جسيمات المذاب في المحلول، ولذلك فهو من الخواص الجامعية للمحاليل.

تستطيع توقع التأثير النسبي للمذاب في الضغط البخاري اعتماداً على كون المذاب متأيناً أو غير متأيناً. فمثلاً يكون التأثير النسبي لـ 1 mol من كل من المواد المذابة غير المتأينة - منها الجلوكوز والسكروز والإيثانول - هو نفسه في الضغط البخاري، إلا أن تأثير 1 mol من كل من المواد المذابة المتأينة - منها كلوريد الصوديوم  $\text{NaCl}$ ، وكبريتات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ، وكلوريد الألومنيوم  $\text{AlCl}_3$  - يزيد في الضغط البخاري؛ بسبب تزايد أعداد الأيونات التي يتوجهها كل منها في محلولها.

## الارتفاع في درجة الغليان Boiling Point Elevation

يؤثر المذاب غير المتطاير في درجة غليان المذيب لأنّه يقلل الضغط البخاري له. تذكر أنّ السائل يغلي عندما يعادل ضغطه البخاري الضغط الجوي. وعندما ترتفع درجة حرارة محلول المحتوى على مذاب غير متطاير إلى درجة غليان المذيب النقي فإنّ ضغط البخار الناتج يبقى أقل من الضغط الجوي، لذا لا يغلي محلول. ولذلك يجب تسخين محلول إلى درجة حرارة أعلى لتزويده بالطاقة الحرارية الإضافية اللازمة لرفع الضغط البخاري له إلى ما يعادل الضغط الجوي. ويسمى الفرق بين درجة حرارة غليان محلول ودرجة غليان المذيب النقي **الارتفاع في درجة الغليان**. وفي المواد غير المتأينة تتناسب قيمة ارتفاع درجة الغليان - التي يرمز إليها بالرمز  $\Delta T_b$  - تناسبًا طرديًّا مع مولالية محلول.

**الارتفاع في درجة الغليان**

$\Delta T_b$  ارتفاع درجة الغليان

$\Delta T_b = K_b m$

$K_b$  ثابت الارتفاع في درجة الغليان المولالي

$m$  مولالية محلول

كما أنّ ثابت ارتفاع درجة الغليان المولالي  $K_b$  هو الفرق بين درجة غليان محلول يحتوى على  $1\text{ mol}$  من مذاب غير متطاير وغير متأين ودرجة غليان المذيب النقي. والوحدة المستعملة للتعبير عن ثابت الارتفاع في درجة الغليان المولاري هي  $\text{m}^\circ \text{C} / \text{mol}$ ، وتختلف قيمة الثابت  $K_b$  باختلاف المذيب. يبيّن الجدول 5-1 قيم  $K_b$  لعدد من المذيبات الشائعة. لاحظ أنّ قيمة  $K_b$  للماء هي  $0.512^\circ \text{C}/\text{mol}$ ؛ وهذا يعني أنّ  $1\text{ mol}$  من محلول مائي يحتوى على مذاب غير متطاير وغير متأين يغلي عند درجة حرارة  $100.512^\circ \text{C}$ ، وهذه الدرجة تزيد  $0.512^\circ \text{C}$  على درجة غليان الماء النقي  $100.0^\circ \text{C}$ .

وكما أنّ الانخفاض في الضغط البخاري خاصية جامعية فإنّ الارتفاع في درجة الغليان خاصية جامعية أيضًا. وتتناسب قيمة الارتفاع في درجة الغليان تناسبًا طرديًّا مع مولالية المذاب في محلول، أي أنه كلما زاد عدد جسيمات المذاب في محلول زاد الارتفاع في درجة الغليان. وأنّ المولالية مرتبطة مع الكسر المولى الذي يتضمن عدد جسيمات المذاب، لذا فهي تستعمل للدلالة على التركيز. ويعبر عن المذيب في المولالية بالكتلة بدلاً من الحجم. ولذلك لا تتأثر المولالية بتغيير درجة الحرارة.

ثابت الارتفاع في درجة الغليان المولالي $K_b$	الجدول 5-1
$K_b^\circ \text{C}/\text{mol}$	درجة الغليان $^\circ \text{C}$
0.512	100.0
2.53	80.1
5.03	76.7
1.22	78.5
3.63	61.7

المذيب


الماء

البنترين

رابع كلوريد الكربون

الإيثانول

الكلوروفورم



الشكل 1-20 يؤثر الضغط والحرارة في حالة المذيب النقى (الخط المتصل)، الصلبة أو السائلة أو الغازية، ويؤثراً أيضاً في محلول (الخط المتقطع).

### اختبار الرسم البياني

صف كيف يمثل الفرق بين الخطين (المتصل والمقطوع) الانخفاض في الضغط البخاري، والارتفاع في درجة الغليان، والانخفاض في درجة التجمد؟ استعمل بيانات من الرسم البياني لدعم إجابتك.

يمثل الفرق بين الخط الكامل، والمقطوع، عند حدود (السائل - الغاز)، كما يمثل الارتفاع في درجة الغليان ( $\Delta T_b$ ) الفرق بين درجة الغليان الاعتيادية على الخط الكامل، ونقطة التماثل على الخط المقطوع. وبالمثل يمثل الانخفاض في درجة التجمد ( $\Delta T_f$ ) الفرق في درجة التجمد الاعتيادية للماء

### الكيمياء في واقع الحياة

#### الانخفاض في درجة التجمد



الأسماك التي تعيش في المياه المالحة إن المحافظة على التركيز الملحي المناسب في غاية الأهمية للأسماك التي تعيش في المياه المالحة؛ فوجود الملح في المناطق القطبية من المحيط ضروري للحفاظ على المياه من التجمد، مما يسمح بالمحافظة على الحياة البحرية.

انظر إلى الشكل 1-20 ولا حظ أن المنحنى الذي يمثل محلول يقع أسفل المنحنى الذي يمثل المذيب النقى عند أي درجة حرارة.

### الانخفاض في درجة التجمد Freezing Point Depression

تترتب الجسيمات في بنية أكثر تنظيماً في الحالة الصلبة؛ أما في محلول فتعمل جسيمات المذاب على إضعاف قوى التجاذب بين جسيمات المذيب، مما يمنع المذيب من الوصول إلى الحالة الصلبة عند درجة التجمد.

وتكون درجة تجمد محلول دائمًا أقل من درجة تجمد المذيب النقى. وبيين الشكل 1-20 الفرق بين درجات الغليان والتجمد للماء النقى والمحلول المائي. وعند مقارنة الخطوط المتصلة مع المقطوعة في الرسم سوف تلاحظ أن نطاق درجة الحرارة للمحلول المائي في الحالة السائلة أكبر مما للماء النقى. وبيين الشكل 1-21 تطبيقين شائعين لاستعمال الملح لتقليل درجة تجمد محلول المائي.

**الانخفاض في درجة تجمد محلول  $\Delta T_f$**  هو درجة تجمد المذيب النقى مطروحاً منها درجة تجمد محلول الماء.

الشكل 1-21 تعلم إضافة الأملاح إلى الجليد على تقليل درجة تجمد الجليد، مما يؤدي إلى انصهار الجليد على الطرق. وتعلم إضافة الملح إلى الجليد عند صنع الآيس كريم على تقليل درجة التجمد، مما يسمح للماء الناتج بتجميد الآيس كريم.





يبين الجدول 6-1 ثابت الانخفاض في درجة التجمد المولالي ( $K_f$ ) لكثير من المذيبات. هذا وتناسب قيم الانخفاض في درجة التجمد للمواد غير المتأينة تناسياً طردياً مع مولالية محلول.

### الانخفاض في درجة التجمد

$$\Delta T_f = K_f m$$

$\Delta T_f$  درجة الحرارة  
 $K_f$  ثابت الانخفاض في درجة التجمد  
 $m$  المولالية

ثابت الانخفاض في درجة التجمد المولالي $K_f$		الجدول 6-1
$K_f$ (°C/m)	درجة التجمد °C	المذيب
1.86	0.0	الماء
5.12	5.5	البنزين
29.8	-23.0	رابع كلوريد الكربون
1.99	-114.1	الإيثanol
4.68	-63.5	الكلوروفورم

وكما هو الحال مع قيمة  $K_b$  فإن قيمة  $K_f$  تعتمد على طبيعة المذيب. ولأن ثابت انخفاض درجة التجمد للماء ( $K_f$ ) يساوي  $1.86^{\circ}\text{C}/\text{m}$  فإن محلول المائي الذي تركيزه  $1 \text{ mol/L}$  يتجمد، ويحتوي على مذاب غير متظاهر وغير متأين عند درجة  $0^{\circ}\text{C}$  - وهي أقل من درجة تجمد الماء النقى ( $0.0^{\circ}\text{C}$ ). ويعد الجليسول مذاب غير متأين، وينتجه الكثير من الأسماك والحشرات لحماية دمائها من التجمد في الشتاء القارص. كذلك فإن مقاوم التجمد أو مانع تكوين الجليد يحتوي على مذاب غير متأين، هو جليكول الإثيلين.

لاحظ أن معدلات الارتفاع في درجة الغليان والانخفاض في درجة التجمد تحدد مولالية المواد غير المتأينة. أما في حالات المواد المتأينة فيجب استعمال المولالية الفعلية للمحلول والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد جسيمات المذاب المتفككة، كما يوضّحها المثال 6-1.

تجربة عملية  
الانخفاض في درجة التجمد

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثرائية

## تجربة

### الانخفاض في درجة التجمد

كيف يمكنك قياس الانخفاض في درجة التجمد؟

### الخطوات

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.

2. املأ كأسين سعة كل منهما  $400 \text{ mL}$  بالجليد المفروم، وأضف  $50 \text{ mL}$  من مياه الصنبور البارد إلى كل من الكأسين.

3. قس درجة حرارة كل من الكأسين بمقاييس حرارة (ترمومتراً) غير زئبقي.

4. حرك محتويات كل كأس بساق مدة دقيقة واحدة، حتى تصبح درجتا حرارة الكأسين متماثلتين، وسجل درجة الحرارة.

5. أضف  $75 \text{ g}$  من ملح الطعام الخشن  $\text{NaCl}$  إلى إحدى الكأسين، وتابع التحريك في الكأسين، سوف يذوب بعض الملح.

- قارن درجة حرارة الماء والثلج بدرجة حرارة الماء والثلج المضاف إليها الملح. بم تفسر تغير درجة الحرارة؟
- فسر لماذا أضيف الملح إلى إحدى الكأسين دون الأخرى؟
- فسر الملح مادة متأينة قوية تنتج أيون الصوديوم  $\text{Na}^+$  والكلور  $\text{Cl}^-$  عندما تتفكك في الماء. فسر لماذا يعد هذا التفكك مهمًا عند حساب الانخفاض في درجة التجمد؟
- توقع هل من الأفضل استعمال الملح الخشن، أم ملح المائدة الناعم، عند صنع الآيس كريم المنزلي؟ فسر إجابتك.

الإجابة في الصفحة التالية



**1.** قارن درجة حرارة الماء والثلج بدرجة حرارة الماء والثلج المضاف

إليهما الملح. بم تفسر تغير درجة الحرارة؟

يجب أن تنخفض درجة تجمّد الماء ما بين  $6^{\circ}\text{C}$  -  $4^{\circ}\text{C}$  عند إضافة الملح، وذلك لتدخل الأيونات مع قوى التجاذب بين جزيئات الماء، ومن ثمّ تمنع الماء من التجمّد عند درجة تجمّده الاعتيادية  $0^{\circ}\text{C}$ .

**2.** فسر لماذا أضيف الملح إلى إحدى الكأسين دون الأخرى؟

يعمل الدورق الذي يحتوي على جليد فقط كمتغيّر ضابط.

**3.** فسر الملح مادة متأينة قوية تنتج أيوني الصوديوم  $\text{Na}^+$  والكلور

$\text{Cl}^-$  عندما تفكّك في الماء. فسر لماذا يعد هذا التفكّك مهمًا عند

حساب الانخفاض في درجة التجمد؟

يؤثّر عدد الجسيمات في المحلول على الخواص الجامعية للمحلول، وذلك لأنّ  $1\text{ mol}$  من كلوري الصوديوم يُنتج  $2\text{ mol}$  من الأيونات في المحلول؛ لذا يكون أثره أكبر على درجتي التجمّد والغليان من المذاب الذي يُنتج  $1\text{ mol}$  من الجسيمات في المحلول.

**4.** توقع هل من الأفضل استعمال الملح الخشن، أم ملح المائدة الناعم،

عند صنع الآيس كريم المنزلي؟ فسر إجابتك.

ملح المائدة الناعم هو الخيار الأفضل؛ لأنّه يذوب بسرعة أكبر في المياه الباردة من الملح الصخري الخشن، ومن ثمّ ينتج انخفاض في درجة التجمّد أكبر، وبطريقة أسرع.

**التغيرات في درجات التجمد والغليان** يستعمل كلوريد الصوديوم  $\text{NaCl}$  عادة لمنع تكون الجليد على الطرق وتحميد المثلجات (الآيس كريم). ما درجة الغليان وتحميد محلول مائي من كلوريد الصوديوم تركيزه  $0.029 \text{ m}$ , إذا علمت أن كلوريد الصوديوم مادة متأينة قوية؟

**1 تحليل المسألة**

أعطيت مولالية محلول الماء لكلوريد الصوديوم. احسب  $\Delta T_b$  و  $\Delta T_f$  اعتماداً على عدد الجسيمات في محلول، ثم حدد الارتفاع في درجة الغليان والانخفاض في درجة التجمد. أضف  $\Delta T_b$  إلى درجة الغليان، واطرح  $\Delta T_f$  من درجة التجمد.

**المطلوب**درجة الغليان =  ${}^{\circ}\text{C}$ درجة التجمد =  ${}^{\circ}\text{C}$ **المعطيات**المذاب = كلوريد الصوديوم  $\text{NaCl}$ المولالية =  $0.029 \text{ m}$ **2 حساب المطلوب**

احسب مولالية الجسيمات الفعلية

مولالية الجسيمات الفعلية = المولالية  $\times$  عدد جسيمات المذاب المتفككة

$$\Delta T_b = K_b m$$

ضع العلاقات الرياضية للارتفاع في درجة الغليان

$$\Delta T_f = K_f m$$

والانخفاض في درجة التجمد

$$\Delta T_b = (0.512 \text{ } {}^{\circ}\text{C}/\text{m})(0.058 \text{ m}) = 0.030 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$$

$$K_b = 0.512 \text{ } {}^{\circ}\text{C}/\text{m}, K_f = 1.86 \text{ } {}^{\circ}\text{C}/\text{m}$$

$$\Delta T_f = (1.86 \text{ } {}^{\circ}\text{C}/\text{m})(0.058 \text{ m}) = 0.11 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$$

$$m = 0.058 \text{ m}$$

احسب درجة الغليان بعد الارتفاع ودرجة التجمد بعد الانخفاض للمحلول.

$$T_b = 0.30 \text{ } {}^{\circ}\text{C} + 100.000 \text{ } {}^{\circ}\text{C} = 100.030 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$$

أضف  $\Delta T_b$  إلى درجة الغليان

$$T_f = 0.00 \text{ } {}^{\circ}\text{C} - 0.11 \text{ } {}^{\circ}\text{C} = -0.11 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$$

واطرح  $\Delta T_f$  من درجة التجمد**3 تقويم الإجابة**

تكون درجة الغليان أعلى، ودرجة التجمد أقل، كما هو متوقع.

**مسائل تدريبية**45. احسب درجة الغليان ودرجة التجمد لمحلول مائي تركيزه  $0.625 \text{ m}$  من أي مذاب غير متطاير وغير متأين.46. ما درجة غليان محلول السكروز في الإيثanol، الذي تركيزه  $0.40 \text{ m}$ ? وما درجة تجمده؟ علماً بأن السكروز مادة غير متأينة؟47. تحضير تم اختبار محلول تركيزه  $0.045 \text{ m}$  يحتوي على مذاب غير متطاير وغير متأين، ووُجد أن الانخفاض في درجة تجمده بلغ  $0.084 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$ . ما قيمة ثابت الانخفاض في درجة تجمده  $K_f$ ? وهل المذيب المكون منه محلول في هذه الحالة هو الماء أو الإيثanol أو الكلوروفورم؟**الإجابة في الصفحة التالية**

45. احسب درجة الغليان ودرجة التجمد لمحلول مائي تركيزه  $m = 0.625$  من أي مذاب غير متغاير وغير متأين.

$$\Delta T_b = K_b m$$

من المعادلة

احسب الارتفاع في درجة الغليان، ودرجة الغليان:

$$\Delta T_b = 0.512^\circ\text{C}/m \times 0.625m = 0.320^\circ\text{C}$$

$$T_b = 100^\circ\text{C} + 0.320^\circ\text{C} = 100.320^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_f = K_f m$$

ومن المعادلة

احسب الانخفاض في درجة التجمد، ودرجة التجمد:

$$\Delta T_f = 1.86^\circ\text{C}/m \times 0.625m = 1.16^\circ\text{C}$$

$$T_f = 0.0^\circ\text{C} - 1.16^\circ\text{C} = -1.16^\circ\text{C}$$

46. ما درجة غليان محلول السكروروز في الإيثانول، الذي تركيزه  $0.40\text{m}$ ؟ وما درجة تجمده؟ علماً بأن السكروروز مادة غير متأينة؟

$$\Delta T_b = K_b m$$

من المعادلة

احسب الارتفاع في درجة الغليان، ودرجة الغليان:

$$\Delta T_b = 1.22^\circ\text{C}/m \times 0.40m = 0.49^\circ\text{C}$$

$$T_b = 78.5^\circ\text{C} + 0.49^\circ\text{C} = 79.0^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_f = K_f m$$

ومن المعادلة

احسب الانخفاض في درجة التجمد، ودرجة التجمد:

$$\Delta T_f = 1.99^\circ\text{C}/m \times 0.40m = 0.80^\circ\text{C}$$

$$T_f = -114.1^\circ\text{C} - 0.80^\circ\text{C} = -114.9^\circ\text{C}$$

47. تحضير تم اختبار محلول تركيزه  $m = 0.045$  يحتوي على مذاب غير متطاير وغير متآين، ووجد أن الانخفاض في درجة تجمده بلغ  $0.084^{\circ}\text{C}$ . ما قيمة ثابت الانخفاض في درجة تجمده  $K_f$ ? وهل المذيب المكون منه محلول في هذه الحالة هو الماء أو الإيثanol أو الكلوروفورم؟

$$\Delta T_f = K_f m$$


ومن المعادلة احسب ثابت الانخفاض في درجة التجمد:

$$K_f = \frac{\Delta T_f}{m}$$

$$= \frac{0.080\ ^{\circ}\text{C}}{0.045\ m}$$

$$= 1.8\ ^{\circ}\text{C}/m$$

سيكون محلول أقرب إلى الماء؛ لأن القيمة المحسوبة قريبة من القيمة  $1.86\ ^{\circ}\text{C}/m$ .



الشكل 1-22 تنتشر المذيبات بسبب الخاصية الأسموزية من التركيز الأقل إلى التركيز أعلى خلال أغشية شبه منفذة.

## الضغط الأسموزي Osmotic Pressure

عرفت أنَّ الانتشار هو اختلاط الغازات أو السوائل، والناتج عن حركتها العشوائية. أما الخاصية **الأسموزية** فهي انتشار المذيب خلال غشاء شبه منفذ من محلول الأقل تركيزاً إلى محلول الأكثر تركيزاً. والأغشية شبه المنفذة حواجز تسمح لبعض الجسيمات بالعبور. والأغشية التي تحيط بالخلايا الحية جميعها عبارة عن أغشية شبه منفذة. وتلعب الخاصية الأسموزية دوراً مهماً في الكثير من العمليات الحيوية، ومنها امتصاص الغذاء في النباتات.

يبين الشكل 1-22 نظاماً يكون فيه محلول المخفف مفصولاً عن محلول المركز بغضائِش شبه منفذ. تتحرك جزيئات الماء خلال العملية الأسموزية في الاتجاهين عبر الغشاء، ولكن جزيئات المذاب لا تستطيع العبور. وتنتشر جزيئات الماء عبر الغشاء من محلول المخفف إلى محلول المركز. وتسمى كمية الضغط الإضافي الناتج عن انتقال جزيئات الماء إلى محلول المركز **الضغط الأسموزي**. ويعتمد الضغط الأسموزي على عدد جسيمات المذاب في كمية محددة من محلول، وهو خاصية جامعة للمحاليل.

## التقويم 1-4

### الخلاصة

- تقلل المواد المذابة غير المتطايرة الضغط البخاري للمحلول.
- يرتبط الارتفاع في درجة الغليان مباشرة بمولالية محلول.
- يكون الانخفاض في درجة التجمد للمحلول أقل من درجة تجمد المذيب النقبي.
- يعتمد الضغط الأسموزي على عدد جسيمات المذاب في حجم معين.

48. **الفكرة الرئيسية** أشرح ما المقصود بالخواص الجامعية؟
49. صُف الخواص الجامعية الأربع للمحاليل.
50. فسر لماذا يكون للمحلول درجة غليان أعلى من درجة غليان المذيب النقبي؟
51. حلّ يغلي محلول مائي من كلوريد الكالسيوم  $\text{CaCl}_2$  عند درجة حرارة  $101.3^\circ\text{C}$ . ما كتلة كلوريد الكالسيوم بالكيلوجرام التي تذوب في  $1000\text{ g}$  من المذيب؟
52. ثم احسب الانخفاض في درجة التجمد للمحلول نفسه؟ إذا علمت أن الجلوكوز مادة غير متآينة؟
53. تحقق إذا علمت أنَّ الارتفاع في درجة غليان محلول مائي لمذاب غير متآين وغير متطاير تساوي  $1.12^\circ\text{C}$ ، فما مولالية محلول؟

48. **الغريزة** اشرح ما المقصود بالخواص الجامعة؟

**تعتمد الخواص الجامعة على عدد جسيمات المذاب في محلول.**

49. صف الخواص الجامعة الأربع للمحاليل.

**الانخفاض في الضغط البخاري: الانخفاض في ضغط البخار مع زيادة جسيمات المذاب في محلول.**

**الارتفاع في درجة الغليان: زيادة درجة الحرارة مع زيادة جسيمات المذاب في محلول.**

**الانخفاض في درجة التجمد: انخفاض درجة التجمد مع نقصان جسيمات المذاب في محلول.**

**الضغط الأسموزي: تغير الضغط الأسموزي مع زيادة جسيمات المذاب في محلول.**

50. فسر لماذا يكون للمحلول درجة غليان أعلى من درجة غليان المذيب النقي؟

**تقليل جسيمات المذاب في محلول الضغط البخاري فوق محلول؛ وذلك لأن محلول يغلي عندما يتتساوى ضغطه البخاري مع الضغط الخارجي، ومن ثم ينترج عن هذا الانخفاض في البخار الحاجة إلى درجة حرارة أعلى؛ لكي يتمكن محلول من الغليان.**

## التقويم 1-4

55. حلّ يغلي محلول مائي من كلوريد الكالسيوم  $\text{CaCl}_2$  عند درجة حرارة  $101.3^\circ\text{C}$ . ما كتلة كلوريد الكالسيوم بالكيلوجرام التي تذوب في  $1000\text{ g}$  من المذيب؟

$$\Delta T_b = K_b m \quad \text{احسب المولالية}$$

$$m = \frac{NT_b}{K_b} = \frac{1.3^\circ\text{C}}{0.512^\circ\text{C}/\text{mol}}$$

$$= 2.53 \text{ mol} = 2.53 \text{ مذيب / مولات الجسيمات المذابة}$$

احسب عدد مولات  $\text{CaCl}_2$ :

$$2.53 \text{ mol particles} \times \frac{1 \text{ mol CaCl}_2}{3 \text{ mol particles}} = 0.84 \text{ mol CaCl}_2$$

احسب كتلة  $\text{CaCl}_2$  بالكيلوجرام:

$$0.84 \text{ mol CaCl}_2 \times \frac{110.98 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0.0936 \text{ kg}$$

56. ثم احسب الانخفاض في درجة التجمد للمحلول نفسه؟ إذا علمت أن الجلوكوز مادة غير متآينة؟

احسب عدد مولات  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ :

$$50.0 \text{ g C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \times \frac{1 \text{ mol}}{180.15 \text{ g}} = 0.278 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$$

احسب المولالية:

$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}} \quad \text{المولالية}$$

$$= \frac{0.278 \text{ mol C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}{0.500 \text{ kg H}_2\text{O}} = 0.556 \text{ mol/kg}$$



من المعادلة

$$\Delta T_b = K_b m$$

احسب الارتفاع في درجة الغليان، ودرجة الغليان:

$$NT_b = (0.512^{\circ}\text{C}/m)(0.556m) = 0.285^{\circ}\text{C}$$

$$T_b = 100.000^{\circ}\text{C} + 0.285^{\circ}\text{C} = 100.285^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T_f = K_f m$$

ومن المعادلة

احسب الانخفاض في درجة التجمد، ودرجة التجمد:

$$NT_f = (1.86^{\circ}\text{C}/m)(0.556m) = 1.03^{\circ}\text{C}$$

$$T_f = 0.00^{\circ}\text{C} - 1.03^{\circ}\text{C} = -1.03^{\circ}\text{C}$$

واجبات

53. تحقق إذا علمت أن الارتفاع في درجة غليان محلول مائي لمذاب غير متأين وغير متظاهر تساوي  $1.12^{\circ}\text{C}$ ، فما مولالية محلول؟


$$\Delta T_b = K_b m$$

$$1.12^{\circ}\text{C} = (0.512^{\circ}\text{C}/m) \times (m)$$

$$m = 2.19 m$$



في كيميائية المياه، مما قد يلحق ضرراً، أو يقتل المخلوقات البحرية. فعلى سبيل المثال أظهرت الشعب المرجانية المتشربة في مختلف أنحاء العالم دلائل إجهاد؛ نتيجة زيادة مستوى  $\text{CO}_2$  الذائب في الماء.



شكل 1 ترمذ الألوان الحمراء والصفراء والخضراء إلى المناطق التي فيها مستويات عالية من  $\text{CO}_2$  الذائب في الماء.

### الحزز في أعماق البحار Deep ocean sequestration

هناك اقتراح قد يقلل من كمية  $\text{CO}_2$  الجوي، ويحمي الحياة في الجزء العلوي من المحيط، وهو تسليم غاز  $\text{CO}_2$ ، ثم ضخه إلى طبقات المياه السفلية، وتسمى هذه العملية الحجز في أعماق البحار. وهناك تصور أن الضغط الشديد في الأعماق (أكبر من 3000 m) من شأنه أن يحول  $\text{CO}_2$  إلى هيدرات تذوب في أعماق مياه المحيطات، ولكن سيبقى  $\text{CO}_2$  عالقاً مئات السنين بعيداً عن الجزء العلوي للمحيط والغلاف الجوي.

### بحوث مستمرة Ongoing research

يعمل العلماء على إيجاد إجابات عن كثير من الأسئلة حول أثر  $\text{CO}_2$  في المخلوقات التي تعيش في الأعماق. ولا يزال هناك الكثير من المشاكل التقنية المتعلقة بعملية جمع  $\text{CO}_2$  وتخزينه ونقل كميات كبيرة منه. وإذا تم حل هذه المشكلات التقنية فإن على الرأي العام والمسؤولين الأخذ في الحسبان الأخطار المتعلقة بانبعاث  $\text{CO}_2$  في الهواء وفي المحيطات.

## الكتيماء

### الكتابة في

عصف ذهني! إعداد مجموعة من الأسئلة للإجابة عنها بالبحث حول حجز ثاني أكسيد الكربون في أعماق البحار.

# في الميدان

## مهن: كيميائي البيئة

### محلول $\text{CO}_2$

تشير السجلات الجيولوجية إلى أن مستويات ثاني أكسيد الكربون  $\text{CO}_2$  في الغلاف الجوي أعلى كثيراً في الوقت الحاضر مقارنة بعشرين مليون سنة مضت. وقد أسهمت صناعات الإنسان في هذه الزيادة. إلا أن  $\text{CO}_2$  لا يبقى في الغلاف الجوي إلى أجل غير مسمى؛ إذ تحتوي المحيطات بشكل طبيعي على  $\text{CO}_2$  الذي يأتي من الغلاف الجوي، ومن المخلوقات الحية. وتقوم المحيطات بامتصاص 50% من  $\text{CO}_2$  المنبعث من صناعات الإنسان. ويعتقد بعض العلماء أنه خلال ألف سنة قادمة سيذوب 90% منه في المحيطات.

### جمع البيانات عن $\text{CO}_2$ Collecting $\text{CO}_2$ data

تتأثر سرعة ذوبان  $\text{CO}_2$  في المحيطات بعدها عوامل، منها درجة الحرارة، وتركيز  $\text{CO}_2$  في الهواء والماء، واحتلاط الماء مع الهواء بسبب الرياح، وحركة الأمواج. لقد قضى فريق من الباحثين عدة سنوات لجمع وتحليل البيانات حول  $\text{CO}_2$ ، وذلك من آلاف نقاط الجمع في المحيطات حول العالم. وتوضح بيانات الشكل 1 أن شمال المحيط الأطلسي يحتوي على أكبر كمية من  $\text{CO}_2$  لكل متر مربع من سطح المحيط؛ لأن عوامل درجة الحرارة والعمق والتيارات البحرية تجعل من شمال المحيط الأطلسي ماصاً فعالاً لغاز  $\text{CO}_2$  المنبعث من صناعات الإنسان.

### جمع وتخزين $\text{CO}_2$ CO<sub>2</sub> capture and storage

هناك طريقة واحدة لتقليل كمية  $\text{CO}_2$  المنطلقة إلى الغلاف الجوي، وهي جمع وتخزين  $\text{CO}_2$  الناتج عن حرق الوقود الأحفوري. يقوم العلماء بالبحث عن احتمالية حقن  $\text{CO}_2$  الذي تم جمعه مباشرة في المحيط؛ وذلك لتسريع عملية ذوبانه؛ حيث تقلل هذه العملية من أثر الاحتباس الحراري الذي يسببها غاز  $\text{CO}_2$ . ومع ذلك فقد يؤدي اختلال التوازن الطبيعي لثاني أكسيد الكربون  $\text{CO}_2$  الذائب إلى آثار بالغة

**الكيمياء**

الكتابة في

عصف ذهني إعداد مجموعة من الأسئلة للإجابة عنها بالبحث  
حول حجز ثاني أكسيد الكربون في أعماق البحار.

تنوع الإجابات، وقد تتضمن الأسئلة الآتية: ما  
التأثيرات القصيرة والطويلة المدى الناتجة عن تعرُّض المخلوقات الحية،  
ونظام البيئة البحرية المرتفع في أعماق المحيط لتركيز عالي من  $\text{CO}_2$  لفتراتٍ  
طويلة؟ ما الفترة التي يمكن حجز  $\text{CO}_2$  السائل خلاها؟ وما العواقب  
المحتملة إذا لم تبق المستويات المرتفعة من  $\text{CO}_2$  عند أعماق تزيد عن  
 $3000\text{ m}$  لفترات طويلة جدًا؟ كيف يؤثر نقصان مستويات  $\text{CO}_2$  في  
الغلاف الجوي على المناخ العالمي؟ كيف تؤثر الأحداث الجيولوجية  
(الزلزال وحركة الصفائح) على مناطق حجز  $\text{CO}_2$ ؟

# مختبر الكيمياء

## استقصاء العوامل المؤثرة في الذائبة

**الخلفية** تتضمن عملية تحضير محلول تصادم جسيمات المذيب والمذاب. فعند إضافة مركب قابل للذوبان إلى الماء تؤثر عدة عوامل في سرعة تكوين محلول.

**سؤال** كيف تؤثر هذه العوامل في سرعة تكوين محلول؟



13. حرك محلول الرابع بالساق الزجاجي مدة دقيقة أو اثنين .
14. كرر الخطوتين 7 و 8 مع الأنوب الخامس باستعمال ماء أكثر برودة، واترك الأنوب بلا تحريرك.
15. كرر الخطوتين 7 و 8 مع الأنوب السادس باستعمال ماء ساخن، واترك الأنوب بلا تحريرك.
16. **التنظيف والتخلص من النفايات** تخلص من بقايا المواد الصلبة والمحاليل باتباع إرشادات معلمك. ونظف أدوات المختبر جميعها، وأعدها إلى أماكنها.

### التحليل والاستنتاج

1. **المقارنة** ما التأثير الذي لاحظته عند تحريرك الأنوب الثاني والرابع مقارنة بالأنبوب الأول والثالث؟
2. **الملاحظة والاستنتاج** ما العامل الذي أدى إلى تكوين محلول بسرعة في الأنوب الرابع مقارنة بالأنبوب الثاني؟
3. **إدراك النتيجة والسبب** لماذا اختلفت النتائج بين الأنابيب الثالث والرابع وال السادس؟
4. **ناقش** ما إذا كانت بياناتك قد دعمت فرضيتك.
5. **تحليل الخطأ** اعرف مصدر الخطأ الرئيس المحتمل في التجربة، واقتصر طريقة سهلة لتصحيحه.

### الاستقصاء

**التفكير الناقد** إذا أمكن رؤية نتائج هذه التجربة بالعين المجردة، فاقتصر تفسيرًا تحت مجهر (لا يمكن ملاحظته) لأنّ هذه العوامل في سرعة تكوين محلول. ماذا يحدث على مستوى الجزيئات لتسرع تكوين محلول في كل حالة؟

المواد والأدوات اللازمة
كبريتات النحاس II المائية
ماء مقطر
ملعقة
ساعة
مخبار مدرج سعته 25 mL
ساق تحرير زجاجية
مسك أنابيب

### إجراءات السلامة

### خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. صمم جدولًا لتسجيل البيانات.
3. اكتب فرضية حول ما تعرفه عن سرعة التفاعل لتفسير ما يمكن ملاحظته في خطوات العمل.
4. ضع الأنابيب الستة على حامل الأنابيب.
5. ضع بلورة منكبريتات النحاس II المائية في كل من الأنوب الأول والأنبوب الثاني.
6. استعمل الهاون والمدق لطحن بلورة أخرى، ثم اكشط المسحوق الناتج بالملعقة، وضعه في الأنوب الثالث، وكرر ذلك للأنبيب المتبقية.
7. قس 15 mL من الماء المقطر عند درجة حرارة الغرفة، ثم اسكبه في أنبوب الاختبار الأول والثاني، ثم سجل الزمن.
8. لاحظ محلول في الأنوب الأول بعد إضافة الماء مباشرة وبعد 15 دقيقة.
9. اترك الأنوب الأول دون أي حركة على حامل الأنابيب.
10. كرر الخطوتين 7 و 8 مع الأنابيب الثالث والرابع.
11. استعمل ساق التحرير الزجاجية لتحريرك أنبوب الاختبار الثاني مدة دقيقة أو اثنين.
12. اترك الأنوب الثالث دون تحريرك.



5. تحليل الخطأ اعرف مصدر الخطأ الرئيس المحتمل في التجربة، واقتراح طريقة سهلة لتصحيحه.

**المصدر الأساسي المحتمل للخطأ هو حجم البلورات ، فإذا كان حجم البلورات كثير التباين فإن النتيجة ستتغير**

### الاستقصاء

التفكير الناقد إذا أمكن رؤية نتائج هذه التجربة بالعين المجردة، فاقتراح تفسيرًا تحت مجهرى (لا يمكن ملاحظته) لأثر هذه العوامل في سرعة تكوين محلول. ماذا يحدث على مستوى الجزيئات لتسريع تكوين محلول في كل حالة؟


**تعتمد عملية تكون محلول على تفاعل المذاب والمذيب. وأية عملية من شأنها زيادة هذه التفاعلات، ستؤدي بدورها إلى زيادة معدل تكون محلول.**

1. المقارنة ما التأثير الذي لاحظته عند تحريك الأنابيب الثاني والرابع مقارنة بالأنبوب الأول والثالث؟ احتوت أنابيب الاختبار التي تم تحريكها على محاليل أغمق بشكل أوضح من الأنابوب الأول والثالث اللذين بقيا صافيين لأنهما لم يتحركا ، وقد احتوى الأنابوب الرابع على أغمق محلول

2. الملاحظة والاستنتاج ما العامل الذي أدى إلى تكوين محلول بسرعة في الأنابوب الرابع مقارنة بالأنبوب الثاني؟ كان معدل سرعة الذوبان في أنابيب الاختبار الرابع أكبر ما يمكن ، وذلك بسبب طحن البلورات؛ لأن طحن المادة الصلبة يزيد المساحة السطحية لها ، مما يسبب ذوبانها بسرعة أكبر

3. إدراك النتيجة والسبب لماذا اختلفت النتائج بين الأنابيب الثالث والرابع والسادس؟

**كان ذوبان المادة الصلبة في الأنابوب السادس هو الأسرع ، بسبب ازدياد درجة الحرارة ، بينما قلل الماء البارد في الأنابوب الخامس من سرعة ذوبان المادة الصلبة**



# دليل مراجعة الفصل

1

**الفكرة (العامة)** معظم السوائل والغازات والمواد الصلبة التي تكون عالمنا مخاليط.

## 1-1 أنواع المخاليط

### الأفكار الرئيسية

- يمكن تمييز مكونات المخلوط غير المتجانس.
- هناك نوعان من المخاليط غير المتجانسة، هما المعلق والغروي.
- الحركة البراونية حركة عشوائية لجسيمات المخلوط الغروي.
- تُظهر المخاليط الغروية والمعلقة تأثير تندال.
- قد يوجد محلول في إحدى الحالات الفيزيائية الثلاث: السائلة أو الغازية أو الصلبة، اعتماداً على الحالة الفيزيائية للمذيب.
- يمكن أن يكون المذاب في محلول غازاً أو سائلاً أو صلباً.

**الفكرة (الرئيسية)** المخلوط إما متجانسة أو غير متجانسة.

### المفردات

- المخلوط المعلق
- تأثير تندال
- المخلوط الغروي
- المادة الذائبة
- الحركة البراونية
- المادة غير الذائبة

## 1-2 تركيز محلول

### الأفكار الرئيسية

- يقاس التركيز كمّا ونوعاً.
- المولارية هي عدد مولات المذاب في 1L من محلول.
- المولالية هي نسبة عدد مولات المذاب في 1 kg من المذيب.
- عدد المولات قبل التخفيف = عدد المولات بعد التخفيف  

$$M_1V_1 = M_2V_2$$

**الفكرة (الرئيسية)** يمكن التعبير عن التركيز بدالة النسبة المئوية أو المولات.

### المفردات

- التركيز
- المولالية
- الكسر المولى
- المولارية

## 1-3 العوامل المؤثرة في الذوبان

### الأفكار الرئيسية

- تتضمن عملية الذوبان إحاطة جسيمات المذيب بجسيمات المذاب.
- يكون محلول غير مشبع أو مشبعاً أو فوق مشبع.
- ينصّ قانون هنري على أنّ ذائبية الغاز في سائل تتناسب طردياً مع ضغط الغاز فوق السائل عند درجة حرارة معينة.

**الفكرة (الرئيسية)** يتتأثر تكوين محلول بعوامل، منها الحرارة والضغط والقطبية.

### المفردات

- الذوبان
- محلول المشبع
- حرارة الذوبان
- محلول فوق المشبع
- قانون هنري

## 1-4 الخواص الجامدة للمحاليل

### الأفكار الرئيسية

- تقلل المواد المذابة غير المتطايرة الضغط البخاري للمحلول.
- يرتبط الارتفاع في درجة الغليان مباشرةً بمولالية محلول.
- يكون الانخفاض في درجة التجمد للمحلول أقل من درجة تجمد المذيب النقي.
- يعتمد الضغط الأسموزي على عدد جسيمات المذاب في حجم معين.

**الفكرة (الرئيسية)** تعتمد الخواص الجامدة على عدد جسيمات المذاب في محلول.

### المفردات

- الخواص الجامدة
- الخاصية الأسموزية
- الانخفاض في الضغط البخاري
- الارتفاع في درجة الغليان
- الضغط الأسموزي
- الانخفاض في درجة التجمد

## 1-1

اتقان المفاهيم

58. سُمٌّ مخلوطاً غرويًّا مكوناً من غاز مذاب في سائل؟

**قد تتضمن إجابات الطلاب الكريمة المخوقة، وبياض البيض المخفوق.**

59. تبييلة السلطة ما نوع الخليط غير المتجانس الموضح في الشكل 23-1؟ وما الخصائص التي اعتمدت عليها في تصنيفك؟



الشكل 23-1

**المخلوط المعلق، وتترسب مكوناته في قعر الدورق إذا ترك دون تحريك.**

60. ما الذي يسبب الحركة البراونية في المخلوط الغروي؟

**تنتج الحركة العشوائية لجسيمات المخلوط الغروي عن اصطدام الجسيمات معاً.**

54. وضح المقصود بالعبارة "ليست كل المخالفات محاليل".

**قد تكون المحاليل مخالفات متجانسة منتظمة التركيب وبحالة فيزيائية واحدة. وقد تكون المخالفات غير متجانسة؛ إذ يمكن تمييز مكوناتها.**

55. ما الفرق بين المذاب والمذيب؟

**يُعد المذاب المادة التي تتم إذابتها، في حين يُعد المذيب المادة التي يذوب فيها المذاب.**

56. ما المخلوط المعلق؟ وفيما يختلف عن المخلوط الغروي؟

**المخلوط المعلق مخلوط غير متجانس؛ حيث تترسب جسيمات المذاب إذا لم يحرك. كما تكون جسيمات المذاب في المخلوط الغروي أصغر كثيراً من جسيمات المذاب في المخلوط المعلق ولا تترسب.**

57. كيف يستخدم تأثير تندال للتمييز بين المخلوط الغروي والمحلول؟ لماذا؟

**تكون الحزمة الضوئية مرئية في المخلوط الغروي ولكنها لا تُرى في محلول؛ وذلك لكون جسيمات المخلوط الغروي كبيرة بصورة كافية لتشتيت الضوء (ظاهرة تندال).**

## 1-2

اتقان المفاهيم

61. ما الفرق بين النسبة المئوية بالكتلة والنسبة المئوية بالحجم؟

**النسبة المئوية بالكتلة هي النسبة بين كتلة المذاب والكتلة الكلية للمحلول. أما النسبة المئوية بالحجم فهي النسبة بين حجم المذاب والحجم الكلي للمحلول.**

**إتقان حل المسائل**

66. وفق خطوات العمل في تجربة مختبرية، قمت بخلط 25.0 g من  $MgCl_2$  مع 550 mL من الماء. ما النسبة المئوية بالكتلة لكلوريد الماغنيسيوم  $MgCl_2$  في محلول؟

$$\frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{كتلة محلول}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية بالكتلة}$$

$$= \frac{25.0 \text{ g } MgCl}{25.0 \text{ g } MgCl + 550 \text{ g } H_2O} \times 100\% = 4.3\%$$

67. ما كمية  $LiCl$  بالجرامات الموجودة في 275 g من محلول المائي الذي تركيزه 15%؟

$$LiCl = \frac{275 \text{ g} \times 15}{100} = \text{كتلة} = 41 \text{ g}$$

68. إذا كنت ترغب في تحضير كمية كبيرة من محلول  $HCl$  بتركيز 5%， ولديك 25 mL  $HCl$  فقط، فما أقصى حجم محلول 5% يمكن تحضيره؟

$$= \frac{25 \text{ mL } HCl}{5} \times 100\% = \text{حجم محلول} = 500 \text{ mL}$$

69. احسب النسبة المئوية بالحجم لمحلول يحضر بإضافة 75 mL من حمض الإيثانويك إلى 725 mL من الماء.

$$\frac{\text{حجم المذاب}}{\text{حجم محلول}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية بالحجم}$$

$$= \frac{75 \text{ mL } CH_3COOH}{75 \text{ mL } CH_3OOH + 725 \text{ mL } H_2O} \times 100\% = 9.4\%$$

62. ما الفرق بين المolarية والمولالية؟

المolarية هي تركيز محلول معبراً عنه بعدد مولات المذاب في حجم محلول باللتر، في حين تعبّر المولالية عن التركيز بعدد مولات المذاب في كل كيلوجرام من المذيب. ولا تعتمد المولالية على درجة حرارة محلول.

63. ما العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند إعداد محلول مخفف من محلول قياسي؟

**تُكتب مolarية وحجم محلولين المركّز والمخفف في صورة المعادلة الآتية :**

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

64. كيف يختلف محلولان من  $NaCl$  تركيز أحدهما 0.5 M والأخر 2.0 M؟

يحتوي محلول  $NaCl$  الذي تركيزه 2 M عدداً أكثر من المولات مقارنة بمحلول تركيزه 0.5 M.

65. تحت أي ظروف يمكن للكيميائي وصف محلول بدلالة المولالية؟ ولماذا؟

تحت شروط تغيير درجة الحرارة؛ لأن المولالية تعتمد على الكتلة ولا تتغير مع درجة الحرارة.

72. ما عدد مولات BaS اللازمة لتحضير محلول حجمه  $10^3 \times 1.5 \text{ mL}$  وتركيزه  $M$ ؟

حول الحجم إلى وحدة L:

$$1.5 \times 10^3 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 1.5 \text{ L}$$

احسب عدد مولات BaS:

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}} = \frac{\text{المolarية}}{\text{}}$$

$$\text{mol BaS} = \frac{10.0 \text{ mol}}{1 \text{ L}} \times 1.5 \text{ L} = 15 \text{ mol}$$

73. ما كتلة  $\text{CaCl}_2$  بالجرامات اللازمة لتحضير محلول حجمه  $2.0 \text{ L}$  وتركيزه  $3.5 \text{ M}$ ؟

احسب عدد مولات  $\text{CaCl}_2$ :

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}} = \frac{\text{المolarية}}{\text{}}$$

$$\text{mol CaCl}_2 = \frac{3.5 \text{ mol}}{1 \text{ L}} \times 2.0 \text{ L} = 7.0 \text{ mol CaCl}_2$$

احسب كتلة  $\text{CaCl}_2$ :

$$\text{كتلة CaCl}_2 = 7.0 \text{ mol CaCl}_2 \times \frac{110.1 \text{ g CaCl}_2}{1 \text{ mol CaCl}_2} = 770 \text{ g}$$

70. احسب مolarية محلول يحتوي على 15.7 g من  $\text{CaCO}_3$  الذائب في 275 mL من الماء.

احسب عدد مولات  $\text{CaCO}_3$ :

$$\text{mol CaCO}_3 = 15.7 \text{ g CaCO}_3 \times \frac{1 \text{ mol CaCO}_3}{100.01 \text{ g CaCO}_3} = 0.157 \text{ mol CaCO}_3$$

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}} = \frac{\text{المolarية}}{\text{}}$$

$$= \frac{0.157 \text{ mol CaCO}_3}{0.275 \text{ L}} = 0.571 \text{ M}$$

71. ما حجم محلول تركيزه 3.00 M تم تحضيره بإذابة 122 g LiF

احسب عدد مولات LiF:

$$\text{mol LiF} = 122 \text{ g LiF} \times \frac{1 \text{ mol LiF}}{25.9 \text{ g LiF}} = 4.71 \text{ mol LiF}$$

$$M = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}} = \frac{\text{المolarية}}{\text{}}$$

$$= \frac{4.71 \text{ mol}}{3.00 \text{ M}} = 1.57 \text{ L}$$



$$0.083 \text{ L HCl} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 83 \text{ mL HCl}$$

$$V_1 = \frac{1.5 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L}}{12 \text{ mol/L}} = 0.13 \text{ L HCl}$$

$$0.13 \text{ L HCl} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 130 \text{ mL HCl}$$

$$V_1 = \frac{2.0 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L}}{12 \text{ mol/L}} = 0.17 \text{ L HCl}$$

$$0.17 \text{ L HCl} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 170 \text{ mL HCl}$$

$$V_1 = \frac{5.0 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L}}{12 \text{ mol/L}} = 0.42 \text{ L HCl}$$

$$0.42 \text{ L HCl} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 420 \text{ mL HCl}$$

74. غالباً ما تحضر محليلات قياسية مختلفة التراكيز من HCl لتنفيذ التجارب. أكمل الجدول 7-1 بحساب حجم المحلول المركز أو المحلول الذي تركيزه 12 M من حمض الهيدروكلوريك اللازم لتحضير 1.0 L من محلول HCl باستعمال قيم المolarية المدونة في الجدول.

جدول 1-7 محليلات	
12 M HCl حجم محلول القياسي بوحدة mL	HCl مolarية
42 mL	0.5
83 mL	1.0
130 mL	1.5
170 mL	2.0
420 mL	5.0

من المعادلة:

احسب الحجم الابتدائي بوحدة L، ثم حوله إلى mL لكل محلول:

$$V_1 = \frac{0.50 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L}}{12 \text{ mol/L}} = 0.042 \text{ L HCl}$$

$$0.042 \text{ L HCl} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 42 \text{ mL HCl}$$

$$V_1 = \frac{1.0 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L}}{12 \text{ mol/L}} = 0.083 \text{ L HCl}$$

1

## تقدير الفصل

78. إذا خفت 20.0 mL من محلول تركيزه 3.5 M لتحضير محلول حجمه 100.0 mL، فما مolarية محلول بعد التخفيف؟

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$M_2 = \frac{3.5 \text{ M} \times 20 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} = 0.70 \text{ M}$$

79. ما مolarية محلول يحتوي على 75.3 g من KCl مذابة في 95.0 g من الماء؟

احسب عدد مولات KCl:

$$\text{mol KCl} = 75.3 \text{ g KCl} \times \frac{1 \text{ mol KCl}}{74.6 \text{ g KCl}} = 1.01 \text{ mol KCl}$$

احسب حجم  $\text{H}_2\text{O}$ :

$$95.0 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0.0950 \text{ kg H}_2\text{O}$$

احسب المolarية:

$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{المolarية}} = \frac{(\text{mol})}{(\text{kg})}$$

$$m = \frac{1.01 \text{ mol KCl}}{0.0950 \text{ kg H}_2\text{O}} = 10.6 \text{ m}$$

75. كم تحتاج من حمض النيتريل (mL) الذي تركيزه 5.0 M لتحضير 225 mL  $\text{HNO}_3$  تركيزه 1.0 M؟

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$V_{\text{HNO}_3} = 1.0 \text{ M} \times \frac{225 \text{ mL}}{5.0 \text{ M}}$$

$$V_{\text{HNO}_3} = 45 \text{ mL}$$

76. تجربة إذا قمت بتخفيف 55 mL من محلول تركيزه 4.0 M لتحضير محلول مخفف حجمه 250 mL، فاحسب مolarية محلول الجديد.

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$M_2 = \frac{4.0 \text{ M} \times 55 \text{ mL}}{250 \text{ mL}} = 0.88 \text{ M}$$

77. ما حجم حمض الفوسفوريك (بوحدة mL) الذي تركيزه 3.0 M، والذي يمكن تحضيره من 95 mL من محلول  $\text{H}_3\text{PO}_4$  تركيزه 5.0 M؟

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$V_2 = \frac{5.0 \text{ M} \times 95 \text{ mL}}{3.0 \text{ M}} = 160 \text{ mL}$$

1

## تقدير الفصل

82. ما المولالية والكسر المولي لمذاب يحتوي على 35.5%  $\text{HCOOH}$  بالكتلة من محلول حمض الميثانويك

$$\frac{35.5 \text{ g HCOOH}}{100.0 \text{ g محلول}}$$

تُشير 35.5% إلى:

:  $\text{HCOOH}$  احسب عدد مولات

$$35.5 \text{ g HCOOH} \times \frac{1 \text{ mol HCOOH}}{46.03 \text{ g HCOOH}} = 0.771 \text{ mol HCOOH}$$

احسب كتلة  $\text{H}_2\text{O}$  بالكيلوجرام kg  
 $\text{H}_2\text{O} = 100.0 \text{ g} - 35.5 \text{ g} = 64.5 \text{ g}$   
 $= 6.45 \times 10^{-2} \text{ kg}$

:  $\text{H}_2\text{O}$  احسب عدد مولات

$$\text{moles H}_2\text{O} = 64.5 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18.02 \text{ g H}_2\text{O}} = 3.58 \text{ mol H}_2\text{O}$$

احسب المولالية :

$$m = \frac{\text{(mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}} = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{كتلة المذيب}}$$

$$= \frac{0.771 \text{ mol HCOOH}}{6.45 \times 10^{-2} \text{ kg H}_2\text{O}} = 12.0 m$$

:  $\text{HCOOH}$  احسب الكسر المولي

$$X_{\text{HCOOH}} = \frac{n_{\text{HCOOH}}}{n_{\text{HCOOH}} + n_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$= \frac{0.771 \text{ mol}}{0.771 \text{ mol} + 3.58 \text{ mol}} = 0.177$$

80. ما كتلة  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  (بوحدة g) التي يجب إذابتها في 155 g من الماء لعمل محلول تركيزه 8.20 mol/kg

احسب كتلة  $\text{H}_2\text{O}$  بالكيلوجرام kg

$$155 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0.155 \text{ kg H}_2\text{O}$$

احسب عدد مولات  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ :

$$\text{mol Na}_2\text{CO}_3 = \frac{8.20 \text{ mol}}{\text{kg}} \times 0.155 \text{ kg} = 1.27 \text{ mol}$$

احسب كتلة  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ :

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 = 1.27 \text{ mol Na}_2\text{CO}_3 \times \frac{83.00 \text{ g Na}_2\text{CO}_3}{\text{mol Na}_2\text{CO}_3} = 105 \text{ g}$$

81. ما مولالية محلول يحتوي على 30.0 g من النفاثلين  $\text{C}_{10}\text{H}_8$  الذائب في 500 g من التولوين?

احسب عدد مولات  $\text{C}_{10}\text{H}_8$ :

$$30.0 \text{ g C}_{10}\text{H}_8 \times \frac{1 \text{ mol C}_{10}\text{H}_8}{128 \text{ g C}_{10}\text{H}_8} = 0.234 \text{ mol C}_{10}\text{H}_8$$

احسب كتلة المذيب (الطلوين) بالكيلوجرام:

$$500.0 \text{ g} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0.5000 \text{ kg}$$

احسب المولالية:

$$m = \frac{\text{(mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}} = \frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{كتلة المذيب}}$$

$$m = \frac{0.234 \text{ mol C}_{10}\text{H}_8}{0.5000 \text{ kg}} = 0.468 m$$

1

## تقدير الفصل

84. احسب الكسر المولي ل محلول  $MgCl_2$  الناتج عن إذابة 132.1 g  $MgCl_2$  في 175 mL من الماء؟

احسب عدد مولات  $MgCl_2$ :

$$132.1 \text{ g } MgCl_2 \times \frac{1 \text{ mol } MgCl_2}{95.21 \text{ g}} = 1.387 \text{ mol } MgCl_2$$

احسب عدد مولات  $H_2O$ :

$$175 \text{ mL } H_2O \times \frac{1.0 \text{ g } H_2O}{1 \text{ mL } H_2O} \times \frac{1 \text{ mol } H_2O}{18.0 \text{ g } H_2O}$$

$$= 9.72 \text{ mol } H_2O$$

احسب الكسر المولي ل  $MgCl_2$ :

$$X_{MgCl_2} = \frac{n_{MgCl_2}}{n_{MgCl_2} + n_{H_2O}}$$

$$X_{MgCl_2} = \frac{1.387 \text{ mol } MgCl_2}{1.387 \text{ mol } MgCl_2 + 9.72 \text{ mol } H_2O} = 0.125$$

1-3


اتقان المفاهيم

85. صُفِّ عمليَّة الذوبان.

تُحاط جسيمات المذاب بجسيمات المذيب الموضع فيه، ويعود السبب في ذلك إلى التجاذب القائم بين جسيمات المذيب والمذاب التي تعمل على تشتت جسيمات المذاب وانتشارها في المحلول.

86. اذكر ثلاثة طرائق لزيادة سرعة الذوبان، زيادة درجة حرارة المذيب، وزيادة مساحة سطح المذاب، والتحريك.

83. استعن بالشكل 1-24، واحسب الكسر المولي لحمض الكبريتيك  $H_2SO_4$  في المحلول.



الشكل 1-24

احسب عدد مولات  $H_2SO_4$ :

$$27.3 \text{ g } H_2SO_4 \times \frac{1 \text{ mol } H_2SO_4}{97.1 \text{ g } H_2SO_4} = 0.281 \text{ mol } H_2SO_4$$

احسب عدد مولات  $H_2O$ :

$$72.7 \text{ g } H_2O \times \frac{1 \text{ mol } H_2O}{18.02 \text{ g } H_2O} = 4.034 \text{ mol } H_2O$$

احسب الكسر المولي ل  $H_2SO_4$ :


$$X_{H_2SO_4} = \frac{n_{H_2SO_4}}{n_{H_2SO_4} + n_{H_2O}}$$

$$X_{H_2SO_4} = \frac{0.281 \text{ mol } H_2SO_4}{0.281 \text{ mol } H_2SO_4 + 4.034 \text{ mol } H_2O} = 0.0650$$

1

## تقدير الفصل

91. استعن بالشكل 1-25 لمقارنة ذائبية بروميد البوتاسيوم KBr ونترات البوتاسيوم  $\text{KNO}_3$  عند درجة حرارة  $80^\circ\text{C}$ .



الشكل 1-25

ذائبية KBr هي  $95\text{g}/100\text{g H}_2\text{O}$  في حين تساوي ذائبية  $\text{KNO}_3$  الضعف عند درجة الحرارة نفسها وتتساوى ذائبية  $\text{NaClO}_2$  و  $\text{NaCl}$  بـ  $170\text{g}/100\text{g H}_2\text{O}$  تقريباً.

185 kPa

92. استعن بقانون هنري لإكمال الجدول 1-8

جدول 1-8 الذائبية والضغط

الضغط kPa	الذائبية g/L
25	2.9
32	3.7
39	4.5

$$\frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2} \quad \text{من المعادلة احسب الضغط}$$

$$P_2 = \frac{32 \text{ kPa} \times 2.9 \text{ g/L}}{3.7 \text{ g/L}}$$

$$P_2 = 25 \text{ kPa}$$

ثُم احسب الذائبية:

$$S_2 = \frac{3.7 \text{ g/L} \times 39 \text{ kPa}}{32 \text{ kPa}}$$

$$S_2 = 4.5 \text{ g/L}$$

87. أشرح الفرق بين المحاليل المشبعة والمحاليل غير المشبعة.

تحتوي محلول المشبع على أكبر كتلة من المذاب عند مجموعة من الشروط المعطاة، ويحتوي محلول غير المشبع على كتلة أقل من الكتلة التي يستطيع إذابتها.

## إتقان حل المسائل

88. إذا كانت ذائبية غاز تساوي  $0.54 \text{ g/L}$  عند ضغط مقداره  $1.5 \text{ atm}$  فاحسب ذائبية الغاز عند مضاعفة الضغط.

$$\text{من المعادلة } \frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2} \text{ احسب الذائبية:}$$

$$S_2 = \frac{0.54 \text{ g/L} \times 3.0 \text{ atm}}{1.5 \text{ atm}} = 1.08 \text{ g/L}$$

89. ذائبية غاز تساوي  $9.5 \text{ g/L}$  عند ضغط  $4.5 \text{ atm}$ . ما كمية الغاز بالجرامات التي تذوب في  $1 \text{ L}$  إذا تم تخفيض الضغط إلى  $3.5 \text{ atm}$ .

$$\text{من المعادلة } \frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2} \text{ احسب الذائبية:}$$

$$S_2 = \frac{9.5 \text{ g/L} \times 3.5 \text{ atm}}{4.5 \text{ atm}} = S_2 = 7.4 \text{ g/L}$$

90. ذائبية غاز تساوي  $1.80 \text{ g/L}$  عند ضغط مقداره  $37.0 \text{ kPa}$ . ما قيمة الضغط التي تصبح عندها الذائبية  $9.00 \text{ g/L}$ .

$$\text{من المعادلة } \frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2} \text{ احسب الضغط}$$

$$P_2 = \frac{37.0 \text{ kPa} \times 9.00 \text{ g/L}}{1.80 \text{ g/L}} = 185 \text{ kPa}$$

# تقويم الفصل

1

95. استعمل مصطلحي (المرّكز والمخفّف) لمقارنة المحلول على طرفي غشاء شبه منفذ.

إذا كان هناك اختلاف في التركيز، فسيكون المحلول أقل تركيزاً عند جهة من الغشاء وأكثر تركيزاً في الجهة الأخرى.

96. حدد كل متغير في المعادلة الآتية:  $\Delta T_b = K_b m$ .

تمثّل  $\Delta T_b$  الفرق بين درجات غليان المحلول والمذيب النقي، في حين يمثّل  $K_b$  الثابت المولالي لارتفاع درجة الغليان، أمّا  $m$  فتمثّل مولالية المحلول.

97. ما المقصود بالضغط الأسموزي؟ ولماذا يعد خاصية جامعية؟

الضغط الأسموزي هو الضغط المبذول من قبل جزيئات الماء التي تتحرّك إلى داخل المحلول من خلال الخاصية الأسموزية. حيث يُعدّ الضغط الأسموزي خاصية جامعية؛ لأنّه يعتمد على عدد جسيمات المذاب الذائبة في المحلول.

93. المشروبات الغازية الضغط الجزئي لغاز  $CO_2$  داخل زجاجة مشروب غازي هو  $4.0\text{ atm}$  عند درجة حرارة  $25^\circ C$ . إذا كانت ذائبية  $CO_2$  تساوي  $0.12\text{ mol/L}$  وعند فتح الزجاجة ينخفض الضغط الجزئي إلى  $3.0 \times 10^{-4}\text{ atm}$ ، فما ذائبية  $CO_2$  في الزجاجة المفتوحة؟ عبر عن إجابتك بوحدة  $\text{g/L}$ .

من المعادلة  $\frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2}$  احسب الذائبية بالمولات:

$$S_2 = \frac{(0.12\text{ mol/L})(3.0 \times 10^{-4}\text{ atm})}{4.0\text{ atm}}$$
$$= 9.0 \times 10^{-6}\text{ mol/L } CO_2$$

ثم احسب الذائبية بالجرامات:

$$\frac{9.0 \times 10^{-6}\text{ mol } CO_2}{1\text{ L}} \times \frac{44.01\text{ g } CO_2}{1\text{ mol } CO_2}$$
$$= 4.0 \times 10^{-4}\text{ g/L } CO_2$$

1-4

اتقان المفاهيم

94. عرف الخاصية الجامعية.

الخاصية الفيزيائية للمحلول التي تتأثر بعدد جسيمات المذاب وليس بطبعتها. ومن الأمثلة عليها: انخفاض الضغط البخاري، ارتفاع درجة الغليان، انخفاض درجة التجمد، الضغط الأسموزي.

# تقويم الفصل

1

## اتقان حل المسائل

- .99. إذا قمت بإذابة 179 g من  $\text{MgCl}_2$  في 1.00 L ماء ، فاستعن بالجدول 1-6 على إيجاد درجة التجمد للمحلول . إذا علمت أن كلوريد الماغنيسيوم مادة متآينة قوية .

احسب عدد مولات  $\text{MgCl}_2$

$$\text{mol MgCl}_2 = \frac{179 \text{ g MgCl}_2}{95.3 \text{ g/mol}} = 1.88 \text{ mol MgCl}_2$$

احسب كتلة  $\text{H}_2\text{O}$  بالكيلوجرام :

$$\begin{aligned} \text{كتلة H}_2\text{O} &= 1.00 \text{ L H}_2\text{O} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ mL H}_2\text{O}} \\ &\times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 1.00 \text{ kg H}_2\text{O} \end{aligned}$$

احسب مولالية محلول :

$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}} = \frac{\text{المولالية}}{\text{كتلة المذيب}}$$

$$= \frac{1.88 \text{ mol MgCl}_2}{1 \text{ kg H}_2\text{O}} = 1.88 \text{ m}$$

احسب مولالية الجسم :

$$m = 1.88 \text{ m} \times 3 = 5.64 \text{ m}$$

$$\Delta T_f = K_f m$$

ومن المعادلة

احسب الانخفاض في درجة التجمد، ودرجة التجمد :

$$\Delta T_f = 1.86^\circ\text{C/m} \times 5.64 \text{ m} = 10.5^\circ\text{C}$$

$$T_f = 0.0^\circ\text{C} - 10.5^\circ\text{C} = -10.5^\circ\text{C}$$

- .98. احسب درجة التجمد للمحلول يحتوي على 12.1 g من النفالين غير المتآين  $\text{C}_{10}\text{H}_8$  الذائب في 0.175 kg من البنزين  $\text{C}_6\text{H}_6$  . استعن بالجدول 1-6 .

ثابت الانخفاض في درجة التجمد المولالي $K_f$	الجدول 1-6	
$K_f (\text{ }^\circ\text{C}/\text{m})$	درجة التجمد ${}^\circ\text{C}$	المذيب
1.86	0.0	الماء
5.12	5.5	البنزين
29.8	-23.0	رابع كلوريد الكربون
1.99	-114.1	الإيثانول
4.68	-63.5	الكلوروفورم

احسب عدد مولات  $\text{C}_{10}\text{H}_8$  :

$$\begin{aligned} \text{mol C}_{10}\text{H}_8 &= 12.1 \text{ g C}_{10}\text{H}_8 \times \frac{1 \text{ mol C}_{10}\text{H}_8}{128.08 \text{ g C}_{10}\text{H}_8} \\ &= 0.0945 \text{ mol C}_{10}\text{H}_8 \end{aligned}$$

احسب المولالية :

$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}} = \frac{\text{المولالية}}{\text{كتلة المذيب}}$$

$$= \frac{0.0945 \text{ mol C}_{10}\text{H}_8}{0.175 \text{ kg C}_6\text{H}_6} = 0.540 \text{ m}$$

$$\Delta T_f = K_f m$$

ومن المعادلة

احسب الانخفاض في درجة التجمد، ودرجة التجمد :

$$\Delta T_f = 5.12^\circ\text{C/m} + 0.540 \text{ m} = 2.76^\circ\text{C}$$

$$T_f = 5.5^\circ\text{C} - 2.76^\circ\text{C} = 2.74^\circ\text{C}$$

## 1

## تقويم الفصل

لأيونات كل من  $\text{Na}^+$  و  $\text{Cl}^-$ .

**احسب مولالية محلول:**

$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}} = \frac{12.5 \text{ g NaCl}}{0.750 \text{ L H}_2\text{O}} = 16.67 \text{ mol NaCl/L}$$

$$= \frac{2.69 \text{ mol NaCl}}{1 \text{ kg H}_2\text{O}} = 2.69 \text{ m}$$

**احسب كتلة  $\text{NaCl}$ :**

$$\text{كتلة NaCl} = \frac{2.69 \text{ mol NaCl}}{1 \text{ kg H}_2\text{O}} \times \frac{58.44 \text{ g NaCl}}{1 \text{ mol NaCl}}$$

$$= 157 \text{ g NaCl / 1 kg H}_2\text{O}$$

100. الطبخ يقوم طباخ بتحضير محلول بإضافة 12.5 g من  $\text{NaCl}$  إلى وعاء يحوي 0.750 L من الماء. عند أي درجة حرارة يغلي محلول في الوعاء؟ استعن بالجدول 6-1.

**احسب عدد مولات  $\text{NaCl}$ :**

$$\text{mol NaCl} = \frac{12.5 \text{ g NaCl}}{58.44 \text{ g/mol}} = 0.214 \text{ mol NaCl}$$

**احسب كتلة  $\text{H}_2\text{O}$  بالكيلوجرام:**

$$\text{كتلة H}_2\text{O} = 0.750 \text{ L H}_2\text{O} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ mL H}_2\text{O}}$$

$$\times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0.750 \text{ kg H}_2\text{O}$$

**احسب مولالية محلول:**

$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}} = \frac{0.214 \text{ mol NaCl}}{0.750 \text{ kg H}_2\text{O}} = 0.285 \text{ m}$$

101. المثلجات (آيس كريم) يستعمل خليط الملح  $\text{NaCl}$  والثلج والماء لتبريد الحليب والكريما لصنع مثلجات (آيس كريم) متزلية. ما كمية الملح بالجرامات التي يجب إضافتها إلى الماء لتخفيض درجة التجمد  $10.0^\circ\text{C}$ ؟

$$\Delta T_b = K_b m$$

**احسب المولالية:**

$$m = \frac{\Delta T_f}{K_f} = \frac{10.0^\circ\text{C}}{1.86^\circ\text{C/m}} = 5.38 \text{ m}$$



احسب مولالية الجسم:

$$m = 0.974 m + 1 = 0.974 m$$

$$\Delta T_b = K_b m \quad \text{من المعادلة}$$

احسب الارتفاع في درجة الغليان ودرجة الغليان:

$$\Delta T_b = 0.512^\circ\text{C}/m + 0.974m = 0.310^\circ\text{C}$$

$$T_b \text{ CCl}_4 = 100.0^\circ\text{C} + 0.310^\circ\text{C} = 100.31^\circ\text{C}$$

سيكون  $50\text{ g}$  من  $\text{SrCl}_2$  تأثير أكبر.

103. استعمل معرفتك بالقطبية والذائية لتوقع ما إذا كان الذوبان ممكناً في كل من الحالات الموضحة في الجدول 9-1. فسر إجابتك.

جدول 9-1 هل الذوبان ممكن؟

مذيب	مذاب
$\text{H}_2\text{O}$ سائل	صلب $\text{MgCl}_2$
$\text{C}_6\text{H}_6$ سائل	سائل $\text{NH}_3$
سائل $\text{H}_2\text{O}$	غاز $\text{H}_2$
سائل $\text{Br}_2$	سائل $\text{I}_2$

$\text{C}_6\text{H}_{6(1)} \rightleftharpoons \text{NH}_{3(1)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{MgCl}_{2(s)}$ : لا.  $\text{H}_2\text{O}_{(1)} \rightleftharpoons \text{H}_{2(g)}$ : نعم.  $\text{Br}_{2(1)} \rightleftharpoons \text{I}_{2(1)}$ : لا.  $\text{H}_2\text{O}_{(1)} \rightleftharpoons \text{H}_{2(g)}$ : نعم.

هذه التوقعات مبنية على القاعدة العامة «المذيب يذيب شبيهه»؛ فالمذيب القطبي كالماء سوف يذيب مذاباً قطبياً مثل كلوريد الماغنيسيوم، في حين يذيب المذيب غيرقطبي مثل سائل البروم مذاباً غيرقطبياً مثل سائل اليود. وتعد الأمونيا جزيئاً قطبياً، في حين يُعد البنزين غيرقطبياً. أما جزيء الماء فيُعد جزيئاً قطبياً في حين يكون الهيدروجين الثنائي الذرة غيرقطبياً.

### مراجعة عامة

102. أي مذاب له أكبر تأثير في درجة غليان  $1.00\text{ kg}$  من الماء:  $50\text{ g}$  من كلوريد الإستراسيوم  $\text{SrCl}_2$  أم  $150\text{ g}$  من رابع كلوريد الكربون  $\text{CCl}_4$ ? فسر إجابتك.



احسب عدد مولات:

$$\text{mol SrCl}_2 = \frac{50.0 \text{ g mol SrCl}_2}{158.6 \text{ g mol SrCl}_2} = 0.315 \text{ mol SrCl}_2$$

احسب مولالية محلول:

$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}} \text{ المولالية}$$

$$= \frac{0.315 \text{ mol}}{1.00 \text{ kg}} = 0.315 \text{ m}$$

احسب مولالية الجسم:

$$m = 0.315 m + 3 = 0.945 m$$

$$\Delta T_b = K_b m$$

من المعادلة احسب الارتفاع في درجة الغليان ودرجة الغليان:

$$\Delta T_b = 0.512^\circ\text{C}/m + 0.945m = 0.484^\circ\text{C}$$

$$T_b \text{ SrCl}_2 = 100.0^\circ\text{C} + 0.484^\circ\text{C} = 100.484^\circ\text{C}$$



احسب عدد مولات:

$$\text{mol CCl}_4 = \frac{150.0 \text{ g mol CCl}_4}{154 \text{ g mol CCl}_4} = 0.974 \text{ mol CCl}_4$$

احسب مولالية محلول:


$$m = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}} \text{ المولالية}$$

$$= \frac{0.974 \text{ mol}}{1.00 \text{ kg}} = 0.974 \text{ m}$$

# تقويم الفصل

1

106. يبين الشكل 1-26 النسب المئوية لمكونات عينة من الهواء. احسب الكسر المولى لكل غاز في العينة.



الشكل 1-26

احسب عدد مولات كل من  $N_2$ ,  $O_2$ , و  $Ar$ :

$$78.0 \text{ g } N_2 + \frac{1 \text{ mol } N_2}{28.0 \text{ g } N_2} = 2.79 \text{ mol } N_2$$

$$21.0 \text{ g } O_2 + \frac{1 \text{ mol } O_2}{32.0 \text{ g } O_2} = 0.656 \text{ mol } O_2$$

$$1.00 \text{ g } Ar + \frac{1 \text{ mol } Ar}{39.9 \text{ g } Ar} = 0.0251 \text{ mol } Ar$$

احسب الكسر المولى لكل من  $N_2$ ,  $O_2$ , و  $Ar$ :

$$X_{N_2} = \frac{2.79 \text{ mol } N_2}{2.79 \text{ mol } N_2 + 0.656 \text{ mol } O_2 + 0.0251 \text{ mol } Ar}$$

$$= 0.804$$

$$X_{O_2} = \frac{0.656 \text{ mol } O_2}{2.79 \text{ mol } N_2 + 0.656 \text{ mol } O_2 + 0.0251 \text{ mol } Ar}$$

$$= 0.189$$

$$X_{Ar} = \frac{0.0251 \text{ mol } Ar}{2.79 \text{ mol } N_2 + 0.656 \text{ mol } O_2 + 0.0251 \text{ mol } Ar}$$

$$= 0.00723$$

104. إذا قمت بتحضير محلول مائي مشبع من كلوريد البوتاسيوم عند درجة حرارة  $25^\circ C$ , ثم قمت بتسخينه إلى  $50^\circ C$  فهل يصبح محلول غير مشبع، أو مشبعاً، أو فوق مشبع؟ فسر إجابتك.

**سيصبح محلولاً غيرمشبع، إذ تزداد ذائبية  $KCl$  في الماء بازدياد درجة الحرارة. ويستوعب محلول كمية أكبر من المذاب عند درجة حرارة  $50^\circ C$ .**

105. ما كتلة نترات الكالسيوم  $Ca(NO_3)_2$  التي تلزم لتحضير  $3.00 \text{ L}$  من محلول تركيزه  $0.500 \text{ M}$ ؟

احسب عدد مولات  $Ca(NO_3)_2$  :

$$\text{عدد مولات المذاب (mol)} = \frac{\text{المolarية (M)}}{\text{حجم محلول (L)}}$$

$$\text{عدد مولات المذاب (mol)} = \frac{\text{الكتلة (g)}}{\text{وزن الصيغة المolarية (Molar mass)}}$$

$$3.00 \text{ L} \times \frac{0.500 \text{ mol } Ca(NO_3)_2}{1 \text{ L}} = 1.5 \text{ mol } Ca(NO_3)_2$$

احسب كتلة  $CaCl_2$  :

$$1.5 \text{ mol } Ca(NO_3)_2 \times \frac{164.09 \text{ g } Ca(NO_3)_2}{1 \text{ mol } Ca(NO_3)_2}$$

$$= 246 \text{ g } Ca(NO_3)_2$$


1

# تقدير الفصل

تكون درجة تجمد محلول أقل من درجة تجمد الماء النقي، في حين تكون درجة غليان محلول أعلى من درجة غليان الماء النقي.

وتكون قيم  $\Delta T_f$  و  $\Delta T_b$  للمحاليل المتآينة أعلى مما هي عليه بالنسبة للمواد غير الإلكترولية؛ لأن المواد الإلكترولية تتفكك في الماء، مُنْتَجَةً عدداً أكبر من الجسيمات في محلول.

109. توسيع يبين الشكل 1-27 ذائبية الأرجون في الماء عند ضغوط مختلفة. استعمل قانون هنري للتحقق من الذائية عند (15 atm).



الشكل 1-27

$$\text{من العادلة } \frac{S_1}{P_1} = \frac{S_2}{P_2} \text{ احسب ذائية}$$

$$S_2 = \frac{(55 \text{ mg Ar}/100 \text{ g H}_2\text{O})(15 \text{ atm})}{(10.0 \text{ atm})}$$

$$= 82 \text{ mg Ar}/100 \text{ g H}_2\text{O}$$

## التفكير الناقد

107. اعمل خطة لتحضير 1000 mL من محلول حمض الهيدروكلوريك المائي تركيزه 5% بالحجم. يجب أن تصف خطتك كميات المذاب والمذيب اللازم، والخطوات المستعملة في تحضير محلول.


$$\frac{\text{حجم المذاب}}{\text{حجم محلول}} \times 100\% = \text{النسبة المئوية بالحجم}$$

$$5\% = \frac{\text{حجم المذاب}}{1000 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$50 \text{ mL} = \text{حجم محلول}$$

يلزم 50 mL HCl، وبطرح حجم محلول HCl من محلول الكلي لتحصل على حجم الماء الذي يساوي 950 mL اللازمه. أذب 50 mL HCl في كمية مناسبة من الماء، ثم أضف الماء ليصل حتى يصل حجم محلول إلى 1000 mL.

108. قارن واستخلص النتائج ادرس المخطط في الشكل 1-21، وقارن بين الخطوط المتقطعة لـ  $\Delta T_b$  و  $\Delta T_f$ ، وصف الاختلافات التي لاحظتها. كيف يمكن لهذه الخطوط أن توضع في أماكن مختلفة تبعاً لنوع المحاليل إذا كانت متآينة أو غير متآينة؟ ولماذا؟



الشكل 1-20

1

## تقدير الفصل

## تقدير إضافي

الكتابية في الكيمياء

١١١. الحليب المجانس تم بيع أول حليب متجانس Homogenized Milk في الولايات المتحدة عام 1919م. أما اليوم فكل الحليب المباع متجانس على شكل مستحلب غروي. ابحث عن عملية التجانس Homogenization Process تصف فيها العملية، وتتضمن خططاً يوضح العملية، ومناقشة المنافع والمضار المتعلقة بشرب الحليب المجانس.

**ستتنوع إجابات الطلاب.** يجب أن يلاحظ الطالب أن الحليب الطازج يحتوي على دهون معلقة في داخله. وإذا تركت فترة فإنها ستتشكل طبقة يمكن فصلها. وأن الآلية التي يتكون بها الحليب المجانس تعتمد على تكسير حبيبات الدهون إلى أجزاء صغيرة تمنعها من تكوين الطبقة الدهنية.

## مسألة تحضير

١١٠. لديك محلول يحتوي على 135.2 g KBr مذابة في 2.3 L من الماء. كم (mL) منه يلزم لتحضير محلول مخفف حجمه 1.5 L وتركيزه 0.1 M وما درجة غليان محلول المخفف الجديد؟

**الخطوة ١ : احسب عدد مولات KBr، ثم احسب مolarية محلول الأصلي :**

$$135.2 \text{ g KBr} \times \frac{1 \text{ mol KBr}}{119 \text{ g KBr}} = 1.14 \text{ mol KBr}$$

$$\text{عدد مولات المذاب (mol)} = \frac{\text{المolarية M}}{\text{حجم محلول (L)}}$$

$$= \frac{1.14 \text{ mol KBr}}{2.3 \text{ L H}_2\text{O}} = 0.496 \text{ M}$$

**الخطوة ٢ : خفف محلول، بحساب الحجم اللازم (mL) :**

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$V_1 = 0.10 \text{ M} \times \frac{1.5 \text{ L}}{0.496 \text{ M}} = 0.30 \text{ L}$$

$$0.30 \text{ L} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 300 \text{ mL}$$

**الخطوة ٣ : احسب درجة غليان محلول المخفف :**

احسب المolarية من المعادلة  $\Delta T_b = K_b m$

$$m = \frac{0.10 \text{ mol KBr}}{1 \text{ L H}_2\text{O}} \times \frac{1 \text{ L H}_2\text{O}}{1000 \text{ mL H}_2\text{O}} \\ \times \frac{1 \text{ mL H}_2\text{O}}{1 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{1000 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ kg H}_2\text{O}} = 0.10 \text{ m}$$

**احسب مolarية الجسيم :**

$$m = 0.10 \text{ m} \times 2 = 0.20 \text{ m}$$

**احسب الارتفاع في درجة الغليان، ودرجة الغليان :**

$$\Delta T_b = 0.512^\circ\text{C}/m \times 0.20m = 0.10^\circ\text{C}$$

$$T_b = 100.0^\circ\text{C} + 0.10^\circ\text{C} = 100.1^\circ\text{C}$$

1


# تقدير الفصل

114. صُف الاتجاه العام الذي توضحه البيانات، واربط ذلك مع العلاقة بين ذائبية الغاز ودرجة الحرارة.

**بصورة عامة، يزداد الأكسجين المذاب في مياه سطح المحيط، عند زيادة خط العرض شمالاً وجنوباً، وتكون درجات حرارة سطح الماء أكبر بالقرب من خط الاستواء. وتقل درجة حرارة سطح الماء عند الأقطاب، وبصورة عامة تزداد ذائبية الغاز عند انخفاض درجة الحرارة.**

## أسئلة المستندات

المتوسط السنوي من الأكسجين المذاب تبين البيانات الموجودة في الشكل 1-28. متوسط قيم الأكسجين الذائبة في مياه المحيطات بوحدة mL/L خلال شهر واحد من عام 2001م. لاحظ أن المحور الأفقي يمثل خطوط الطول، والمحور العمودي يمثل خطوط العرض.



الشكل 1-28

112. هل ترتبط قيم الأكسجين المذاب بشكل واضح مع خط الطول أو خط العرض؟ لماذا ترى ذلك صحيحاً؟

**تُعد قيم الأكسجين المذاب الأكبر قرباً وارتباطاً بخط العرض. وكذلك ترتبط مساحة السطح، ودرجة حرارة الماء أكثر بخط العرض من خط الطول.**

113. عند أي خط عرض يكون متوسط الأكسجين المذاب أقل؟

**القيم أكثراً انخفاضاً بالقرب من خط الاستواء.**

# اختبار مقنى

## أسئلة الاختيار من متعدد

2. ما كمية البروم (بالجرام) في 55.00 g من المحلول؟

3.560 g .a


3.560 g .b

1.151 g .c

**0.2628 g .d**

$$\text{Br}_2 \text{ كتلة} = (55.0 \text{ g}) \times (0.004779) = 0.2628 \text{ g}$$

3. ما نواتج التفاعل التالي؟



NCl<sub>2</sub> .a

**2NOCl .b**

N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> .c

2ClO .d

4. إذا أذيب 1mol من كل من المواد التالية في 1 L من الماء فأيها

يكون له الأثر الأكبر في الضغط البخاري لمحلولها؟

KBr .a

C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> .b


**MgCl<sub>2</sub> .c**

CaSO<sub>4</sub> .d

ستُنتج MgCl<sub>2</sub> العدد الأكبر من الجسيمات في المحلول: 1

.2 mol Cl<sup>-</sup> و mol Mg<sup>2+</sup>

استعمل الرسم البياني الآتي للإجابة عن السؤالين 1 و 2.



1. ما حجم البروم Br<sub>2</sub> الذائب في 7.00 L من المحلول؟

55.63 mL .a

8.808 mL .b

**18.03 mL .c**


27.18 mL .d

## اختبار مقتن

7. أي مما يأتي لا يعد خاصية جامعه؟

- .a رفع درجة الغليان.
- .b زيادة الضغط البخاري.
- .c الضغط الأسموزي.
- .d حرارة محلول.

استعن بالتفاعل الآتي للإجابة عن السؤال 5.



5. إذا تفاعل  $16 \text{ mol H}_2$  فكم مولًا من Fe يتتج؟

- 6 .a
- 3 .b
- 12 .c
- 9 .d

$$16 \text{ mol H}_2 \times \frac{3 \text{ mol Fe}}{4 \text{ mol H}_2} = 12 \text{ mol Fe}$$

6. ما حجم محلول كلوريد النيكل  $0.125 \text{ M NiCl}_2$  الذي يحتوي على  $3.25 \text{ g}$  من  $\text{NiCl}_2$ ؟

- 406 mL .a
- 32.5 mL .b
- 38.5 mL .c
- 201 mL .d

احسب عدد مولات  $\text{NiCl}_2$ :

$$3.25 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{129.6 \text{ g}} = 0.025 \text{ mol}$$

احسب حجم محلول  $\text{NiCl}_2$ :

$$\text{المولارية } M = \frac{\text{(mol)}}{\frac{\text{حجم محلول (L)}}{\text{عدد مولات المذاب}}}$$

$$0.025 \text{ mol} \times \frac{1 \text{ L}}{0.125 \text{ mol}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 201 \text{ mL}$$

## اختبار مقنن

10. ما عدد مولات  $\text{KClO}_3$  اللازمة لتحضير محلول مائي حجمه  $1.0 \text{ L}$  عند درجة حرارة  $75^\circ\text{C}$ ؟


$$\frac{30 \text{ g } \cancel{\text{KClO}}_3 / \text{H}_2\text{O} \times 1 \text{ mol}}{122.55 \text{ g } \cancel{\text{KClO}}_3} = 0.245 \text{ mol KClO}_3 / 1\text{L}$$

## أسئلة الإجابات المفتوحة

11. إذا أعطيت عينة من مذاب صلب وثلاثة محليلات مائية تحتوي على ذلك المذاب، فكيف يمكنك تحديد أي المحاليل مشبع، وأيها غير مشبع، وأيها فوق مشبع؟

**أضف كمية قليلة إلى كلٍّ من المحاليل الثلاثة، فإذا تكونت بلورات فسيكون محلول فوق مشبع، وإذا كانت غير ذائبة يكون محلول مشبعاً، أما إذا ذابت فإن محلول يكون غير مشبع.**

استعن بالرسم البياني الآتي للإجابة عن الأسئلة 8 - 10.



8. ما عدد مولات  $\text{KClO}_3$  التي يمكن أن تذوب في  $100 \text{ g}$  من الماء عند درجة حرارة  $60^\circ\text{C}$ ؟

$$21 \text{ g KClO}_3 \times \frac{1 \text{ mol}}{122.55 \text{ g}} = 0.17 \text{ mol KClO}_3$$

9. أي محليل الأملاح يمكنه استيعاب المزيد من المذاب عند درجة حرارة  $20^\circ\text{C}$ :  $\text{KCl}$  أم  $\text{NaCl}$ ؟ كيف يمكن مقارنة ذلك بذائبية كل منها عند درجة حرارة  $80^\circ\text{C}$ ؟

يمكن لمحلي  $\text{NaCl}$  أن يستوعب كمية أكبر من المذاب عند  $20^\circ\text{C}$ . وتنعكس الذائبية عند  $80^\circ\text{C}$ , فيصبح  $\text{KCl}$  أكثر ذائبية من  $\text{NaCl}$ .

تم تحميل وعرض المادة من :



# موقع واجباتي

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترقي بمعجال التعليم على الإنترت ويستطيع الطالب تصفح حلول الكتب مباشرة لجميع المراحل التعليمية المختلفة



حمل التطبيق من هنا



قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# الكيمياء ٣

التعليم الثانوي - نظام المسارات  
السنة الثالثة

قام بالتأليف والمراجعة  
فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولابدّ

طبعة 2023-1445

ح) وزارة التعليم ، 1444هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم

الكيمياء 3. / وزارة التعليم. - الرياض ، 1444هـ .

ص 178؛ 21×27 سم

ردمك : 978-603-511-329-8

1- الكيمياء - تعليم - السعودية 2- التعليم الثانوي - السعودية -  
كتب دراسية. أ. العنوان

1444 /2767

ديوی 540,712

رقم الإيداع : 1444/2767

ردمك : 978-603-511-329-8

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:  
يسعدنا تواصلكم: لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# الأحماض والقواعد

## Acids and Bases

2

الـ



قياس الرقم الهيدروجيني



تقويم النتائج



pH CONTROLLER

8.2

ml

**الفكرة العامة** يمكن تعريف الأحماض والقواعد باستعمال مفردات، منها: أيونات الهيدروجين، أيونات الهيدروكسيد، أزواج الإلكترونات.

### 2-1 مقدمة في الأحماض والقواعد

**الفكرة الرئيسية** تساعد النظريات المختلفة على وصف سلوك الأحماض والقواعد.

### 2-2 قوة الأحماض والقواعد

**الفكرة الرئيسية** تتأين الأحماض والقواعد القوية في المحاليل تأيناً تاماً، بينما تتأين الأحماض والقواعد الضعيفة في المحاليل تأيناً جزئياً.

### 2-3 أيونات الهيدروجين والرقم

الهيدروجيني

**الفكرة الرئيسية** يعبر كل من  $\text{pH}$  و  $\text{pOH}$  عن تركيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد في المحاليل المائية.

### 2-4 التعادل

**الفكرة الرئيسية** يتفاعل الحمض مع القاعدة في تفاعل التعادل ليتتجها ملحًا وماء.

## حقائق كيميائية

- تُعد  $\text{pH}=8.2$  قيمة مقبولة عومماً للأحياء المائية، إلا أن المحافظة على هذه القيمة في حوض السمك لا يضمن استمرار نمو المخلوقات التي تعيش فيه بصورة طبيعية.
- تستطيع القشريات التي تعيش في المياه العذبة في أمريكا الجنوبية، العيش في مياه لها رقم هيدروجيني  $\text{pH}$  بين 6.4 و 7.0، في حين تعيش القشريات الإفريقية في مياه  $\text{pH}$  لها بين 8.0 و 9.2.





## نشاطات تمهيدية

### الأحماض والقواعد

اعمل المطوية الآتية لتساعدك على المقارنة بين النظريات الرئيسية للأحماض والقواعد.



٥٥



### المطويات

منظمات الأفكار

**الخطوة 1** أحضر ثلاًث أوراق، واطو كلاً منها عرضياً من المنتصف. وارسم خطأ على بعد 3 cm تقريباً من الطرف الأيسر. قص الورقة على طول هذا الخط حتى تصل إلى الشنيبة. كرر ذلك مع الورقتين الآخرين.

**الخطوة 2** عنون كل ورقة باسم نظرية من نظريات تعريف الأحماض والقواعد.

**الخطوة 3** ثبت الأوراق الثلاًث معاً على طول حافتها الخارجية.

**المطويات** استعمل هذه المطوية في القسم 1-2، وسجل

ملاحظاتك المتعلقة بنظريات الأحماض والقواعد في أثناء قراءة هذا القسم، ثم اكتب تفاعلات عامة تمثل كل نظرية.

## تجربة استهلاكية

### ماذا يوجد في خزانتك؟

يمكنك أن تتعلم شيئاً حول خواص المنظفات، والمنتجات التي تستعملها في منزلك، وذلك باختبارها بأشرطة تتبع الشمس. هل تستطيع تصنيف تلك المنتجات في مجموعتين؟



### خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.

2. ضع ثلاًث إلى أربع قطرات من منتجات مختلفة في فجوات طبق التفاعلات البلاستيكى أو يمكنك استخدام أنابيب الاختبار بدلاً من ذلك. وارسم جدول لأبيين موضع كل منها.

3. اختبر كل منتج بورق تتبع الشمس الأزرق والأحمر. أضف قطرتين من الفينولفثالين إلى كل عينة. ثم سجل ملاحظاتك.

تحذير: الفينولفثالين قابل للاشتعال. لذا أبعده عن اللهب.

### التحليل

1. صُنّف المواد في مجموعتين، بناءً على مشاهداتك.

## الأحماض والقواعد

2. صف كيف تختلف المجموعتان؟ وماذا يمكنك أن تستنتج؟

## تفاعل المواد مع تتبع الشمس والفينولفثالين بناء على المجموعة التي تنتهي إليها

**استقصاء** اختر عينة واحدة تفاعلت مع الفينولفثالين. هل تستطيع جعل هذا التفاعل يسير بالاتجاه العكسي؟ صمم تجربة لاختبار فرضيتك.

2-1

الأهداف

## مقدمة في الأحماض والقواعد

# Introduction to Acids and Bases

**الفكرة** الرئيسة تساعد النظريات المختلفة على وصف سلوك الأحماض والقواعد.

**الربط مع الحياة** إن التصنيف الأكثر شيوعاً للمواد هو تصنيفها إلى أحماض وقواعد. ويمكن تمييز الأحماض من الطعم اللاذع لبعض المشروبات المفضلة لديك، أو الراحة الحادة بعض القواعد مثل الأمونيا في بعض المنظفات المنزلية.

## خواص الأحماض والقواعد Properties of Acids and Bases

يطلق النمل حمض الميثانويك (الفورميك) عندما يشعر بخطر يهدد مستعمرته، فينبه أفراد المستعمرة كلها. أما الأحاسن المذابة في ماء المطر فتؤدي إلى تكوين كهوف كبيرة في الصخور الجيرية، وتؤدي أيضاً إلى تلف الأبنية والواقع الأثريّة القيمة مع مرور الزمن. و تستعمل الأحاسن في إضافة نكهة إلى الكثير من المشروبات والأطعمة التي تتناولها. وهناك أيضاً حمض في المعدة يساعد على هضم الطعام. كذلك تلعب القواعد دوراً في حياتك؛ فالصابون الذي تستعمله والأقراص المضادة للحموضة التي قد تتناولها عند اضطراب المعدة كلها تعتبر من القواعد.

كما أن الكثير من المواد المترهلة - كالماء المستعمل في التجربة الاستهلاكية - أحماض أو قواعد. **الخواص الفيزيائية** قد تكون بعض الخواص الفيزيائية للأحماض والقواعد مألوفة، فأنتم تعلمون مثلاً أن المحاليل الحمضية طعمها لاذع، ومنها العديد من المشروبات الغازية التي تمتاز بهذا الطعم اللاذع بسبب احتواها على حمضي الكربونيك  $H_2CO_3$  والفوسفوريك  $H_3PO_4$ ؛ كما أن حمض ومنها الليمون والجريب فروت لا يحتواها على حمضي الستريك والأسكوربيك؛ كما أن حمض الخل يجعل طعم الخل لاذعاً. وربما تعلم أن المحاليل القاعدية طعمها مرّ، ولها ملمس زلق. فتذكر كيف تصبح قطعة الصابون زلقة عندما تبتل. لا تحاول أبداً تعرف أي حمض أو قاعدة أو أي مادة أخرى في المختبر غير تذوقها أو لمسها.

**الشكل 1-2** يبيّن نبتتين تنموان في تربتين مختلفتين، فإذاً هما تنمو في تربة حمضية، والأخرى تنمو في تربة قاعدية (قلوية).

- تحدد الخواص الفيزيائية والكيميائية للأحماض والقواعد.
  - تصنف المحاليل إلى حمضية، أو قاعدية، أو متعادلة.
  - تقارن بين نظريات أرهينيوس، وبرونستد - لوري، ولويس للأحماض والقواعد.

مراجعة المفردات

**تركيب لويس نموذج يستعمل التمثيل النقطي للإلكترونات؛ ليبين كيفية ترتيب الإلكترونات في الجزيئات.**

المفردات الجديدة



(2)



(1)

**الشكل 2-1** تمويـة الأـلـلـ (1) بـكـثـرـةـ فيـ الـمـلـكـةـ الـعـرـبـيـةـ السـعـوـدـيـةـ وـتـمـتـازـ بـتـحـمـلـهاـ لـلـأـرـضـيـ القـلـوـيـةـ وـالـمـالـحـةـ.

تكثر زراعة الزيتون (2) في منطقة الجوف  
بالمملكة العربية السعودية وتمتاز شجرة  
الزيتون بتحملها لدرجات الحرارة العالية  
والقدرة على العيش في تربة حامضة.



تحول القواعد ورق تباع الشمس الأزرق إلى أحمر




تحول الأحماض ورق تباع الشمس الأزرق إلى أحمر

**الشكل 2-2** يستعمل حمض الهيدروكلوريك  $\text{HCl}$  - وهو حمض قوي - في تنظيف السيراميك. كما يساعد هيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$  - وهو قاعدة قوية - على تسليك المصارف المسدودة.


**التوصيل الكهربائي** ومن الخواص الأخرى للمحاليل الحمضية والقاعدة مقدرتها على توصيل الكهرباء بسبب تأينها. فالماء النقي غير موصل للكهرباء، إلا أن إضافة حمض أو قاعدة إليه تتيح أيونات تجعل محلول الناتج موصلًا للكهرباء.

**الخواص الكيميائية** يمكن تعرف الأحماض والقواعد من خلال تفاعلهما مع ورق تباع الشمس. ويمكن تعرف الأحماض أيضًا من خلال تفاعಲاتها مع بعض الفلزات وكربونات الفلزات. التفاعلات مع ورق تباع الشمس يعد تباع الشمس نوعًا من الأصباغ المستعملة عادة في التمييز بين محليل الأحماض والقواعد، كما في **الشكل 2-2**؛ إذ تحول محليل الأحماض لون ورق تباع الشمس الأزرق إلى الأحمر، وتحول محليل القواعد لون ورق تباع الشمس الأحمر إلى الأزرق.

التفاعلات مع الفلزات وكربونات الفلزات يتفاعل كل من الماغنيسيوم والخارصين مع محليل الأحماض، فيتتج عن هذا التفاعل غاز الهيدروجين. وتصف المعادلة الآتية التفاعل بين الخارصين وحمض الهيدروكلوريك:



وتتفاعل كربونات الفلزات  $\text{CO}_3^{2-}$  وكربونات الفلزات الهيدروجينية  $\text{HCO}_3^-$  أيضًا مع محليل الأحماض متنجة غاز ثاني أكسيد الكربون  $\text{CO}_2$ . فعند إضافة الخل إلى صودا الخبز يحدث تفاعل بين حمض الإيثانويك (الخل  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) وكربونات الصوديوم الهيدروجينية  $\text{NaHCO}_3$ ، وينتج غاز  $\text{CO}_2$  الذي يسبب ظهور الفقاعات.



يستعمل الجيولوجيون محلول حمض الهيدروكلوريك لتعريف الصخر الجيري (الذي يتكون بشكل رئيس من  $\text{CaCO}_3$ )، فإذا أدت بضع قطرات من الحمض إلى إنتاج فقاعات ثاني أكسيد الكربون دل ذلك على أن الصخر يحتوي على مادة الجير.

### مسائل تدريبية

1. اكتب معادلات كيميائية رمزية موزونة لتفاعلات بين:

a. الألومنيوم وحمض الكبريتيك.

b. كربونات الكالسيوم وحمض الهيدروبروميك.


2. تحفيز اكتب المعادلة الأيونية النهائية لتفاعل في السؤال 1b.

**الإجابة في الصفحة التالية**



1. اكتب معادلات كيميائية رمزية موزونة لتفاعلات بين:



- الألومينيوم وحمض الكبريتيك.




- كربونات الكالسيوم وحمض الهيدروبروميك.



2. تحفيز اكتب المعادلة الأيونية النهائية لتفاعل في السؤال 1b.





**الشكل 3-3** لاحظ كيف يتغير كل من  $[H^+]$  و  $[OH^-]$  في وقت واحد.

فعمداً يقل  $[H^+]$  إلى جهة اليمين تزداد قيمة  $[OH^-]$  إلى اليسار.


**حدد على الرسم النقطة التي يكون  
عندها تركيز الأيونين متساوين.**

## عند الخط العمودي المرسوم في مركز الرسم


**أيونات الهيدرونيوم والهيدروكسيد** تحتوي المحاليل المائية جميعها على أيونات الهيدروجين  $H^+$  وأيونات الهيدروكسيد  $OH^-$ . وتحدد الكميات النسبية من الأيونين ما إذا كان محلول حمضيًا أو قاعديًا أو متعادلاً. والمحاليل المتعادلة ليست حمضية ولا قاعدية.

يحتوي محلول الحمض على أيونات هيدروجين أكثر من أيونات الهيدروكسيد. في حين يحتوي محلول القاعدي على أيونات هيدروكسيد أكثر من أيونات الهيدروجين. أما محلول المتعادل فيحتوي على تركيزين متساوين من أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد. ويمثل الشكل 3-2 هذه العلاقات، في حين يمثل الشكل 4-2 كيف طور العلماء فهمهم للأحماض والقواعد.

يترج الماء النقي أعداداً متساوية من أيونات  $H^+$  وأيونات  $OH^-$  في عملية تسمى التأين الذاتي؛ إذ تتفاعل جزيئات الماء متجةً إلى أيونات الهيدرونيوم  $H_3O^+$ ، وأيونات الهيدروكسيد.




أيون الهيدرونيوم عبارة عن أيون هيدروجين مرتبط مع جزء ماء برابطة تساهمية. ويمكن استعمال الرمزين  $\text{H}_3\text{O}^+$  و  $\text{H}^+$  بالتبادل، أي وضع أحدهما مكان الآخر، كما تبين المعادلة المبسطة للتأين الذاتي:



## الشكل 4-4 تاريخ الأحماض والقواعد

يرتكز الفهم الحالي للأحماس والقواعد على مساهمات علماء الكيمياء والأحياء والبيئة، وكذلك على المخترعين خلال سنة مضت.





**الشكل 5-2** تعد بحيرة ناترون في تنزانيا تجتمع طبيعياً للمياه القاعدية. حيث تصب المياه في البحيرة حاملة معها كميات كبيرة من كربونات الصوديوم الذائبة من الصخور البركانية المحطة دون أن تجد لها مخرجاً. ويزيد التبخر من تركيز هذا الملح، مخلفاً قشرة بيضاء على السطح، وجاعلاً المياه عالية القاعدية.

**المطويات** أدخل معلومات من هذا القسم في مطويتك.

**2005** طور العلماء الأحماض المطورة، وهي أكثر حضية من حمض الكبريتิก الذي تركيزه 100%. وتشمل تطبيقات هذه الأحماض إنتاج بلاستيك قوي وبنزين عالي الأوكتان.

**2010**

**1990**


**1970**

**1950**


## The Arrhenius Theory نظرية أرهيسيوس

إذا كان الماء النقي متعادلاً فكيف يصبح محلول المائي حمضيّاً أو قاعديّاً؟ كان أول شخص يجيب عن هذا التساؤل الكيميائي السويدي سفانت أرهيسيوس الذي اقترح عام 1883 م ما يعرف الآن باسم نظرية أرهيسيوس للأحماض والقواعد، التي تنص على أن الحمض مادة تحتوي على الهيدروجين، وتتأين في المحاليل المائية منتجة أيونات الهيدروجين. والقاعدة مادة تحتوي على مجموعة الهيدروكسيد، وتتفكك في محلول المائي منتجة أيون الهيدروكسيد.

**أحماض وقواعد أرهيسيوس** تأمل ما يحدث عند إذابة غاز كلوريد الهيدروجين في الماء بوصفه مثلاً على نظرية أرهيسيوس للأحماض والقواعد؛ إذ تتأين جزيئات  $\text{HCl}$  مكونة أيونات  $\text{H}^+$  التي تجعل محلول حمضيّاً.



وعندما يذوب المركب الأيوني هيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$  في الماء فإنه يتحلل ليتتج أيونات  $\text{OH}^-$  التي تجعل محلول قاعديّاً.



وعلى الرغم من أن نظرية أرهيسيوس تفسر الكثير من المحاليل الحمضية والقاعدية، إلا أنها لا تخلو من بعض السلبيات؛ فمثلاً لا تحتوي الأمونيا  $\text{NH}_3$  وكربونات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  على مجموعة الهيدروكسيد، إلا أن كلاً منها ينتج أيونات الهيدروكسيد عند إذابته في الماء. وتعد كربونات الصوديوم المركب المسؤول عن جعل بحيرة ناترون في تنزانيا ذات وسط قاعدي، كما هو مبين في الشكل 5-2. لذا من الواضح أننا بحاجة إلى نظرية أكثر دقة تشمل القواعد جميعها.




**1980 – 1990** لا تحتوي

مقاييس pH التي تشتمل على رقائق السليكون أجزاء زجاجية، وهي شائعة الاستعمال الآن في الصناعات الغذائية والتجميلية والدوائية.

**1950**

**1953** درس جيمس

واطسون، وفرانسيس كريك، وروزالد فرانكلين الحمض النووي DNA، وأضعين بذلك إطاراً للصناعة والتكنولوجيا الحيوية.




**1963** اكتشف العلماء المطر

الحمضي في أمريكا الشمالية؛ فقد بينت الدراسات أن المطر الملوث أكثر حضية مئة مرة من المطر غير الملوث.


## نظرية برونستد - لوري The Bronsted-Lowry Theory

اقترح الكيميائي الدنماركي يوهان برونستد والكيميائي الإنجليزي توماس لوري نظرية أشمل للأحماض والقواعد؛ حيث تركز على أيون الهيدروجين  $H^+$ . ففي نظرية برونستد - لوري للأحماض والقواعد يكون الحمض هو المادة المانحة لأيون الهيدروجين، في حين تكون القاعدة هي المادة المستقبلة لهذا الأيون.

**المواد المانحة لأيون الهيدروجين والمواد المستقبلة له** إذا افترضنا أن الرموز X و Y يمثلان عنصرين غير فلزيين أو أيونات سالبة متعددة الذرات فإننا نستطيع كتابة الصيغة العامة للحمض في صورة  $HX$  أو  $HY$ . وعندما يذوب جزء من حمض  $HX$  في الماء يعطي أيون  $H^+$  جزء ماء، فيسلك جزء الماء سلوك القاعدة، ويكتسب أيون  $H^+$ ، كما في المعادلة الآتية:



وعند اكتساب جزء الماء أيون  $H^+$  يصبح حمضًا، فتصبح صيغته  $H_3O^+$ ، الذي يسمى أيون الهيدرونيوم، ويعدّ حمضًا؛ لأن لديه أيون  $H^+$  إضافيًّا يستطيع أن يمنجه. وعندما يمنجح الحمض  $HX$  أيون  $H^+$  يصبح مادة قاعدية  $X^-$ ؛ لأن لديه شحنة سالبة، ويستطيع أن يستقبل أيون هيدروجين موجبًا. وهكذا يمكن أن يحدث تفاعل بين حمض وقاعدة في الاتجاه المعاكس. ويستطيع الحمض  $H_3O^+$  أن يتفاعل مع القاعدة  $X^-$  مكونًا ماء و  $HX$ ، فيحدث الاتزان الآتي:



**الأحماض والقواعد المرافق** يعد التفاعل الأمامي في التفاعل السابق تفاعل حمض مع قاعدة. والتفاعل العكسي لحمض وقاعدة أيضًا. ويعرف الحمض والقاعدة اللذان يتفاعلان في الاتجاه العكسي بأنهما حمض مرافق مع قاعدة مرافق. فالحمض المرافق (المترن) هو المركب الكيميائي الذي ينبع عندما تستقبل القاعدة أيون الهيدروجين. فالقاعدة  $\text{H}_2\text{O}$  تستقبل أيون الهيدروجين من الحمض  $HX$ ، فيكون الحمض المرافق  $\text{H}_3\text{O}^+$ . أما القاعدة المرافق (المترنة) فهي المركب الكيميائي الذي ينبع عندما يمنجح الحمض أيون الهيدروجين. فعندما يمنجح الحمض  $HX$  أيون الهيدروجين يصبح القاعدة المرافق  $X^-$ . وفي التفاعل المبين أعلاه يمثل أيون الهيدرونيوم  $\text{H}_3\text{O}^+$  الحمض المرافق للقاعدة  $\text{H}_2\text{O}$ ، ويمثل أيون  $X^-$  القاعدة المرافق للحمض  $HX$ . وت تكون تفاعلات برونستد - لوري من **أزواج مترافق** من الحمض والقاعدة؛ أي من مادتين ترتبطان معاً عن طريق منع واستقبال أيون هيدروجين واحد.

يبين الشكل 6-2 تمثيلاً لزوج مترافق من حمض وقاعدة. فعندما تكون الكرة في يد الأب فإنه يمثل الحمض، وعندما يرمي الكرة (أيون هيدروجين) إلى ابنه يصبح ابنه هو الحمض؛ لأن لديه الكرة أي (أيون هيدروجين) يستطيع أن يهبها. ويصبح الأب هو القاعدة لأنها مستعد لاستقبال الكرة أي (أيون الهيدروجين). الأب يمثل الحمض والابن هو القاعدة في التفاعل الأمامي. أما في التفاعل العكسي فيكون الابن هو الحمض المرافق؛ لأن لديه الكرة، في حين يكون الأب هو القاعدة المرافق.

**ماذا قرأت؟** اشرح كيف يمكن أن يكون أيون  $\text{HCO}_3^-$  حمضًا وقاعدة في آن واحد.

يحتوي أيون  $\text{HCO}_3^-$  على أيون هيدروجين يمكن منحه في صورة حمض، كما أن الأيون يحمل شحنة سالبة تمكنه من أن يسلك سلوك القاعدة، وذلك عند استقباله أيون هيدروجين



الشكل 6-2 يمثل الأب عندما يرمي الكرة إلى ابنه حمض برونستد - لوري ويمثل ابنه قاعدته. وعندما يمسك ابن الكرة فإنه يمثل الحمض المرافق.





الشكل 2-7 يمنح فلوريد الهيدروجين أيون هيدروجين لجزء الماء، لذا يُعد فلوريد الهيدروجين حمضاً.

القاعدة المرافقـة هي - F

المفردات


أصل الكلمة

**Conjugate** مترافق معنى الكلمة في اللغة العربية مترافق، وقد أخذت هذه الكلمة من اللغة اللاتينية، وهي تعني: **-Conjugate** بادئة بمعنى مع أو معاً. فعل بمعنى يتصل أو تتحد.



يُستخدم فلوريد الهيدروجين في صنع مركبات متنوعة تحتوي على الفلور، مثل الطبقة المغلفة لأدوات الطبخ غير اللاصقة، والمبيضة في الشكل 8-2. ويعد حمضًا وفق نظرية أرهينيوس وبرونستاد - لوري.

**الأمونيا - قاعدة برونستد - لوري** معظم الأحماض والقواعد التي تتفق مع تعريف أرهينيوس للأحماض والقواعد تتفق أيضاً مع تعريف برونستد - لوري. ولكن بعض المواد الأخرى التي لا توجد فيها مجموعة الهيدروكسيد لا يمكن أن تُعدَّ من القواعد بحسب تعريف أرهينيوس، ولكنها تصنف قواعداً بحسب نظرية برونستد - لوري. ومن ذلك الأمونيا  $\text{NH}_3$ . فعندما تذوب الأمونيا في الماء يكون الماء حمضًا بحسب تعريف برونستد - لوري في التفاعل الأمامي. ولأن جزيء الأمونيا  $\text{NH}_3$  يستقبل أيون  $\text{H}^+$  ليكون أيون الأمونيوم  $\text{NH}_4^+$  فإن الأمونيا تُصنف قاعدة برونستد - لوري في التفاعل الأمامي.



أما في التفاعل العكسي فيعطي أيون الأمونيوم  $\text{NH}_4^+$  أيون  $\text{H}^+$  ليكون جزيء أمونيا. وهكذا يعمل حمض، بحسب برونستد - لوري. ويكون بذلك أيون الأمونيوم هو الحمض المرافق للقاعدة (الأمونيا). ويتقبل أيون الهيدروكسيد أيون  $\text{H}^+$  ليكون جزيء ماء. وهكذا يكون قاعدة بحسب برونستد - لوري. لذا يكون أيون الهيدروكسيد هو القاعدة المرافقية للحمض، والماء.


**الماء - حمض وقاعدة برونستاد - لوري** تذكر أنه عندما يذوب HF في الماء فإن الماء يسلك سلوك القاعدة؛ وعندما تذوب الأمونيا  $\text{NH}_3$  في الماء، فإن الماء يسلك سلوك الحمض. لذا يسلك الماء سلوك الحمض أو القاعدة بحسب طبيعة المواد المذابة في محلول. ويُسمى الماء والمواد الأخرى التي تستطيع أن تسلك سلوك الأحماض والقواعد مواد متعددة (أمفوتيرية) Amphoteric.



**الشكل 2-8** يتفاعل فلوريد الهيدروجين مع مركبات عضوية تسمى الهيدروكربونات لصنع السطح الناعم غير اللاصق لهذه الأدوات المنزلية، حيث تحل ذرات الفلور محل ذرات الهيدروجين.

### مسائل تدريبية

3. حدد الأزواج المترافقه من الحمض والقاعدة في كل تفاعل مما يلي:



4. تحضير إذا علمت أن نواتج تفاعل حمض مع قاعدة هي  $\text{H}_3\text{O}^{+}$  و  $\text{SO}_4^{2-}$ . اكتب معادلة موزونة لتفاعل، وحدّد الأزواج المترافقه من الحمض والقاعدة.


## الإجابة في الصفحة التالية

### الأحماض الأحادية البروتون والمتمعددة البروتونات


#### Monoprotic and Polyprotic Acids

تستطيع أن تعرف أن كلاً من  $\text{HCl}$  و  $\text{HF}$  حمض يحتوي على أيون هيدروجين واحد في كل جزيء، بناءً على معرفتك للصيغة الكيميائية لكل منها. فالحمض الذي يستطيع أن يمنع أيون هيدروجين واحداً فقط يُسمى حمضًا أحادي البروتون. ومن الأحماض الأحادية البروتون حمض البيروكlorيك  $\text{HClO}_4$ ، وحمض النيتريك  $\text{HNO}_3$ ، وحمض الهيدروبروميك  $\text{HBr}$ ، وحمض الإيثانويك  $\text{CH}_3\text{COOH}$ . ولأن حمض الإيثانويك أحادي البروتون لذا تكتب صيغته غالباً في صورة  $\text{CH}_3\text{COOH}$  لتأكيد حقيقة أن ذرة هيدروجين واحدة فقط من الذرات الأربع قابلة للتتأين.


**ذرات الهيدروجين القابلة للتتأين** الفرق بين ذرة الهيدروجين القابلة للتتأين في حمض الإيثانويك وذرات الهيدروجين الثلاث الأخرى هو أن الذرة القابلة للتتأين مرتبطة مع عنصر الأكسجين الأكثر كهروسالبية من الهيدروجين. وبين الشكل 9-2 تركيب حمض الإيثانويك، مع تركيب حمض  $\text{HF}$  وتركيب البنزين  $\text{C}_6\text{H}_6$  غير الحمضي. فترتبط ذرة الهيدروجين في مركب فلوريد الهيدروجين مع ذرة الفلور العالية الكهروسالبية، لذا فالرابطة بينها قطبية، وتصبح ذرة الهيدروجين قابلة للتتأين إلى حد ما. أما ذرات الهيدروجين في البنزين فكل منها مرتبطة مع ذرة كربون ذات كهروسالبية تساوي تقربياً كهروسالبية الهيدروجين. فتكون هذه الرابط غير قطبية، لذا يكون البنزين غير حمضي. وقد تمنح بعض الأحماض أكثر من أيون هيدروجين. فمثلاً يستطيع كل من حمض الكبريتิก  $\text{H}_2\text{SO}_4$  وحمض الكربونيكي  $\text{H}_2\text{CO}_3$  أن يمنع أيوني هيدروجين؛ فكلاهما يحتوي على ذري هيدروجين مرتبطين مع ذري أكسجين برابط قطبية. والأحماض التي تحتوي على ذري هيدروجين قابلين للتتأين في كل جزيء تُسمى أح�性اً ثنائية البروتونات. ويحتوي كل من حمض الفوسفوريك  $\text{H}_3\text{PO}_4$  والبوريك  $\text{H}_3\text{BO}_3$  على ثلاث ذرات هيدروجين قابلة للتتأين في كل جزيء، وتُسمى أح�性اً ثلاثة البروتونات. ويمكن استعمال مصطلح حمض متعدد البروتونات لأي حمض يحتوي على أكثر من ذرة هيدروجين قابلة للتتأين.



حمض الإيثانويك





فلوريد الهيدروجين



بنزين


الشكل 2-9 تعتمد قدرة الهيدروجين على التتأين على قطبية رابطه. ففي حمض الإيثانويك يكون الأكسجين أكثر كهروسالبية من الهيدروجين، لذا تكون الرابطة بين الأكسجين والهيدروجين قطبية. ولذلك تستطيع ذرة الهيدروجين أن تتأين في محلول. كذلك في فلوريد الهيدروجين يعد الفلور عالي الكهروسالبية، لذا يكون  $\text{HF}$  حمضًا في محلول، بينما في البنزين هناك فرق قليل في الكهروسالبية بين ذرات الكربون والهيدروجين، لذا فالبنزين ليس حمضًا.

3. حدد الأزواج المترافقه من الحمض والقاعدة في كل تفاعل مما يلي:



حمض مرافق	قاعدة	قاعدة مرافق	حمض
$\text{H}_2\text{O}$	$\text{OH}^{-}$	$\text{NH}_3$	$\text{NH}_4^{+} . \text{a}$
$\text{H}_3\text{O}^{+}$	$\text{H}_2\text{O}$	$\text{Br}^{-}$	$\text{HBr} . \text{b}$
$\text{HCO}_3^{-}$	$\text{CO}_3^{2-}$	$\text{OH}^{-}$	$\text{H}_2\text{O} . \text{c}$

4. تحضير إذا علمت أن نواتج تفاعل حمض مع قاعدة هي  $\text{H}_3\text{O}^{+}$  و  $\text{SO}_4^{2-}$ . اكتب معادلة موزونة لتفاعل، وحدّد الأزواج المترافقه من الحمض والقاعدة.



القاعدة:  $\text{H}_3\text{O}^{+}$ ، الحمض المترافق:  $\text{HSO}_4^{-}$


الحمض:  $\text{SO}_4^{2-}$ ، القاعدة المترافقه:  $\text{HSO}_4^{-}$

## الجدول 2-1

القاعدة المرافقة		الحمض	
الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم
$\text{Cl}^-$	أيون الكلوريد	$\text{HCl}$	حمض الهيدروكلوريك
$\text{NO}_3^-$	أيون النترات	$\text{HNO}_3$	حمض النيتريك
$\text{HSO}_4^-$	أيون الكبريتات الهيدروجينية	$\text{H}_2\text{SO}_4$	حمض الكبريتيك
$\text{SO}_4^{2-}$	أيون الكبريتات	$\text{HSO}_4^-$	أيون الكبريتات الهيدروجينية
$\text{F}^-$	أيون الفلوريد	$\text{HF}$	حمض الهيدروفلوريك
$\text{CN}^-$	أيون السيانيد	$\text{HCN}$	حمض الهيدروسيانيك
$\text{CH}_3\text{COO}^-$	أيون الإيثانوات	$\text{CH}_3\text{COOH}$	حمض الإيثانيك
$\text{H}_2\text{PO}_4^-$	أيون ثانوي هيدروفوسفات	$\text{H}_3\text{PO}_4$	حمض الفوسفوريك
$\text{HPO}_4^{2-}$	أيون الهيدروفوسفات	$\text{H}_2\text{PO}_4^-$	أيون ثانوي هيدروفوسفات
$\text{PO}_4^{3-}$	أيون الفوسفات	$\text{HPO}_4^{2-}$	أيون الهيدروفوسفات
$\text{HCO}_3^-$	أيون الكربونات الهيدروجينية	$\text{H}_2\text{CO}_3$	حمض الكربونيك
$\text{CO}_3^{2-}$	أيون الكربونات	$\text{HCO}_3^-$	أيون الكربونات الهيدروجينية

**يبين الجدول 1-2 بعض الأحاضر الأحادية والمتمعددة البروتونات.**

تأين الأحماض المتعددة البروتونات جميعها في أكثر من خطوة. فخطوات تأين حمض الفوسفوريك الثلاث مبينة في المعادلات الآتية:



أدخل معلومات من هذا  
القسم في مطويتك.

## المفردات

المفردات الأكاديمية

## يُطابق Conform

تعنی: یشابه اور یہاں

كأن نقول مثلاً: إن تصرفاتهم تتطابق مع توقعات المجتمع.....

لاحظ أن جميع المواد المصنفة أحماضًا وقواعد بحسب نظرية أرهينيوس تُصنف أيضًا أحماضًا وقواعد بحسب نظرية برونسنستد - لوري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المواد غير المصنفة بأنها قواعد بحسب نظرية أرهينيوس تُصنف قواعد بحسب نظرية برونسنستد - لوري.

إذن قد لا تندesh إذا علمت أن نظرية أخرى أكثر شمولية للأحماض والقواعد اقتربها الكيميائي لويس (1875 - 1946) الذي طور أيضًا نظرية زوج الإلكترونات للترابط الكيميائي، وقدم تراكيب لويس التي تبين موقع الإلكترونات في الذرات والجزيئات. وقد طبق نظريته على تفاعلات الأحماض والقواعد. واقتصر أن الحمض أيون أو جزيء فيه مدار ذري فارغ يستطيع أن يتقبل (يشارك) زوجًا من الإلكترونات. وأن القاعدة أيون أو جزيء له زوج إلكترونات حر (غير مرتبط) يستطيع أن يمنحه أو يشارك فيه. وبحسب نظرية لويس فإن حمض لويس مادة مستقبلة لزوج من الإلكترونات، وقاعدة لويس مادة مانحة لزوج من الإلكترونات. لاحظ أن نظرية لويس تشمل جميع المواد المصنفة أحماضًا وقواعد بحسب برونسنستد - لوري وغيرها كثير أيضًا.


## نظريّة لويس The Lewis Theory



**مانحات ومستقبلات أزواج الإلكترونات** تأمل التفاعل بين أيون الهيدروجين  $H^+$  وأيون الفلوريد  $F^-$  لتكوين جزيء فلوريد الهيدروجين ( $HF$ ). لقد تم توضيح دور زوج الإلكترونات من خلال تراكيب لويس الآتية:




يمثل أيون  $H^+$  في هذا التفاعل حمض لويس؛ حيث يستقبل مدار  $1s$  الفارغ زوجاً من الإلكترونات من أيون  $F^-$ . ويمثل أيون الفلوريد قاعدة لويس، لذا فهو يعطي زوجاً من الإلكترونات غير المشترك ليكون الرابطة بين الهيدروجين والفلور في  $HF$ . لاحظ أن هذا التفاعل يتطابق أيضاً مع نظرية برونستد-لوري للأحماض والقواعد؛ لأن  $H^+$  يمكن اعتباره مانحاً لأيون هيدروجين، و  $F^-$  مستقبلاً لأيون هيدروجين. فتفاعل غاز ثالث فلوريد البورون  $BF_3$  مع غاز الأمونيا  $NH_3$  لتكوين  $BF_3 NH_3$  هو تفاعل حمض لويس مع قاعدة لويس.




وإن ذرة البورون في  $BF_3$  لها ستة إلكترونات تكافؤ، لذا يستطيع المدار الفارغ أن يستقبل زوجاً من الإلكترونات من قاعدة لويس.

ويحدث تفاعل حمض لويس مع قاعدة لويس أيضاً عندما يتفاعل غاز ثالث أكسيد الكبريت  $SO_3$  مع أكسيد الماغنيسيوم الصلب  $MgO$ .




حيث يمثل زوج الحمض - القاعدة في هذا التفاعل ثالث أكسيد الكبريت  $SO_3$  وأيون الأكسيد  $O^{2-}$  من أكسيد الماغنيسيوم، أما الناتج فهو أيون الكبريتات.



لاحظ أن حمض لويس - وهو في هذه الحالة جزيء  $SO_3$  - يستقبل زوج إلكترونات من قاعدة لويس، وهو أيون  $O^{2-}$ . ويلخص الجدول 2-2 نظريات أرهيبيوس، وبرونستد-لوري، ولويس للأحماض والقواعد.

ملخص النظريات الثلاث للأحماض والقواعد		الجدول 2-2
تعريف القاعدة	تعريف الحمض	النظرية
$OH^-$ متجر	$H^+$ متجر	أرهيبيوس
$H^+$ مستقبل	$H^+$ مانح	برونستد-لوري
يمنح زوجاً من الإلكترونات	يستقبل زوجاً من الإلكترونات	لويس



**الشكل 2-10** يمكن إزالة ثالث أكسيد الكبريت - وهو أحد الغازات العادمة الناتجة عن احتراق الفحم الحجري بتفاعل مع أكسيد الماغنيسيوم في تفاعل حمض وقاعدة لويس. لاحظ أنه رغم خروج كميات كبيرة من البخار من أبراج التبريد، إلا أن الذي يمكن رؤيته من المدخنة قليل.

يعد تفاعل  $\text{SO}_3$  مع  $\text{MgO}$  مهمًا؛ لأنّه يتّجّب بلوارات من ملح كبريتات الماغنيسيوم، تعرّف باسم ملح إبسوم  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ . وهذا الملح استعمالات كثيرة، منها تخفيف آلام العضلات، وهو مغذٌ للنباتات. وللتّفاعل الذي يتّجّب كبريتات الماغنيسيوم أيضًا تطبيقات بيئية؛ فعندما يحقن  $\text{MgO}$  في الغازات الخارجّة من مداخن محطّات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم الحجري، كما في الشكل 10-2 فإنه يتفاعل مع  $\text{SO}_3$  ويُعمل على انتزاعه من الغازات العادمة الخارجّة من المصانع إلى الجو. أما إذا ترك  $\text{SO}_3$  ليتشرّر في الغلاف الجوي فسوف يتحدّ مع الماء الموجود في الهواء مكوّنًا حمض الكبريتيك الذي يسقّط على الأرض في صورة مطر حمضي.

**الأنهيدريّات** تتحدّ جزيئات غاز ثاني أكسيد الكربون مع علم الأرض

الرابط مع علم الأرض

بجزيئات الماء في الجو تكون حمض الكربونيك  $\text{H}_2\text{CO}_3$ , الذي يهطل مع المطر، وعندما يصل ماء المطر الحمضي إلى الأرض يتسرّب جزء منه في التربة ليصل إلى الصخور الجيرية، فيؤدي إلى إذابتها ببطء، مما يسبب تكون كهوف ضخمة تحت الأرض عبرآلاف السنين، وتقطّر المياه من سقوف الكهوف مخلفة الجير المذاب. وهذا الجير يتكون على هيئة رقاقات جليدية تتدلى من السقف تسمى الهوابط. وكذلك تتكون كتل من كربونات الكالسيوم على أرض الكهوف تسمى الصواعد.

تتكون مثل هذه الكهوف لأن ثاني أكسيد الكربون أنهيدريد حمضي (حمض متزوع منه جزئ ماء)، وهو أكسيد يستطيع أن يتحدد مع الماء ليكون حمضًا. وهناك أكسيد أخرى تتحدد مع الماء مكونة قواعد. فمثلاً يكون أكسيد الكالسيوم  $\text{CaO}$  (الجير الحبي) عندما يذوب في الماء القاعدة هيدروكسيد الكالسيوم  $\text{Ca(OH)}_2$  (الجير المطفأ). وعموماً تكون أكسيد العناصر الفلزية القواعد؛ بينما تكون أكسيد الالفلزات الأحماض.

التقويم

## الخلاصة

- | الخلاصة   | الفكرة الرئيسية | فَسَرْ لِمَاذَا لَا تُصَنَّفُ الْكَثِيرُ مِنْ أَحْمَاضٍ وَقَوَاعِدٍ لَوِيْسٍ                               |
|---|-----------------|--|
| <p>▪ تحدّد تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد ما إذا كان محلول حضيئاً، أم قاعدياً، أم متعادلاً.</p>   | 5.              | على أنها أحماض أو قواعد أرهينيوس أو برونستد - لوري؟  |
| <p>▪ يجب أن يحتوي حمض أرهينيوس على ذرة هيدروجين قابلة للتأين. ويجب أن تحتوي قاعدة أرهينيوس على مجموعة هيدروكسيد قابلة للتأين.</p>                                     | 6.              | قارن بين الخواص الفيزيائية والكميائية للأحماض والقواعد.  |
| <p>▪ حمض برونستد - لوري مادة مانحة لأيون هيدروجين، بينما قاعدة برونستد - لوري مادة مستقبلة لأيون هيدروجين.</p>  | 7.              | وضح كيف تحدّد تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد ما إذا كان محلول حضيئاً أم قاعدياً أم متعادلاً؟ |
| <p>▪ حمض لوييس مادة تستقبل زوجاً من الإلكترونات، بينما قاعدة لوييس مادة تعطى زوجاً من الإلكترونات.</p>  | 8.              | اشرح لماذا لا يصنف العديد من المركبات التي تحتوي على ذرة هيدروجين أو أكثر بوصفها أحماض أرهينيوس؟           |
| <p>▪ تحديد الأزواج المترافقية من الأحماض والقواعد في المعادلة الآتية:</p> $\text{HNO}_2 + \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$ | 9.              |  |
| <p>▪ اكتب تركيب لوييس لثالث كلوريد الفوسفور <math>\text{PCl}_3</math>. هل يعد حمض لوييس، أم قاعدة لوييس، أم غير ذلك؟</p>  | 10.             |  |



**الفكرة الرئيسية** فَسِّرْ لِمَاذَا لَا تُصَنَّفُ الْكَثِيرُ مِنْ أَحْمَاضٍ وَقَوَاعِدٍ لُويِّسٍ عَلَى أَنْهَا أَحْمَاضٌ أَوْ قَوَاعِدٌ أَرْهِينِيُوسٌ أَوْ بُروْنِسْتَدْ - لُورِي؟

يُعَدُّ حَمْضُ لُويِّسٍ مُسْتَقْبَلًا لِزِوْجٍ مِنَ الْإِلْكْتْرُونَاتِ، فِي حِينٍ تُعَدُّ قَاعِدَةُ لُويِّسٍ مَا نِحَةً لِزِوْجٍ مِنَ الْإِلْكْتْرُونَاتِ. وَلَا يَحْتَوِي حَمْضُ لُويِّسٍ عَلَى أَيُّونَ هِيدْرُوجِينَ، أَوْ أَيُّونَ هِيدْرُوكْسِيدٍ قَابِلٍ لِلتَّأْيِينِ لِكِيْ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ حَمْضًا أَوْ قَاعِدَةَ أَرْهِينِيُوسٍ، كَمَا أَنَّ حَمْضُ لُويِّسٍ لَا يَمْتَلِكُ أَيُّونَ هِيدْرُوجِينَ لِكِيْ يُمْنَحَهُ لِغَيْرِهِ. لِذَلِكَ، فَهُوَ لَيْسُ حَمْضًا بُروْنِسْتَدْ - لُورِي، وَلَكِنَّ تُعَدُّ قَوَاعِدُ لُويِّسٍ جَمِيعُهَا قَوَاعِدُ بُروْنِسْتَدْ - لُورِي؛ لِأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى اسْتِقْبَالِ أَيُّونَ هِيدْرُوجِينَ.

6. قارن بين الخواص الفيزيائية والكيميائية للأحماض والقواعد.

**الخواص الفيزيائية:** الأحماض طعمها حمضيٌّ وتوصُلُ الكهرباء. أمّا القواعد فطعمها مرّ، وهي زلقة الملامس، وتوصُلُ الكهرباء. **الخواص الكيميائية:** تتفاعل الأحماض مع الفلزات لِتُنْتَجَ غاز الهيدروجين، كما تحوّل لون ورق تباع الشمس الأزرق إلى الأحمر. وتتفاعل القواعد مع الأحماض، وتحوّل لون تباع الشمس الأحمر إلى الأزرق.

7. وضح كيف تحدد تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد ما إذا كان محلول حمضياً أم قاعدياً أم متعادلاً؟


يكون تركيز  $[H^+] < [OH^-]$  في محلول الحمضي، في حين يكون تركيزهما  $[OH^-] = [H^+]$  في محلول المتعادل؛ أمّا في محلول القاعدي فيكون  $[H^+] > [OH^-]$ .



8. اشرح لماذا لا يصنف العديد من المركبات التي تحتوي على ذرة هيدروجين أو أكثر بوصفها أحماض أرهيبيوس؟

**المركبات التي لديها ذرة هيدروجين أو أكثر قابلة للتأين هي أحماض أرهيبيوس فقط.** ويمكن لذرة الهيدروجين القابلة للتأين أن ترتبط بعنصر له خواص كهروسانبانية مثل الأكسجين.


9. حدد الأزواج المترافقية من الأحماض والقواعد في المعادلة الآتية:



**يُعدّ  $\text{HNO}_2$  حمضاً في حين يُعدّ  $\text{NO}_2^-$  قاعدة مترافقية، ويُعدّ  $\text{H}_2\text{O}$  قاعدة في حين يُعدّ  $\text{H}_3\text{O}^+$  حمضاً مترافقاً.**

10. اكتب تركيب لويس لثالث كلوريد الفوسفور  $\text{PCl}_3$ . هل يعد حمض لويس، أم قاعدة لويس، أم غير ذلك؟

**يمتلك الفوسفور في  $\text{PCl}_3$  ثلاثة إلكترونات يتشاركونها مع ثلات ذرات كلور، وزوج إلكترونات غير مشترك، يعمل عمل قاعدة لويس كما في الشكل الآتي:**



## 2-2

### الأهداف

- تربط قوة الحمض والقواعد مع درجة تأينها.
- تقارن قوة حمض ضعيف بقوة قاعده المرافقه.
- تشرح العلاقة بين قوى الأحماض والقواعد وقيم ثوابت تأينها.

### مراجعة المفردات

إلكتروليت: مادة يوصل محلولها المائي التيار الكهربائي.

### المفردات الجديدة

الحمض القوي

الحمض الضعيف

ثابت تأين الحمض

القاعدة القوية

القاعدة الضعيفة

ثابت تأين القاعدة

## قوة الأحماض والقواعد

## Strengths of Acids and Bases


**الفكرة الرئيسية** تتأين الأحماض والقواعد القوية في المحاليل تأيناً تماماً، بينما تتأين الأحماض والقواعد الضعيفة في المحاليل تأيناً جزئياً.

**الربط مع الحياة** تعتمد التمريرة الناجحة في لعبة كرة القدم على كلٍّ من المرسل والمستقبل، فيُعرف مثلاً مدى استعداد المرسل لتمرير الكرة، ومدى استعداد المستقبل لاستقبال الكرة. وكذلك الحال في تفاعلات الأحماض والقواعد؛ حيث يعتمد سير التفاعل على مدى استعداد الحمض لمنح أيون الهيدروجين، ومدى استعداد القاعدة لاستقباله.


### قوة الأحماض Strengths of Acids


من خواص المحاليل الحمضية والقواعدية أنها توصل الكهرباء. ما المعلومات التي تستطيع معرفتها عن أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد في هذه المحاليل المائية من خلال توصيلها للكهرباء؟ افترض أنك تفحص قدرة التوصيل الكهربائي ل محلول مائي تركيزه  $0.10\text{ M}$  من حمض الهيدروكلوريك، وآخر مماثل من حمض الإيثانوليك (الخل). يدل توهج المصباح الكهربائي في الشكل 2-11 على أن المحلول يوصل الكهرباء. ولكن إذا قارنت توهج المصباح المتصل بمحلول  $\text{HCl}$  في الشكل 2-11 بتوهج المصباح المتصل بمحلول  $\text{CH}_3\text{COOH}$  في الشكل 2-12 فلا بد أن تلاحظ فرقاً؛ فتوصيل محلول  $\text{HCl}$  للكهرباء أفضل من توصيل محلول  $\text{CH}_3\text{COOH}$ . فلما هذا الفرق مع أن تركيزي الحمضين متساويان؟

**الأحماض القوية** يعتمد توصيل التيار الكهربائي على عدد الأيونات في المحلول. وقد تأينت جزيئات  $\text{HCl}$  الموجودة في المحلول جميعها كلياً مكونةً أيونات هيدرونيوم وأيونات كلوريد.



الشكل 2-11 يتوجه المصباح بقوه عندما يوضع القطبان في محلول حمض الهيدروكلوريك بتركيز  $0.10\text{ M}$ ؛ لأن جميع  $\text{HCl}$  تتحلل إلى أيونات هيدرونيوم وأيونات كلوريد.






الشكل 2-12 عند وضع الأقطاب في محلول حمض الإيثانويك بتركيز 0.10 M يكون الضوء خافتًا. قارن هذه الصورة بالشكل 11-2.

**فسر الفرق بين شدتي إضاءة المصباحين بحسب تركيز الأيونات في المحلول.**

## يتوجه الضوء أكثر عندما يحتوي المحلول على أيونات أكثر

وتسمى الأحماض التي تتأين كليةً **أحماضاً قوية**. ولأن الأحماض القوية تنتج أكبر عدد من الأيونات، لذا فهي موصلات جيدة للكهرباء.

يمكن تمثيل تأين حمض الهيدروكلوريك في الماء بالمعادلة الآتية:



**الأحماض الضعيفة** إذاً كان سبب الإضاءة القوية لمصباح الجهاز الذي يحتوي على HCl هو عدد الأيونات الكبير في المحلول - كما في الشكل 11-2 - فإن الإضاءة الخافتة لمصباح الجهاز الذي يحتوي على محلول CH<sub>3</sub>COOH، المبين في الشكل 12-2، لا بد أن يكون سببها احتواء محلول حمض الإيثانويك (الخل) على عدد أقل من الأيونات. ولأن محلولين يحتويان على التركيز المolar نفسه لذا نستنتج أن حمض الإيثانويك لا يتأين كليةً. ولذلك يسمى الحمض الذي يتأين جزئياً فقط في المحلول المائي المخفف **الحمض الضعيف**. ولأن الأحماض الضعيفة تنتج أيونات أقل فإنها لا توصل الكهرباء جيداً مثل الأحماض القوية. ويبيّن الجدول 3-2 معادلات التأين لبعض الأحماض الضعيفة والأحماض القوية الشائعة.

الجدول 2-3 معادلات التأين


أحماض ضعيفة		أحماض قوية	
معادلات التأين	الاسم	معادلات التأين	الاسم
$\text{HF} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{F}^-$	الميدروفلوريك	$\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$	الميدروكلوريك
$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-$	الإيثانويك	$\text{HI} \rightarrow \text{H}^+ + \text{I}^-$	الميدرويوديك
$\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HS}^-$	كبريتيد الميدروجين	$\text{HClO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{ClO}_4^-$	البيركلوريك
$\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$	الكربونيكي	$\text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{NO}_3^-$	النيتريك
$\text{HClO} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{ClO}^-$	الميدوكلوروز	$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$	الكبريتيك

## واقع الكيمياء في الحياة

### سيانيد الهيدروجين




مركب مميت سيانيد الهيدروجين  $\text{HCN}$  غاز سام يوجد في عوادم المركبات، وفي دخان التبغ والخشب، وفي دخان البلاستيك المحترق المحتوي على النيتروجين. وتطلق بعض الحشرات سيانيد الهيدروجين للدفاع عن نفسها. ويسمى محلول سيانيد الهيدروجين في الماء حمض الهيدروسيانيك. وتحتوي نوى بعض الفواكه - ومنها الكرز والخوخ - على سيانوهيدرين الذي يتحول إلى حمض الهيدروسيانيك في الجهاز الهضمي إذا أكلت النواة. ولكن لا يوجد حمض الهيدروسيانيك في لب هذه الثمار، لذا يمكن أكله بأمان.




يمثل  $\text{HX}$  حمضًا قويًا وقاعدته المرافقة ضعيفة. أي أن  $\text{HX}$  يتآكل بنسبة 100% تقريبًا؛ لأن الماء قاعدة أقوى (في التفاعل الأمامي) من قاعدته المرافقة  $\text{X}^-$  (في التفاعل العكسي). أي أنه يقع اتزان التأكيل كليًا تقريبًا إلى اليمين؛ لأن جذب القاعدة  $\text{H}_2\text{O}$  لأيون  $\text{H}^+$  أكبر من جذب القاعدة المرافقة  $\text{X}^-$ . فكر في هذا الأمر وكأنه معركة لقواعد، أيهما لديه قوة جذب أكبر لأيون الهيدروجين:  $\text{H}_2\text{O}$  أم  $\text{X}^-$ ? الماء هو القاعدة الأقوى عندما تكون الأحماض كلها قوية. لاحظ أن المعادلة مبينة بسهم واحد إلى اليمين.

كيف يختلف الوضع لأي حمض ضعيف  $\text{HY}$ ؟



يميل اتزان التأكيل للحمض الضعيف إلى يسار المعادلة؛ لأن القاعدة المرافقة  $\text{Y}^-$  لديها جذب أكبر لأيون الهيدروجين من القاعدة  $\text{H}_2\text{O}$ . وتعد القاعدة المرافقة  $\text{Y}^-$  (في التفاعل العكسي) أقوى من القاعدة  $\text{H}_2\text{O}$  (في التفاعل الأمامي)، وتستطيع أن تستولي على أيون  $\text{H}^+$ . فمثلاً في حالة حمض الإيثانويك (الخل) تعد القاعدة المرافقة (في التفاعل العكسي) أقوى في جذب أيونات الهيدروجين من القاعدة  $\text{H}_2\text{O}$  (في التفاعل الأمامي).



لاحظ أن المعادلة تحتوي على سهمي اتزان.

**ماذا قرأت؟** لخص أهم الاختلافات بين الأحماض القوية والأحماض الضعيفة عند تفاعلهما مع القواعد.

**القاعدة المرافقة للحمض القوي تكون ضعيفة جداً، ولذلك قدرتها على جذب أيون هيدروجين تكون ضعيفة أيضاً، في حين تكون القاعدة المرافقة للحمض الضعيف أقوى، وتتنافس بنجاح في سبيل الحصول على الهيدروجين**

**ثابت تأكيل الحمض** تساعد نظرية برونستاد-لوري على تفسير قوة الأحماض، إلا أنها لا تُعبر بطريقة كمية عن قوة الحمض، ولا تقارن بين قوى الأحماض المختلفة. لذا يعود تعريف ثابت الاتزان قياساً كميّاً لقوّة الحمض.

إن الحمض الضعيف ينتج خليط اتزان من الجزيئات والأيونات في محلول المائي. لذا يعطي ثابت الاتزان  $K_{\text{eq}}$  قياساً كميّاً لدرجة تأكيل الحمض. تأمل حمض الهيدروسيانيك  $\text{HCN}$ ، الذي يستعمل في الصباغة، والحرفر على الفولاذ، وتليينه.




## مفن في الكيمياء

### عامل المشتل الوظيفة الرئيسية لعامل

المشتل هي الاهتمام بتكاثر النباتات ونموها. وهذا يشمل زراعتها وتقطيمها ونقلها. ويبيع جميع أنواع المواد التي تتعلق بالنباتات. لذا يجب أن يعرف عامل المشتل المغذيات التي يحتاج إليها النبات للنمو الأفضل وظروف التربة، ومنها حموضة التربة التي تعزز نمو كل نوع من النباتات.

فيما يأتي معادلة التأين، وتعبير ثابت الاتزان لحمض الهيدروسيانيك:




يعد تركيز الماء السائل في مقام تعبير ثابت الاتزان ثابتاً في المحاليل المائية المخففة، لذلك يمكن دمجه مع  $K_{\text{eq}}$  ليعطي ثابت اتزان جديداً  $K_a$ .

$$K_{\text{eq}} [\text{H}_2\text{O}] = K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]} = 6.2 \times 10^{-10}$$

يسمى  $K_a$  ثابت تأين الحمض، وهو قيمة ثابت الاتزان لتأين الحمض الضعيف. وكما في تعبير الاتزان جميعها، تدل قيمة  $K_a$  على ما إذا كانت المواد المتفاعلة أو النواتج هي المفضلة عند الاتزان. أما للأحماض الضعيفة فتمثيل تراكيز الأيونات (النواتج) في البسط إلى أن تكون صغيرة مقارنة بتركيز الجزيئات غير المتأينة (المواد المتفاعلة) في المقام. وتكون قيم  $K_a$  للأحماض الأضعف أصغر؛ وذلك لاحتواء محليلها على أقل تراكيز أيونات وأعلى تراكيز الجزيئات الحمض غير المتأينة. ويحتوي الجدول 4-2 على قائمة لقيم  $K_a$  ومعادلات التأين لعدة أحماض ضعيفة. لاحظ أن الأحماض المتعددة البروتونات ليست بالضرورة قوية التأين؛ فلكل تأين للحمض المتعدد البروتونات قيمة  $K_a$  مختلفة.

### مسائل تدريبية

11. اكتب معادلات التأين وتعبيرات ثابت تأين الحمض لكل مما يأتي:



12. اكتب معادلة التأين الأولى والثانية لحمض السلينوز  $\text{H}_2\text{SeO}_3$ .

13. تحضير إذا أعطيت المعادلة الرياضية الآتية:  $K_a = \frac{[\text{AsO}_4^{3-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HAsO}_4^{2-}]}$  ، فاكتتب المعادلة الموزونة للتفاعل.


## الإجابة في الصفحة التالية

الجدول 2-4


### ثوابت تأين الأحماض الضعيفة

$K_a$ (298 K)	معادلة التأين	الحمض
$8.9 \times 10^{-8}$	$\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HS}^-$	كبريتيد الهيدروجين، التأين الأول
$1 \times 10^{-19}$	$\text{HS}^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{S}^{2-}$	كبريتيد الهيدروجين، التأين الثاني
$6.3 \times 10^{-4}$	$\text{HF} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{F}^-$	هيدروفلوريك
$6.2 \times 10^{-10}$	$\text{HCN} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CN}^-$	هيدروسيانيك
$1.8 \times 10^{-5}$	$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$	الإيثانويك (حمض الخل)
$4.5 \times 10^{-7}$	$\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$	الكربونيكي، التأين الأول
$4.7 \times 10^{-11}$	$\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$	الكربونيكي، التأين الثاني


11. اكتب معادلات التأين وتعابير ثابت تأين الحمض لكل مما يأتي:



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{ClO}_2^-]}{[\text{HClO}_2]}$$





$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{NO}_2^-]}{[\text{HNO}_2]}$$




$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{IO}^+]}{[\text{HIO}]}$$

12. اكتب معادلة التأين الأولى والثانية لحمض السلينيوز  $\text{H}_2\text{SeO}_3$ .



13. تحفيز إذا أعطيت المعادلة الرياضية الآتية:  $K_a = \frac{[\text{AsO}_4^{3-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HAsO}_4^{2-}]}$  ، فاكتتب المعادلة الموزونة للتفاعل.



تجربة

قارن بین قوی الاحماض

كيف تستطيع أن تحدد القوى النسبية للمحاليل الحمضية؟

5. أعد الخطوة 4 باستعمال حمض الإيثانويك الذي تركيزه  $M$  وحمض الإيثانويك  $M$  0.10 والفحوتين  $A_3$  و  $A_4$  على التوالي.

التحليل

1. اكتب معادلة تأين حمض الإيثانويك في الماء، وتعبير ثابت الاتزان  $K_{\text{eq}} = 1.8 \times 10^{-5}$ . علام تدل قيمة  $K_{\text{eq}}$  فيما يخص درجة التأين؟

2. اشرح هل تتفق نسب التأين المئوية التقريبية الآتية مع نتائجك؟

  - حمض الإيثانويك (حمض الخل) المركز
  - حمض الإيثانويك M 0.1%, 6.0%
  - حمض الإيثانويك M 0.2%, 1.0%
  - حمض الإيثانويك M 0.4%, 1.0%
  - حمض الإيثانويك M 1.3%, 0.1%

3. اقترح فرضية تشرح ملاحظاتك مستعيناً في ذلك بإجابتك عن السؤال 2.

4. استعمل فرضيتك للتوصيل إلى استنتاج يتعلق بضرورة استعمال كميات كبيرة من الماء للفصل عندما ينسكب حمض على نسيج حي.

#### **١. املاً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.**

2. استعمل مخاراً مدرجاً سعته 10 mL لقياس 3 mL من حمض الإيثانويك المركز. استعمل القطرارة لنقل الحمض إلى الفجوة A1 من طبق التفاعلات البلاستيكي ذي الأربع والعشرين فجوة. ويمكنك استخدام أنابيب الاختبار كبديل في حالة عدم توفر طبق التفاعلات. تحذير: حمض الإيثانويك (الخل) المركز مادة أكلة وسامة عند الاستنشاق؛ لذا تعامل معها بحذر.

3. ضع قطبي جهاز الموصليه الكهربائيه (الدائرة الكهربائيه) في الفجوة  
A1، وسجل ملاحظاتك.


4. اغسل المخار المدرج والقطارة بالماء، ثم قس 3 mL من حمض الإيثانويك M 6.0 وضعها في الفجوة A2 من طبق التفاعلات. افحص موصليّة محلول وسجلها.

**الاجابة في الصفحة التالية**


## Strengths of Bases قوّة القواعد

نطلق القواعد أيونات  $\text{OH}^-$ ، ويعتمد توصيل القاعدة للتيار الكهربائي على مقدار ما تتجهُ من أيونات  $\text{OH}^-$  في محلول المائي.

**القواعد القوية** القاعدة التي تتحلل كلياً متجةً أيونات فلزية وأيونات الهيدروكسيد نعرف بأنها قاعدة قوية. لذا فهيدروكسيدات الفلزات - ومنها هيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$  - قواعد قوية.




نعد بعض هيدروكسيدات الفلزات - ومنها هيدروكسيد الكالسيوم  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  - مصدراً ضعيفاً لأيونات  $\text{OH}^-$ ; لأن ذائبيتها منخفضة. لاحظ أن ثابت حاصل الذائبية  $K_{\text{sp}}$  هيدروكسيد للكالسيوم  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  صغير، مما يدل على أن كمية قليلة من  $\text{OH}^-$  توجد في المحلول المشبع.



ومع ذلك فإن هيدروكسيد الكالسيوم وغيرها من هيدروكسيدات الفلزات القليلة الذوبان قواعد قوية؛ لأن كل ما يذوب منها يتأثر كلياً. ويبين الجدول 5-2 معادلات تحلل بعض القواعد القوية .

**القواعد الضعيفة** تأين القواعد الضعيفة جزئياً فقط في المحاليل المائية المخففة. فمثلاً، يتفاعل ميثيل أمين  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  مع الماء ليتتج مخلوطاً متزناً من جزيئات  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  وأيونات  $\text{CH}_3\text{NH}_3^+$ ، وأيونات  $\text{OH}^-$ .



## الجدول 2-5

$\text{NaOH}_{(s)} \rightarrow \text{Na}^{+}_{(\text{aq})} + \text{OH}^{-}_{(\text{aq})}$

$\text{KOH}_{(s)} \rightarrow \text{K}^{+}_{(\text{aq})} + \text{OH}^{-}_{(\text{aq})}$

$\text{RbOH}_{(s)} \rightarrow \text{Rb}^{+}_{(\text{aq})} + \text{OH}^{-}_{(\text{aq})}$


$\text{CsOH}_{(s)} \rightarrow \text{Cs}^{+}_{(\text{aq})} + \text{OH}^{-}_{(\text{aq})}$

$\text{Ca(OH)}_{2(s)} \rightarrow \text{Ca}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{OH}^{-}_{(\text{aq})}$

$\text{Ba(OH)}_{2(s)} \rightarrow \text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{OH}^{-}_{(\text{aq})}$



1. اكتب معادلة تأين حمض الإيثانويك في الماء، وتعبير ثابت الاتزان  $K_{eq} = 1.8 \times 10^{-5}$ . علام تدل قيمة  $K_{eq}$  فيما يخص درجة التأين؟



$$K_a = [\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]/[\text{CH}_3\text{COOH}] = 1.8 \times 10^{-5}$$

القليل جداً من حمض الخل يتأين.

2. اشرح هل تتفق نسب التأين المئوية التقريبية الآتية مع نتائجك؟

حمض الإيثانويك (حمض الخل) المركز

حمض الإيثانويك 0.1%, 6.0 M

حمض الإيثانويك 0.2%, 1.0 M

حمض الإيثانويك 0.4%, 1.0 M

حمض الإيثانويك 1.3%, 0.1 M

نعم. بالمقارنة بين محلولي 6.0 M و 1.0 M ، يحتوي محلول 1.0 M نسبة تأين أعلى؛ ونسبة الأيونات العالية تزيد التوصيل، ولكن التخفيف المتواصل يقلل التركيز الكلي للأيونات لدرجة أن توصيل محلول 0.1 M أقل.



3. اقترح فرضية تشرح ملاحظاتك مستعيناً في ذلك بإجابتك عن السؤال 2.

كلما ازداد تخفيف الحمض الضعيف تحسّن توصيله للكهرباء؛ لأنّ تأينه يزداد. يؤدي الماء إلى زيادة نسبة التأين. غير أنه في آخر الأمر يصبح الحمض مخففاً لدرجة أنّ التوصيل يقلّ؛ لأنّ كمية حمض الخلّيك الموجودة تصبح قليلة نسبياً.

4. استعمل فرضيتك للتوصيل إلى استنتاج يتعلق بضرورة استعمال كميات كبيرة من الماء للغسل عندما ينسكب حمض على نسيج حي.

يمكن أن تزيد إضافة كميةٍ صغيرةٍ من الماء قوة الحمض الظاهريّة؛ فتتلف الأنسجة، لذا يجب إضافة كميةٍ كبيرةٍ من الماء عند انسكاب الأحماض؛ لتخفيض الحمض بسرعة، وغسله



## الجدول 6-2

ثابت التأين لبعض القواعد الضعيفة	القاعدة
K <sub>b</sub> (298 K)	معادلة التأين
$5.0 \times 10^{-4}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_{2(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})}$
$4.3 \times 10^{-4}$	$\text{CH}_3\text{NH}_{2(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{NH}_3^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})}$
$2.5 \times 10^{-5}$	$\text{NH}_{3(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})}$
$4.3 \times 10^{-10}$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_{2(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})}$

يميل هذا الاتزان إلى اليسار؛ لأن القاعدة  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  ضعيفة، والقاعدة المترافق  $\text{OH}^-$  قوية؛ لأن قوة جذب أيون الهيدروكسيد لأيون الهيدروجين أقوى من جذب جزيء الميثيل أمين لأيون الهيدروجين.

**ثابت تأين القواعد** تكون القواعد الضعيفة مخالط اتزان من الجزيئات والأيونات في المحاليل المائية، كما في الأحماض الضعيفة. ويعد ثابت اتزان قياساً لمدى تأين القاعدة. وتبين المعادلة الآتية ثابت اتزان تأين الميثيل أمين في الماء:

$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{NH}_2]}$$

ويمكن تعريف ثابت تأين القاعدة  $K_b$  بأنه قيمة تعبّر عن ثابت اتزان تأين القاعدة الضعيفة. وكلما صغرت قيمة  $K_b$  كانت القاعدة أضعف. ويبين الجدول 6-2 قيم  $K_b$  ومعادلات التأين لبعض القواعد الضعيفة.

### مسائل تدريبية

14. اكتب معادلات التأين وتعبير ثابت التأين للقواعد الآتية:

c . أيون الكربونات  $\text{CO}_3^{2-}$

a . هكسيل أمين  $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NH}_2$

d . أيون الكبريتات الهيدروجينية  $\text{HSO}_4^-$

b . بروبيل أمين  $\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2$

15. تحفيز اكتب معادلة اتزان قاعدة يكون فيها  $\text{PO}_4^{3-}$  قاعدة في التفاعل الأمامي، و  $\text{OH}^-$  قاعدة في التفاعل العكسي.

## التقويم 2-2

### الخلاصة

• تأين الأحماض والقواعد القوية كلّياً في المحاليل المائية المخففة. بينما تأين الأحماض والقواعد الضعيفة تأيّناً جزئياً في المحاليل المائية المخففة.



• تعد قيمة ثابت تأين الحمض أو القاعدة الضعيفة قياساً لقوّة الحمض أو القاعدة.

16. **الفكرة الرئيسية** صف محتويات محليل مائية مخففة للحمض القوي  $\text{HI}$  والحمض

.  $\text{HCOOH}$  الضعيف.

17. ما العلاقة بين قوة الحمض الضعيف وقوّة قاعده المترافق؟

18. حدد الأزواج المترافق للحمض والقاعدة في كل معادلة مما يأتي:




19. اشرح ما الذي يمكن أن تستفيد منه معرفة أن قيمة  $K_b$  للأنيلين  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$  هي  $?K_b = 4.3 \times 10^{-10}$

20. فسر البيانات استعمل البيانات في الجدول 4-2 لترتيب الأحماض السبعة تصاعدياً بحسب توصيلها للكهرباء.




14. اكتب معادلات التأين وتعبير ثابت التأين للقواعد الآتية:

هكسيل أمين .a




$$K_b = \frac{[\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NH}_{3^+}] [\text{OH}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NH}_2]}$$

بروبيل أمين .b




$$K_b = \frac{[\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_{3^+}] [\text{OH}^-]}{[\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2]}$$

أيون الكربونات .c



$$K_b = \frac{[\text{HCO}_3^-] [\text{OH}^-]}{[\text{CO}_3^{2-}]}$$

أيون البيكريتات .d



$$K_b = \frac{[\text{H}_2\text{SO}_3] [\text{OH}^-]}{[\text{HSO}_3^-]}$$

15. تحفيز اكتب معادلة اتزان قاعدة يكون فيها  $\text{PO}_4^{3-}$  قاعدة في التفاعل الأمامي، و  $\text{OH}^-$  قاعدة في التفاعل العكسي.





16. الفكرة **الرئيسة** صف محتويات محليل مائية مخففة للحمض القوي HI والحمض الضعيف HCOOH.

يحتوي محلول HI فقط على أيونات  $\text{H}_3\text{O}^+$  و  $\text{I}^-$  وجزيئات  $\text{H}_3\text{O}^+$ ، ويحتوي محلول HCOOH على أيونات  $\text{H}_3\text{O}^+$  و  $\text{HCOO}^-$ ، وجزيئات  $\text{H}_2\text{O}$  و  $\text{HCOOH}$ .

17. ما العلاقة بين قوة الحمض الضعيف وقوة قاعدته المرافقة؟

**كلما ازدادت قوّة الحمض ازداد ضعف قاعدته المرافقة.**  
**وكلما ضعف الحمض ازدادت قوّة قاعدته المرافقة.**

18. حدد الأزواج المترافقه للحمض والقاعدة في كل معادلة مما يأتي:



الحمض:  $\text{HCOOH}$ ; القاعدة المترافقه:  $\text{HCOO}^-$ ;

القاعدة:  $\text{H}_2\text{O}$ ; الحمض المترافق:  $\text{H}_3\text{O}^+$ ;



الحمض:  $\text{H}_2\text{O}$ ; القاعدة المترافقه:  $\text{OH}^-$ ;

القاعدة:  $\text{NH}_3$ ; الحمض المترافق:  $\text{NH}_4^+$

19. اشرح ما الذي يمكن أن تستفيده من معرفة أن قيمة  $K_b$  للأنيلين  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$  هي

$$?K_b = 4.3 \times 10^{-10}$$

**قياس  $K_b$  يدلّ على أنّ الأنيلين قاعدة ضعيفة.**

20. فسر البيانات استعمل البيانات في الجدول 4-2 لترتيب الأحماض السبعة تصاعدياً بحسب توصيلها للكهرباء.

$\text{HS}^-$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{HCOOH}$ ,  $\text{HF}$

## 2-3

### الأهداف

- تشرح معنى المصطلحات  $pOH$  و  $pH$ .
- تربط بين  $pH$  و  $pOH$  و ثابت التأين للماء.
- تحسب قيمة  $pH$  و  $pOH$  للمحاليل المائية.

### مراجعة المفردات

**مبدأ لوتشاتلييه:** ينص على أنه إذا وقع ضغط على نظام في حالة اتزان فإن النظام يتوجه في الاتجاه الذي يقلل من ذلك الضغط.

### مفردات جديدة

ثابت تأين الماء  $K_w$   
الرقم الهيدروجيني  $pH$   
الرقم الهيدروكسيلي  $pOH$

## أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني


## Hydrogen Ions and pH

**الغرة الرئيسية** يعبر كل من  $pH$  و  $pOH$  عن تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد في المحاليل المائية.

**الربط مع الحياة** لعلك شاهدت طفلين يلعبان على لعبة التوازن (السيسو). عندما يرتفع أحد طرفي العارضة يهبط الطرف الآخر. وأحياناً توازن العارضة في الوسط. تسلك تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد في المحاليل المائية سلوكاً مماثلاً.

### ثابت التأين للماء Ion Product Constant for Water

يحتوي الماء النقى على تراكيز متساوية لأيونات  $H^+$  و  $OH^-$  التي تنتج عن تأينه الذاتى. ويبيّن الشكل 13-2 تكون أعداد متساوية من أيونات الهيدرونيوم والهيدروكسيد في عملية التأين الذاتى للماء. ويمكن تبسيط معادلة الاتزان على النحو الآتى:



ثابت تأين الماء  $K_w$  يشير السهم الثنائى إلى أن هذا تفاعل اتزان. لذا تذكر أنه يجب كتابة تعبير ثابت الاتزان بوضع تراكيز النواتج في البسط، وتراكيز المواد المتفاعلة في المقام. وفي هذه الحالة، جميع المواد قوتها واحد؛ لأن معاملاتها جميعها في المعادلة الكيميائية 1. ولأن تركيز الماء النقى ثابت، لذا لا يظهر  $[H_2O]$  في المقام.

### ثابت تأين الماء $K_w$

حيث إن  $K_w$  ثابت تأين الماء.


و  $[H^+]$  تركيز أيون الهيدروجين.

و  $[OH^-]$  تركيز أيون الهيدروكسيد.

حاصل ضرب تراكيز أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيد في المحاليل المائية المخففة يساوى  $K_w$ .

والتعبير  $K_w$  هو حالة خاصة لثابت الاتزان، ينطبق فقط على الماء. ويسمى ثابت تأين الماء، وهو قيمة تعبر عن ثابت الاتزان للتتأين الذاتى للماء. لقد بينت التجارب أن  $[OH^-]$  و  $[H^+]$  للماء النقى عند  $K = 298$  تكون متساوية؛ حيث يساوى كل منها  $1.0 \times 10^{-7} M$ . لذا تكون قيمة  $K_w$  عند درجة الحرارة  $K = 298$  تساوى  $1.0 \times 10^{-14}$ .

$$K_w = [H^+][OH^-] = (1.0 \times 10^{-7})(1.0 \times 10^{-7}) \\ K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$



الشكل 2-13 يسلك أحد جزيئات الماء في التأين الذاتى للماء سلوك الحمض، ويسلك الجزء الآخر سلوك القاعدة.

**ومبدأ لوتشاتليه** حاصل ضرب  $[H^+]$  و  $[OH^-]$  يساوي دائماً  $1.0 \times 10^{-14}$  عند درجة حرارة K 298. وهذا يعني أنه إذا زاد تركيز أيونات  $H^+$  نقص تركيز أيونات  $OH^-$ . وبالمثل فإن الزيادة في تركيز  $OH^-$  تسبب نقصاناً في تركيز أيونات  $H^+$ . فكر في هذه التغيرات من خلال مبدأ لوتشاتليه؛ حيث تسبب إضافة أيونات هيدروجين إضافية إلى إضطراب في حالة الاتزان، فيعمل النظام على التقليل من تأثير الزيادة في التركيز؛ حيث تتفاعل أيونات  $H^+$  المضافة مع أيونات  $OH^-$  لتكون المزيد من جزيئات الماء، وهكذا يقل تركيز  $OH^-$ .

يبين المثال 1-2 كيف تستعمل  $K_w$  لحساب تركيز  $H^+$  أو  $OH^-$  إذا عرفت تركيز أحدهما.

**ماذا قرأت؟** اشرح لماذا لا يتغير  $K_w$  عند زيادة تركيز أيونات الهيدروجين؟

## عندما يزداد تركيز $H^+$ ينقص تركيز $OH^-$ بحيث يكون حاصل ضرب تركيز الأيونين ثابتاً دائماً

مثال 2-1

احسب قيمة  $[H^+]$  و  $[OH^-]$  باستعمال  $K_w$  إذا كان تركيز أيون  $H^+$  في كوب قهوة عند درجة حرارة K 298 هو  $M 1.0 \times 10^{-5}$ ، فما تركيز أيون  $OH^-$  في القهوة؟ هل تعد القهوة حمضية، أم قاعدية، أم متعادلة؟

### 1 تحليل المسألة

لديك تركيز أيون  $H^+$ ، وتعرف أن  $K_w$  يساوي  $1.0 \times 10^{-14}$ . يمكنك استعمال قانون ثابت تأين الماء لإيجاد  $[OH^-]$ . ولأن  $[H^+] = 1.0 \times 10^{-5} M$  أكبر من  $1.0 \times 10^{-7}$ ، لذا يمكنك أن تتوقع أن يكون  $[OH^-] < 1.0 \times 10^{-7} M$ .

$$\text{المطلوب} \\ [OH^-] = ? \text{ mol/L}$$

$$\text{المعطيات} \\ [H^+] = 1.0 \times 10^{-5} M \\ K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

### 2 حساب المطلوب

استعمل قانون ثابت تأين الماء.

اكتب تعبير ثابت تأين الماء.

أوجد قيمة  $[OH^-]$ :

$$K_w = [H^+][OH^-] \\ [OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]}$$

$$[OH^-] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-5}} = 1.0 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$$

$$K_w = 1.0 \times 10^{-14} \\ [H^+] = 1.0 \times 10^{-5} M$$

لأن قيمة  $[H^+] > [OH^-]$ ، لذا فإن القهوة حمضية.

### 3 تقويم الإجابة

كما هو متوقع، تكون قيمة  $[OH^-] < 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ .

### مسائل تدريبية

21. فيها يأتي قيم تركيز  $H^+$  و  $OH^-$  لأربعة محليلات مائية عند درجة حرارة K 298. احسب  $[H^+]$  أو  $[OH^-]$  لكل محلول، ثم حدد ما إذا كان محلول حمضيّاً، أم قاعديّاً، أم متعادلاً.

$$\begin{array}{ll} [OH^-] = 1.0 \times 10^{-3} M . c & [H^+] = 1.0 \times 10^{-13} M . a \\ [H^+] = 4.0 \times 10^{-5} M . d & [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7} M . b \end{array}$$

22. تحفيز احسب عدد أيونات  $H^+$  وعدد أيونات  $OH^-$  في 300 mL من الماء النقي عند درجة حرارة K 298.



$$[\text{H}^+] \approx 4.0 \times 10^{-5} \text{ M} \quad .\text{d}$$

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

$$1.0 \times 10^{-14} = (4.0 \times 10^{-5})[\text{OH}^-]$$

$$= \frac{1.0 \times 10^{-14}}{4.0 \times 10^{-5}} = \frac{(4.0 \times 10^{-5})[\text{OH}^-]}{(4.0 \times 10^{-5})}$$

$$[\text{OH}^-] = 2.5 \times 10^{-10} \text{ M}$$

بما أن  $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ ، فالمحلول حمضي.

22. تحفيز احسب عدد أيونات  $\text{H}^+$  وعدد أيونات  $\text{OH}^-$  في 300 mL من الماء النقي عند درجة حرارة 298 K.

$$\text{عند درجة حرارة } 298 \text{ K: } [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ M}$$

احسب عدد مولات  $\text{H}^+$ ، ثم احسب عدد الأيونات:

$$\begin{aligned} \text{mol H}^+ &= \frac{1.0 \times 10^{-7} \text{ mol}}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \times 300 \text{ mL} \\ &= 3.0 \times 10^{-8} \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\text{H}^+ \text{ ions} = 3.0 \times 10^{-8} \text{ mol H}^+ \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ H}^+ \text{ ions}}{1 \text{ mol H}^+}$$

$$= 1.8 \times 10^{16} \text{ H}^+ \text{ ions}$$

عدد أيونات  $\text{H}^+$  تساوي عدد أيونات  $\text{OH}^-$  تساوي  $1.8 \times 10^{16}$  ions.



## الرقم الهيدروجيني pH والرقم الهيدروكسيلي pOH

تكون تراكيز  $H^+$  غالباً أرقاماً صغيرة يعبر عنها بطريقة علمية. ولصعوبة استعمال هذه الأرقام تبني الكيميائيون طريقة أسهل للتعبير عنها.

**ما الرقم الهيدروجيني pH؟** يعبر الكيميائيون عن تركيز أيونات الهيدروجين باستعمال تدرج الرقم الهيدروجيني pH المبني على اللوغاريتم. لذا فإن الرقم الهيدروجيني pH لمحلول ما هو سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين.

الرقم الهيدروجيني pH

$$pH = -\log [H^+]$$

يمثل  $[H^+]$  تركيز أيون الهيدروجين

قيمة pH لمحلول ما تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين.

تكون قيم pH للمحاليل الحمضية عند درجة حرارة 298 K أقل من 7. بينما تكون قيمها للمحاليل القاعدية أكبر من 7. وهكذا يكون محلول الذي قيمة pH له تساوي 0.0 حضراً قوياً؛ بينما يكون محلول الذي قيمة pH له تساوي 14 قاعدة قوية. وتعني الطبيعة اللوغاريتمية في هذه الحالة لتدرج pH أن تغير وحدة واحدة من pH يمثل تغيراً مقداره 10 مرات في تركيز الأيون. فالمحلول الذي pH له تساوي 3 له عشرة أضعاف تركيز محلول الذي pH له تساوي 4. ويبين الشكل 2-14 تدرج pH وقيمها لبعض المواد الشائعة.

**ما الرقم الهيدروكسيلي pOH؟** يكون من المناسب أحياناً التعبير عن قاعدية (قلوية) محلول ما على تدرج pOH والذي يعكس صورة العلاقة بين pH و  $[H^+]$ . ويعرف الرقم الهيدروكسيلي pOH لمحلول ما بأنه سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروكسيد.

الرقم الهيدروكسيلي pOH

$$pOH = -\log [OH^-]$$

يمثل تركيز أيون الهيدروكسيد


قيمة pOH لمحلول ما تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروكسيد.

تكون قيم pOH عند درجة حرارة 298 K للمحاليل القاعدية أقل من 7، وللمحاليل المتعادلة تساوي 7؛ بينما يكون محلول الذي قيمة pOH له أعلى من 7 حضرياً. وكما في تدرج pH يمثل تغير وحدة واحدة من pOH تغيراً مقداره 10 مرات في تركيز  $OH^-$ . وهناك علاقة بين pH و pOH تمكناً من حساب أي منها إذا عرفت قيمة الآخر.

ما العلاقة بين pH و pOH؟

$$\begin{aligned} \text{تمثل } pH &= -\log [H^+] \\ \text{تمثل } pOH &= -\log [OH^-] \end{aligned}$$

مجموع pH و pOH يساوي 14.00 .



الشكل 2-14 قارن بين قيم pH لهذه المواد المألوفة.

**حدد أيهما يحتوي على أعلى تركيز لأيونات  $H^+$ :** ماء البحر أم المنظف المنزلي؟


كم مرة يزيد تركيز أحدهما على الآخر؟

يحتوي ماء البحر على التركيز الأعلى من أيونات  $H^+$ ؛ بأكثر

من 100 مرة



يوضح الشكل 15-2 العلاقة بين pH وتركيز  $H^+$ ، والعلاقة بين pOH وتركيز  $OH^-$  عند درجة حرارة K 298.



الشكل 15-2 ادرس هذا الشكل لزيادة معلوماتك حول pH و pOH. لاحظ أنه عند كل موقع عمودي يكون مجموع pH (فوق السهم) و pOH (تحت السهم) مساوياً 14. لاحظ أيضاً أنه عند كل موقع يكون حاصل ضرب  $[H^+] \cdot [OH^-]$  يساوي  $10^{-14}$ .

### مثال 2-2

احسب قيمة pH من  $[H^+]$  ما قيمة pH لمحلول متعادل عند درجة حرارة K 298

#### ١ تحليل المسألة

في محلول المتعادل عند درجة حرارة K 298 ، يكون  $M = 1.0 \times 10^{-7} M$ . ويتعين عليك أن تجد  $[H^+]$ .

المطلوب  
 $pH = ?$

المعطيات  
 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-7} M$

#### ٢ حساب المطلوب

$$pH = -\log [H^+]$$

$$pH = -\log (1.0 \times 10^{-7})$$

عرض المطلوب  
 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-7} M$

تكون قيمة pH للمحلول المتعادل عند درجة حرارة K 298 تساوي 7.00

#### ٣ تقويم الإجابة

كان متوقعاً أن تكون قيمة pH تساوي 7.

#### مسائل تدريبية

23. احسب قيميتي pH للمحلولين الآتيين عند درجة حرارة K 298.

$$[H^+] = 3.0 \times 10^{-6} M . b \quad [H^+] = 1.0 \times 10^{-2} M . a$$

24. احسب قيميتي pH للمحلولين الآتيين عند درجة حرارة K 298.

$$[H^+] = 0.000084 M . b \quad [H^+] = 0.0055 M . a$$

25. تحفيز احسب قيمة pH لمحلول فيه  $[OH^-] = 8.2 \times 10^{-6} M$  يساوي

الإجابة في الصفحة التالية



.23. احسب قيمتي pH للمحلولين الآتيين عند درجة حرارة K 298 .

$$[\text{H}^+] \times 1.0 \times 10^{-2} \text{ M} \quad \text{a.}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log(1.0 \times 10^{-2})$$

$$\text{pH} = 2.00$$

$$[\text{H}^+] = 3.0 \times 10^{-6} \text{ M} \quad \text{b.}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log(3.0 \times 10^{-6})$$

$$\text{pH} = 5.52$$

.24. احسب قيمتي pH للمحلولين الآتيين عند درجة حرارة K 298 .

$$[\text{H}^+] = 0.0055 \text{ M} \quad \text{a.}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log 0.0055$$

$$\text{pH} = 2.26$$

$$[\text{H}^+] = 0.000084 \text{ M} \quad \text{b.}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log 0.000084$$

$$\text{pH} = 4.08$$

.25. تحفيز احسب قيمة pH لمحلول فيه  $[OH^-] = 8.2 \times 10^{-6} M$  يساوي

$$[OH^-] = 8.2 \times 10^{-6} M$$

$$K_w = [H^+][OH^-] \times [H^+] (8.2 \times 10^{-6})$$

$$[H^+] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{8.2 \times 10^{-6}} = 1.2 \times 10^{-9}$$

$$pH = -\log [H^+]$$

$$pH = -\log(1.2 \times 10^{-9})$$

$$pH = 8.92$$



## مثال 3-2

حساب  $\text{pOH}$  و  $\text{pH}$  من  $[\text{OH}^-]$  يظهر الشكل 16-2 صورة بقرة تتغذى على قش عولج ببادرة الأمونيا التي تعمل على زيادة البروتينات عند إضافتها إلى علف الحيوانات. وتستعمل الأمونيا كذلك منظفاً منزلياً؛ وهو محلول مائي لغاز الأمونيا. وعادة ما يكون تركيز أيون الهيدروكسيد في المنظف  $M = 10^{-3} \times 4.0$ . احسب  $\text{pOH}$  و  $\text{pH}$  للمنظف عند درجة حرارة  $298\text{ K}$ .



## 1 تحليل المسألة

لقد أعطيت تركيز أيون الهيدروكسيد، وعليك حساب قيمة  $\text{pOH}$  و  $\text{pH}$ . احسب أولاً قيمة  $\text{pOH}$  مستعملاً القانون، ثم احسب  $\text{pH}$  مستعملاً العلاقة  $\text{pH} + \text{pOH} = 14.00$ .

المطلوب	المعطيات
$\text{pOH} = ?$	$[\text{OH}^-] = 4.0 \times 10^{-3} \text{ M}$
$\text{pH} = ?$	

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$\text{pOH} = -\log (4.0 \times 10^{-3})$$

$$\begin{aligned} &\text{2 حساب المطلوب} \\ &\text{اكتب معادلة } \text{pOH} \\ &\text{عوض } M = 4.0 \times 10^{-3} \text{ م} \\ &\text{. } \text{pOH} \text{ للمحلول هو 2.40} \\ &\text{استعمل العلاقة بين } \text{pH} \text{ و } \text{pOH} \text{ لإيجاد قيمة } \text{pH} \\ &\text{اكتب المعادلة التي تربط بين } \text{pH} \text{ و } \text{pOH} \\ &\text{أوجد قيمة } \text{pH} \\ &\text{عوض 2.40} \end{aligned}$$

قيمة  $\text{pH}$  للمحلول هو 11.60

## 3 تقويم الإجابة

قيمتا  $\text{pH}$  و  $\text{pOH}$  التي تم التوصل إليها صحيحة؛ لأن الأمونيا قاعدة، لذا فإن قيمة  $\text{pOH}$  الصغيرة وقيمة  $\text{pH}$  الكبيرة معقولتان.

## مسائل تدريبية

26. احسب قيمة  $\text{pH}$  و  $\text{pOH}$  للمحاليل المائية ذات التراكيز الآتية عند درجة حرارة  $298\text{ K}$ .

$$[\text{H}^+] = 3.6 \times 10^{-9} \text{ M} . \text{c} \quad [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-6} \text{ M} . \text{a}$$

$$[\text{H}^+] = 2.5 \times 10^{-2} \text{ M} . \text{d} \quad [\text{OH}^-] = 6.5 \times 10^{-4} \text{ M} . \text{b}$$

27. احسب قيمة  $\text{pH}$  و  $\text{pOH}$  للمحلولين المائيين الآتيين عند درجة حرارة  $298\text{ K}$ .

$$[\text{OH}^-] = 0.000033 \text{ M} . \text{a}$$

$$[\text{H}^+] = 0.0095 \text{ M} . \text{b}$$

28. تحفيز احسب قيمة  $\text{pH}$  و  $\text{pOH}$  لمحلول مائي يحتوي على  $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$  من  $\text{HCl}$  مذاب في 5.0 L من محلول.

الإجابة في الصفحة التالية

. 26. احسب قيم pH و pOH للمحاليل المائية ذات التراكيز الآتية عند درجة حرارة 298 K .

$$[\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-6} \text{ M} \quad .\text{a}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$\text{pOH} = -\log(1.0 \times 10^{-6})$$

$$\text{pOH} = 6.00$$

$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH} = 14.00 - 6.00 = 8.00$$

$$[\text{OH}^-] = 6.5 \times 10^{-4} \text{ M} \quad .\text{b}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$\text{pOH} = -\log(6.5 \times 10^{-4})$$

$$\text{pOH} = 3.19$$

$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH} = 14.00 - 3.19 = 10.81$$

$$[\text{H}^+] = 3.6 \times 10^{-9} \text{ M} \quad .\text{c}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log(3.6 \times 10^{-9})$$

$$\text{pH} = 8.44$$

$$\text{pOH} = 14.00 - \text{pH} = 14.00 - 8.44 = 5.56$$

$$[\text{H}^+] = 2.5 \times 10^{-2} \text{ M} \quad .\text{d}$$

$$\text{pH} = -\log(2.5 \times 10^{-2})$$

$$\text{pH} = 1.60$$

$$\text{pOH} = 14.00 - \text{pH} = 14.00 - 1.60 = 12.40$$

.298 احسب قيم pH و pOH للمحلولين المائيين الآتيين عند درجة حرارة K 27.

$$[\text{OH}^-] = 0.000033 \text{ M} .\text{a}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$\text{pOH} = -\log (0.000033)$$

$$\text{pOH} = 4.48$$

$$\text{pH} = 14.00 - 4.48 = 9.52$$

$$[\text{H}^+] = 0.0095 \text{ M} .\text{b}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log (0.0095)$$

$$\text{pH} = 2.02$$

$$\text{pOH} = 14.00 - 2.02 = 11.98$$

.28 تحفيز احسب قيم pH و pOH لمحلول مائي يحتوي على  $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$  HCl من مذاب في 5.0 L من محلول.

$$[\text{HCl}] = [\text{H}^+] = \frac{1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}}{5.0 \text{ L}}$$

$$= 0.00020 \text{ M} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log(2.0 \times 10^{-4}) = -(-3.70) = 3.70$$

$$\text{pOH} = 14.00 - 3.70 = 10.30$$



**حساب تركيز الأيونات من قيم pH** قد تحتاج أحياناً إلى حساب تركيز أيونات  $H^+$  و  $OH^-$  من خلال معرفة قيمة pH للمحلول. والمثال 4-2 يبين كيفية حسابها.

#### مثال 4-2

حساب  $[H^+]$  و  $[OH^-]$  من pH ماقيم  $[H^+]$  و  $[OH^-]$  في دم الشخص السليم الذي قيمة PH له = 7.40، مع افتراض أن درجة حرارة الدم هي K 298.

#### ١ تحليل المسألة

لقد أعطيت قيمة pH لمحلول ما، وعليك أن تحسب قيم  $[H^+]$  و  $[OH^-]$ . يمكنك إيجاد  $[H^+]$  باستعمال معادلة pH، ثم اطرح pH من 14.00 للحصول على قيمة pOH، ثم استعمل المعادلة التي تعرف pH لإيجاد  $[OH^-]$ .

المطلوب	المعطيات
$[H^+] = ? \text{ mol/L}$	pH = 7.40
$[OH^-] = ? \text{ mol/L}$	

#### ٢ حساب المطلوب

$pH = -\log [H^+]$ $- pH = \log [H^+]$ $[H^+] = 10^{-pH}$ $[H^+] = 10^{-7.40}$ $[H^+] = 4.0 \times 10^{-8} \text{ M}$	لإيجاد قيمة $[H^+]$ اكتب معادلة pH $pH = 7.40$ عَوْض
---	---

تركيز أيونات  $H^+$  في الدم  $4.0 \times 10^{-8} \text{ M}$ .  
أُوجد قيمة:  $[OH^-]$ .

$pH + pOH = 14.00$ $pOH = 14.00 - pH$ $pOH = 14.00 - 7.40 = 6.60$ $pOH = -\log [OH^-]$ $- pOH = \log [OH^-]$ $[OH^-] = 10^{-6.60}$ $[OH^-] = 2.5 \times 10^{-7} \text{ M}$	اكتب المعادلة التي تبين العلاقة بين pH و pOH أُوجد قيمة: pOH $7.40 = pH$ اكتب معادلة: pOH اضرب طرفي المعادلة في 1-
--	--

تركيز أيونات  $OH^-$  في الدم  $2.5 \times 10^{-7} \text{ M}$ .

#### ٣ تقويم الإجابة

وُجد أن قيمة  $[H^+]$  أقل من  $10^{-7}$  وأن قيمة  $[OH^-]$  أكبر من  $10^{-7}$ ، وهما إجابتان مقبولتان.

#### مسائل تدريبية

29. احسب  $[H^+]$  و  $[OH^-]$  في كل من الحالات الآتية:

- c . حليب الماغنيسي،  $pH = 10.50$       a . الحليب،  $pH = 6.50$
- d . الأمونيا المنزليه،  $pH = 11.90$       b . عصير الليمون،  $pH = 2.37$

30. تحضير احسب  $[H^+]$  و  $[OH^-]$  في عينة من ماء البحر، حيث  $pOH = 5.60$ .

29. احسب  $[H^+]$  و  $[OH^-]$  في كل من الحالات الآتية:

.a. الحليب،  $pH = 6.50$

$$[H^+] = \text{antilog}(-pH)$$

$$[H^+] = \text{antilog}(-6.50) = 3.2 \times 10^{-7} M$$

$$pOH = 14.00 - pH = 14.00 - 6.50 = 7.50$$

$$[OH^-] = \text{antilog}(-pOH)$$

$$[OH^-] = (-7.50) = 3.2 \times 10^{-8} M$$

.b. عصير الليمون،  $pH = 2.37$

$$[H^+] = \text{antilog}(-pH)$$

$$[H^+] = \text{antilog}(-2.37) = 4.3 \times 10^{-3} M$$

$$pOH = 14.00 - pH = 14.00 - 2.37 = 11.63$$

$$[OH^-] = \text{antilog}(-pOH)$$

$$[OH^-] = \text{antilog}(-11.63) = 2.3 \times 10^{-12} M$$

.c. حليب الماغnesia،  $pH = 10.50$

$$[H^+] = \text{antilog}(-pH)$$

$$[H^+] = \text{antilog}(-10.50) = 3.2 \times 10^{-11} M$$

$$pOH = 14.00 - pH = 14.00 - 10.50 = 3.50$$

$$[OH^-] = \text{antilog}(-3.50) = 3.2 \times 10^{-4} M$$

d. الأمونيا المنزليّة،  $\text{pH} = 11.90$

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-\text{pH})$$

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-11.90) = 1.3 \times 10^{-12} \text{ M}$$

$$\text{pOH} = 14.00 - \text{pH} = 14.00 - 11.90 = 2.10$$

$$[\text{OH}^-] = \text{antilog}(-2.10) = 7.9 \times 10^{-3} \text{ M}$$

30. تحفيز احسب  $[\text{H}^+]$  و  $[\text{OH}^-]$  في عينة من ماء البحر، حيث  $\text{pOH} = 5.60$ .

$$[\text{OH}^-] = \text{antilog}(-\text{pOH})$$


$$[\text{OH}^-] = \text{antilog}(-5.60) = 2.5 \times 10^{-6} \text{ M}$$

$$\text{pH} = 14.00 - 5.60 = 8.40$$

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-8.40) = 4.0 \times 10^{-9} \text{ M}$$


## المولارية والرقم الهيدروجيني pH للأحماض القوية تأمل الدورقين اللذين

يحتويان على محلولي الحمض والقاعدة في الشكل 17-2؛ حيث تم تحضيرهما حديثاً، وسُجلت مولارية كل منها، وهي عدد المولات من الجزيئات أو وحدات الصيغ التي أذيبت في لتر واحد من محلول. يحتوي أحد الدورقين على حمض قوي HCl، ويحتوي الثاني على قاعدة قوية NaOH. تذكر أن الأحماض والقواعد القوية توجد بتركيز 100% في صورة أيونات في محلول. وهذا يعني أن التفاعل الآتي لتأمين HCl يستمر حتى اكتماله.



يتبع كل جزء HCl أيون  $\text{H}^{+}$  واحداً، مما يعني أن الدورق الذي كتب عليه 0.1 M من HCl يحتوي على  $\text{H}^{+}$  0.1 mol من  $\text{H}^{+}$  لكل L، و 0.1 mol من أيونات  $\text{Cl}^{-}$  لكل L. وفي الأحماض القوية الأحادية البروتون جميعها يكون تركيز الحمض مساوياً لتركيز أيونات  $\text{H}^{+}$  في محلول. لذا يمكنك أن تجد قيمة pH من خلال معرفتك لمولارية الحمض.

**المولارية والرقم الهيدروجيني pH للقواعد القوية** وبطريقة مماثلة، يكون محلول القاعدة القوية NaOH ذو التركيز 0.1 M الظاهر في الشكل 17-2 متيناً كلياً.



تتسع كل وحدة صيغة من NaOH أيون  $\text{OH}^{-}$  واحداً. وهكذا يساوي تركيز أيونات  $\text{OH}^{-}$  مولارية محلول، 0.1 M.

قد تحتوي بعض القواعد القوية ومنها هيدروكسيد الكالسيوم  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  على أيوني  $\text{OH}^{-}$  أو أكثر في كل وحدة صيغة. لذا يكون تركيز أيون  $\text{OH}^{-}$  في محلول  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  ضعف مولارية المركب الأيوني. فمثلاً تركيز أيونات الهيدروكسيد في محلول  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  تركيزه  $7.5 \times 10^{-4} \text{ M}$  هو  $7.5 \times 10^{-4} \text{ M} \times 2 = 1.5 \times 10^{-3} \text{ M}$

إن الأحماض القوية والقواعد القوية تتكون كلياً في المحاليل المائية المخففة، والأحماض والقواعد الضعيفة تتكون جزئياً فقط. لذا عليك أن تستعمل قيم  $K_a$  و  $K_b$  لتحديد تركيز أيونات  $\text{H}^{+}$  و  $\text{OH}^{-}$  في محاليل الأحماض والقواعد الضعيفة.

ماذا قرأت؟ أشرح لماذا لا تستطيع أن تحصل على  $\text{H}^{+}$  مباشرة من مولارية محلول حمض ضعيف؟




الشكل 2-17 يرشدك الملصق على دورق الحمض القوي أو القاعدة القوية إلى تركيز أيونات الهيدروجين أو أيونات الهيدروكسيد في محلول. ويعود السبب في ذلك إلى وجود الأحماض والقواعد القوية كلياً على شكل أيونات عند إذابتها في الماء.  
حدد  $[\text{H}^{+}]$  في دورق HCl و  $[\text{OH}^{-}]$  في دورق NaOH.

$$[\text{H}^{+}] = 0.1 \text{ M}$$

$$[\text{OH}^{-}] = 0.1 \text{ M}$$

لا يتكون الحمض الضعيف كلياً؛ لذا لا يساوي عدد مولات الحمض المذابة في لتر من محلول تركيز  $\{\text{H}^{+}\}$

**حساب  $K_a$  من الرقم الهيدروجيني pH** افترض أنك قمت بقياس قيمة pH لمحلول الحمض الضعيف HF الذي تركيزه 0.100 M فوجده 3.20. فهل تكفي هذه المعلومات لحساب قيمة  $K_a$  للحمض؟




يمكنك أن تحسب  $[\text{H}^{+}]$  من خلال معرفة قيمة pH. وتذكر أنه يجب أن يكون هناك تركيز مساو من أيون  $\text{F}^{-}$  مقابل كل  $\text{mol}/\text{L}$  من أيون  $\text{H}^{+}$ . وهذا يعني أنك تعرف اثنين من المتغيرات في قانون  $K_a$ . فماذا عن المتغير الثالث  $[\text{HF}]$ ؟ تركيز HF عند الاتزان يساوي التركيز الابتدائي للحمض (0.100 M) مطروحاً منه  $\text{mol}/\text{L}$  من HF التي تحللت، والتي تساوي  $[\text{H}^{+}]$ .

احسب  $K_a$  من pH يستعمل حمض الميثانويك (الفورميك) HCOOH لمعالجة عصارة أشجار المطاط وتحويلها إلى مطاط طبيعي.  
فإذا كانت قيمة pH لمحلول حمض الميثانويك الذي تركيزه 0.100 M هي 2.38، فما قيمة  $K_a$  للحمض؟

## ١ تحليل المسألة

لديك pH لمحلول حمض الميثانويك، وهذا يمكنك من حساب تركيز أيون الهيدروجين.



تدل المعادلة الكيميائية الموزونة على أن تركيز  $\text{HCOO}^-$  يساوي تركيز  $\text{H}^+$ . تركيز  $\text{HCOOH}$  غير المؤكّن هو الفرق بين التركيز الأولي للحمض و $[\text{H}^+]$ .

المطلوب	المعطيات
$K_a = ?$	pH = 2.38

$$\text{تركيز محلول} = 0.100 \text{ M}$$

## ٢ حساب المطلوب

اكتُب معادلة pH

عُوض pH = 2.38

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-2.38}$$

$$[\text{H}^+] = 4.2 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$[\text{HCOO}^-] = [\text{H}^+] = 4.2 \times 10^{-3} \text{ M}$$

[HCOO<sup>-</sup>] يساوي التركيز الأولي ناقص [H<sup>+</sup>]

اطرح [HCOOH] من [H<sup>+</sup>]

اكتُب قانون ثابت تأين الحمض.

$$[\text{H}^+] = 4.2 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$[\text{HCOOH}] = 0.096 \text{ M} - [\text{HCOO}^-] = 4.2 \times 10^{-3} \text{ M},$$

ثبت تأين الحمض  $\text{HCOOH}$  هو  $1.8 \times 10^{-4}$

3 تقويم الإجابة قيمة  $K_a$  معقولة لحمض ضعيف.

## مسائل تدريبية

31. احسب  $K_a$  للحمضين الآتيين:

pH = 1.80 . محلول  $\text{HClO}_2$  تركيزه 0.0400 M

a . محلول  $\text{H}_3\text{AsO}_4$  تركيزه 0.220 M

32. احسب  $K_a$  للأحماض الآتية:

a . محلول حمض البنزويك  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ ، تركيزه 0.00330 M

b . محلول حمض السيانيك  $\text{HCNO}$ ، تركيزه 0.100 M

c . محلول حمض البيوتانويك  $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$  تركيزه 0.15 M

33. تحفيظ احسب  $K_a$  لمحلول حمض HX الذي تركيزه 0.0091 M، وله  $\text{pOH}$  يساوي 11.32، ثم استعمل الجدول 4-2 لتحديد نوع الحمض.

31. احسب  $K_a$  للحمضين الآتيين:

.a .pH = 1.50 و 0.220 M الذي تركيزه  $H_3AsO_4$  محلول .a

$$K_a = \frac{[H^+][H_2AsO_4^-]}{[H_3AsO_4]}$$

$$[H^+] = \text{antilog} (-\text{pH})$$

$$[H^+] = \text{antilog} (-1.50) = 3.2 \times 10^{-2} M$$

$$[H_2AsO_4^-] = [H^+] = 3.2 \times 10^{-2} M$$

$$[H_3AsO_4] = 0.220 M - 3.2 \times 10^{-2} M = 0.188 M$$

$$K_a = \frac{(3.2 \times 10^{-2})(3.2 \times 10^{-2})}{0.188} = 5.4 \times 10^{-3}$$

.b . محلول  $HClO_2$  الذي تركيزه 0.0400 M و pH= 1.80 .b

$$K_a = \frac{[H^+][ClO_2^-]}{[HClO_2]}$$

$$[H^+] = \text{antilog} (-\text{pH})$$

$$[H^+] = \text{antilog} (-1.80) = 1.6 \times 10^{-2} M$$

$$[ClO_2^-] = [H^+] = 1.6 \times 10^{-2} M$$

$$[HClO_2] = 0.0400 M - 1.6 \times 10^{-2} M = 0.024 M$$

$$K_a = \frac{(1.6 \times 10^{-2})(1.6 \times 10^{-2})}{0.024} = 1.1 \times 10^{-2}$$

32. احسب  $K_a$  للأحماض الآتية:

a. محلول حمض البنزويك  $C_6H_5COOH$ ، الذي تركيزه  $pOH = 10.70$  و  $0.00330\text{ M}$

$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH}$$

$$\text{pH} = 14.00 - 10.70 = 3.30$$

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-\text{pH})$$

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-3.30) = 5.0 \times 10^{-4}\text{ M}$$

$$[C_6H_5COO^-] = [\text{H}^+] = 5.0 \times 10^{-4}\text{ M}$$

$$[C_6H_5COOH] = 0.00330\text{ M} - 5.0 \times 10^{-4}\text{ M} = 0.0028\text{ M}$$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} = \frac{(5.0 \times 10^{-4})(5.0 \times 10^{-4})}{(2.8 \times 10^{-3})}$$

$$K_a = 8.9 \times 10^{-5}$$

b. محلول حمض السيانيك  $HCNO$ ، الذي تركيزه  $0.100\text{ M}$  و  $pOH = 11.00$

$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH}$$

$$\text{pH} = 14.00 - 11.00 = 3.00$$

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-\text{pH})$$

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-3.00) = 1.0 \times 10^{-3}\text{ M}$$

$$[CNO^-] = [\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-3}\text{ M}$$

$$[HCNO] = 0.100 - 1.0 \times 10^{-3}\text{ M} = 0.099\text{ M}$$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][CNO^-]}{[HCNO]} = \frac{(1.0 \times 10^{-3})(10 \times 0.1^{-3})}{(0.099)}$$

$$K_a = 1.0 \times 10^{-5}$$

c. محلول حمض البيوتانويك  $C_3H_7COOH$ ، الذي  
تركيزه  $0.15\text{ M}$  و  $pOH = 11.18$

$$pH = 14.00 - pOH$$

$$pH = 14.00 - 11.18 = 2.82$$

$$[H^+] = \text{antilog}(-pH)$$

$$[H^+] = \text{antilog}(-2.82) = 1.5 \times 10^{-3}\text{ M}$$

$$[C_3H_7COO^-] = [H^+] = 1.5 \times 10^{-3}\text{ M}$$

$$[C_3H_7COOH] = 0.150\text{ M} - 1.5 \times 10^{-3}\text{ M} = 0.149\text{ M}$$

$$K_a = \frac{[H^+][C_3H_7COO^-]}{[C_3H_7COOH]} = \frac{(1.5 \times 10^{-3})(1.5 \times 10^{-3})}{(0.149)}$$

$$K_a = 1.5 \times 10^{-5}$$

33. تحفيز احسب  $K_a$  لمحلول حمض  $HX$  الذي يساوي  $0.0091\text{ M}$ ، وله  $pOH = 11.32$ ، ثم استعمل الجدول 4-2 لتحديد نوع الحمض.

$$pH = 14.00 - pH$$

$$pH = 14.00 - 11.32 = 2.68$$

$$[H^+] = \text{antilog}(-pH)$$

$$[H^+] = \text{antilog}(-2.8) = 2.1 \times 10^{-3}\text{ M}$$

$$[X^-] = [H^+] = 2.1 \times 10^{-3}\text{ M}$$

$$[HX] = 0.0091 - 0.0021 = 0.0070\text{ M}$$

$$K_a = \frac{(0.0021)(0.0021)}{(0.0070)} = 6.3 \times 10^{-4}$$



**الشكل 2-18** يمكن الحصول على قيمة pH تقريرية للمحلول بوضع قطعة من ورق تباع الشمس الأحمر بال محلول، ومقارنة لونها بمجموعة من الألوان المعيارية، كما هو مبين في الصورة a. أما b مقياس الحموضة الرقمي والموضح في الصورة b فيستعمل هنا لقياس pH لمطر حمضي؛ إذ يعطي قياساً أدق من استعمال ورق تباع الشمس.

**قياس الرقم الهيدروجيني pH** يعد ورق تباع الشمس الذي استعملته في التجربة الاستهلاكية مثلاً على نوع من أوراق كاشف الحموضة؛ فكل هذه الأوراق معالجة بمادة أو أكثر تسمى الكواشف؛ حيث يتغير لونها اعتماداً على تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول. ويعد الفينولفثالين الذي استعملته في التجربة الاستهلاكية أيضاً نوعاً من الكواشف. وعند غمس ورقة كاشف pH في محلول حمضي أو قاعدي يتغير لونها، ثم نقوم بمقارنة اللون الجديد للورقة بألوان كاشف pH المعياري الموجود على ورقة مدرّجة، كما هو مبين في **الشكل 2-18**. ويعطي مقياس pH الرقمي الموضح في **الشكل 2-18** قيمة الرقم الهيدروجيني بصورة أكثر دقة؛ فعندما توضع الأقطاب في المحلول يعطي المقياس قراءة مباشرة.

## التقويم 2-3

### الخلاصة

ثابت تأين الماء  $K_w$  يساوي حاصل ضرب تركيز أيون  $\text{OH}^-$  وتركيز أيون  $\text{H}^+$  في المحلول هو سالب لوغاريتيم تركيز أيون الهيدروجين. وقيمة  $\text{pOH}$  هو سالب لوغاريتيم تركيز أيون الهيدروكسيد. ومجموع  $\text{pH}$  و  $\text{pOH}$  يساوي 14.

قيمة  $\text{pH}$  للمحلول المتعادل تساوي 7.0، وقيمة  $\text{pOH}$  في المحلول نفسه تساوي 7.0؛ لأن تركيز أيونات الهيدروجين يساوي تركيز أيونات الهيدروكسيد.

34. **الفكرة الرئيسية** اشرح لماذا تكون قيمة pH للمحلول الحمضي دائمًا أصغر من قيمة  $\text{pOH}$  للمحلول نفسه؟

35. صف كيف يمكنك تحديد قيمة pH لمحلول ما إذا علمت قيمة  $\text{pOH}$  للمحلول نفسه؟

36. اشرح معنى  $K_w$  في المحاليل المائية.

37. اشرح -مستعملاً مبدأ لوتشاتليه - ما يحدث لـ  $[\text{H}^+]$  في محلول حمض الإيثانويك الذي تركيزه 0.10M عند إضافة قطرة من محلول  $\text{NaOH}$ .

38. اكتب قائمة بالمعلومات الازمة لحساب قيمة  $K_a$  لحمض ضعيف.

39. احسب إذا علمت أن قيمة pH لحبة طعام تساوي 4.50 تقريرياً، فما  $[\text{H}^+]$  و  $[\text{OH}^-]$  فيها؟

40. حدد قيمة pH لمحلول يحتوي على  $1.0 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$  من أيونات  $\text{OH}^-$  لكل لتر.

41. احسب قيمة pH في المحاليل الآتية:

1.0 M KOH . c

1.0 M HI . a

$2.4 \times 10^{-5}$  M  $\text{Mg(OH)}_2$  . d

0.050 M  $\text{HNO}_3$  . b

42. تفسير الرسوم ارجع إلى **الشكل 13-2** للإجابة عن السؤالين الآتيين: ماذا يحدث لكل من  $[\text{H}^+]$  و  $[\text{OH}^-]$  و  $\text{pH}$  و  $\text{pOH}$  عندما يصبح محلول المتعادل أكثر حموضة؟ وماذا يحدث عندما يصبح محلول المتعادل أكثر قاعدية؟

## الاجابة في الصفحة التالية



34. **الفكرة الرئيسة** اشرح لماذا تكون قيمة  $\text{pH}$  للمحلول الحمضي دائمًا أصغر من قيمة  $\text{pOH}$  للمحلول نفسه؟

إن مجموع  $\text{pH}$  و  $\text{pOH}$  يساوي 14.00، يكون محلول حمضيًا، إذا كانت قيمة  $\text{pH}$  له أقل من 7.00، وبالتالي ستكون قيمة  $\text{pOH}$  أكبر من 7.00.

35. صف كيف يمكنك تحديد قيمة  $\text{pH}$  لمحلول ما إذا علمت قيمة  $\text{pOH}$  للمحلول نفسه؟

اطرح قيمة  $\text{pOH}$  من 14.00.

36. اشرح معنى  $K_w$  في المحاليل المائية.

عند درجة حرارة 298 K، يكون حاصل ضرب تركيز أيون  $\text{H}^+$  في تركيز أيون  $\text{OH}^-$  يساوي  $1.0 \times 10^{-14}$ . وإذا عُرف تركيز أحد الأيونات، يمكن حساب تركيز الآخر باستعمال تعبير  $K_w$ .

37. اشرح -مستعملاً مبدأ لوتشاتليه - ما يحدث لـ  $[\text{H}^+]$  في محلول حمض الإيثانويك الذي تركيزه 0.10M عند إضافة قطرة من محلول  $\text{NaOH}$ .

**الزيادة في أيونات  $\text{OH}^-$  من قطرة واحدة من  $\text{NaOH}$**  تدفع التأين الذاتي للماء نحو اليسار، وتزيد كمية جزيئات الماء غير المفككة. فيزداد  $[\text{OH}^-]$ ، أمّا  $[\text{H}^+]$  فينقص.

38. اكتب قائمة بالمعلومات اللازمة لحساب قيمة  $K_a$  لحمض ضعيف.

**$\text{pH}$  أو  $\text{pOH}$  أو تركيز  $\text{H}^+$ ، والتركيز الأولى للحمض اللازم لحساب  $K_a$** ، كما يمكن استعمال  $K_b$ .

## التقويم 2-3

39. احسب إذا علمت أن قيمة pH لحبة طعام تساوي 4.50 تقريرًا، فما  $[H^+]$  و  $[OH^-]$  فيها؟

$$[H^+] = \text{antilog}(-4.50) = 3.2 \times 10^{-5} M$$

$$pOH = 14.00 - 4.50 = 9.50$$

$$[OH^-] = \text{antilog}(-9.50) = 3.2 \times 10^{-10} M$$

40. حدد قيمة pH لمحلول يحتوي على  $1.0 \times 10^{-9}$  mol من أيونات  $OH^-$  لكل L.

$$[OH^-] = \frac{1.0 \times 10^{-9} \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 1.0 \times 10^{-9} M$$

$$pOH = -\log 1.0 \times 10^{-9} = 9.00$$

$$pH = 14.00 - pOH$$

$$pH = 14.00 - 9.00 = 5.00$$

41. احسب قيمة pH في الحاليل الآتية:

1.0 M HI .a

$$[H^+] = 1.0 M$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log 1.0$$

$$pH = 0.00$$

.b محلول  $HNO_3$  الذي تركيزه 0.050 M

$$[H^+] = 0.050 M$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log 0.050$$

$$pH = 1.30$$



c. محلول KOH الذي تركيزه  $1.0\text{ M}$

$$[\text{OH}^-] = 1.0\text{ M}$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log 1.0$$

$$\text{pOH} = 0.00$$

$$\text{pH} = 14.00 - 0.00 = 14.00$$

d. محلول  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  الذي تركيزه  $2.4 \times 10^{-5}\text{ M}$

$$[\text{OH}^-] = 2 \times [\text{Mg}(\text{OH})_2] = (2)(2.4 \times 10^{-5}\text{ M})$$

$$= 4.8 \times 10^{-5}\text{ M}$$

$$\text{pOH} = -\log 4.8 \times 10^{-5} = 4.32$$

$$\text{pH} = 14.00 - 4.32 = 9.68$$

42. تفسير الرسوم ارجع إلى الشكل 13-2 للإجابة عن السؤالين الآتيين: ماذا يحدث لكل من  $[\text{H}^+]$  و  $[\text{OH}^-]$  و pH و pOH عندما يصبح محلول المتعادل أكثر حموضية؟ وماذا يحدث عندما يصبح محلول المتعادل أكثر قاعدية؟

عندما يصبح محلول أكثر حموضية؛ يزداد  $[\text{H}^+]$  من  $10^{-7}$  إلى 1 وينقص  $[\text{OH}^-]$  من  $10^{-7}$  إلى  $10^{-14}$ . ويتغير pH من 7 إلى 14. وعندما يتحول محلول متعادل إلى محلول أكثر قاعدية، فهذا يعني نقصان  $[\text{H}^+]$  من  $10^{-7}$  إلى 1، وتغيراً في pH من 7 إلى 14، وتغييراً في pOH من 7 إلى صفر.

2-4

## Neutralization

التعادل

الأهداف

- الفكرة الرئيسية** يتفاعل الحمض مع القاعدة في تفاعل التعادل لينتجا ملحًا وماء.

الربط مع الحياة عندما يقدم فريقان متناظران حججًا مقنعة تجد نفسك متثيرًا بين الرأيين، لذا يكون رأيك محاييًّا أو متعادلاً؛ إذ تساوى وجهتا النظر عندك. وبطريقة مماثلة يكون محلول متعادلاً عندما تتساوى أعداد أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد في محلول.


## التفاعلات بين الأحماض والقواعد

### Reactions Between Acids and Bases


هل أحسست يوماً بسوء هضم أو حرقة في فم المعدة؟ هل تناولت أحد مضادات الحموضة كالتي تظهر في الشكل 19-2 لتخفف من حالة عدم الارتياح تلك؟ ما نوع التفاعل الذي يحدث عندما يلامس هيدروكسيد الماغنيسيوم  $Mg(OH)_2$  وهو المركب النشط في حليب الماغنيسيا - محلول حمض الهيدروكلوريك (HCl) الذي تنتجه المعدة؟

عندما يتفاعل  $\text{HCl}$  مع حمض  $\text{Mg(OH)}_2$  يحدث تفاعل تعاوٍل. وتفاعل التعاوٍل تفاعل محلول حمض مع محلول قاعدة ينتج ملحًا وماءً. والملح مركب أيوني يتكون من أيون موجب من قاعدة وأيون سالب من حمض، لذا يكون تفاعلاً تعاوٍل إحلالاً مزدوجاً.

**كتابة معادلات التفاعل** في التفاعل بين هيدروكسيد الماغنيسيوم وحمض الهيدروكلوريك يحل الماغنيسيوم محل الهيدروجين في  $\text{HCl}$ , ويحل الهيدروجين محل الماغنيسيوم في  $\text{Mg(OH)}_2$ .



لاحظ أن الأيون الموجب من القاعدة يتحد بالأيون السالب من الحمض  $\text{Cl}^-$  في الملح  $\text{MgCl}_2$ . وعند كتابة معادلات التعادل عليك أن تعرف ما إذا كانت جميع المواد المتفاعلة والنواتج في محلول تكون في صورة جزيئات أو وحدات صيغ. تفحص مثلاً معادلة الصيغة والمعادلة الأيونية الكاملة للتفاعل بين حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم الآتية:



**الشكل 2-19** يمكن لأي جرعة من هذه المواد المضادة للحموضة أن تخفف من أعراض سوء الهضم الحمضي؛ وذلك بتفاعلها مع محلول الحمضي في المعدة. معادلته.

- ٤ تكتب معادلات كيميائية لتفاعلات التفاعل.
  - ٥ تشرح كيفية استعمال تفاعلات التفاعل في معايرة الأحاضر والقواعد.
  - ٦ تقارن بين خواص المحاليل المنظمة والمحاليل غير المنظمة

### مراجعة المفردات

**الحسابات الكيميائية :** دراسة العلاقات الكمية بين كميات الموات المتفاعلة المستهلكة والنواتج المتكونة في التفاعل الكيميائي ؛ بالاعتماد على قانون حفظ الكتلة.

المفردات الجديدة

تفاعل التعادل

الملحق

المعايير

المحلول القياسي

نقطة التكافؤ


كاشف الحمض والقاعدة

نقطة النهاية


تميّه الأملاح

المحلول المنظم


سعة المحلول المنظم



لأن  $\text{HCl}$  حمض قوي، و  $\text{NaOH}$  قاعدة قوية، و  $\text{NaCl}$  ملح قابل للذوبان، لذا تكون المركبات الثلاثة في صورة أيونات في محلول المائي.






تظهر أيونات الصوديوم وأيونات الكلوريد على جنبي المعادلة، لذا تسمى أيونات متفرجة؛ أي لا تدخل في التفاعل، ويمكن حذفها للحصول على المعادلة الأيونية النهائية لمعادلة حمض قوي مع قاعدة قوية.




لاحظ تفاعل التعادل في **الشكل 2-20**.


**ماذا قرأت؟** اكتب المعادلة الأيونية الكاملة، والمعادلة الأيونية النهائية لتعادل حمض  $\text{HNO}_3$  مع القاعدة  $\text{KOH}$ .



**احذف الأيونات المشتركة**




**معايير الأحماض والقواعد** تتشابه الحسابات الكيميائية لحساب الكميات في تفاعل التعادل بين حمض وقاعدة مع أي تفاعل آخر يحدث في محلول. ففي تفاعل مضاد الحموضة الآتي، نجد أن  $1\text{mol}$  من  $\text{Mg(OH)}_2$  يعادل  $2\text{mol}$  من  $\text{HCl}$



وتبين الحسابات الكيميائية أساس طريقة المعايرة، والتي تستعمل لتحديد تراكيز المحاليل الحمضية والقواعدية. **المعايير** طريقة لتحديد تركيز محلول ما؛ وذلك بتفاعل حجم معلوم منه مع محلول تركيزه معلوم. فإذا أردت إيجاد تركيز محلول حمضي فسوف تعايره مع محلول قاعدي تركيزه معلوم. كما يمكنك معايرة قاعدة تركيزها غير معلوم مع حمض تركيزه معلوم. كيف تتم معايرة حمض وقاعدة؟ يبين **الشكل 2-21** نوعاً من المعدات المستخدمة في عملية المعايرة. ويستعمل في هذه الطريقة مقياس pH لمراقبة التغير في قيمة pH في أثناء عملية المعايرة.

**الشكل 2-21** عند معايرة حمض مع قاعدة يستعمل مقياس pH لقياس pH للمحلول الحمضي في الكأس، في حين تم إضافة محلول قاعدي معروف التركيز بالسحاحة.





**الشكل 22-22** يدل الارتفاع الحاد في قيمة pH للمحلول الحمضي عند معايرة حمض قوي بقاعدة قوية. كما هو مبين في الشكل a. على أن جميع أيونات  $H^+$  في الحمض قد تمت معادلتها بواسطة أيونات  $OH^-$  من القاعدة. وتسمى النقطة التي ينشئها المنحنى عند تقاطعه مع الخط المنقط، نقطة التكافؤ للمعايرة. فيغير الكاشف بروميثيمول الأزرق لونه عند هذه النقطة. أما في الشكل b فتتم معايرة حمض ضعيف  $HCOOH$  بقاعدة قوية  $NaOH$  ولا تظهر نقطة التكافؤ عند  $pH = 7$ . فيغير الكاشف فينوفثاليين لونه عند نقطة التكافؤ الموضحة في الشكل.

قارن بين نقطتي التكافؤ في الرسمين.  
**تكون نقطة التكافؤ في الشكل a هي 7؛ أما في الشكل b ف تكون نقطة التكافؤ هي 8.2**

1. يوضع حجم معين من محلول الحمضي أو القاعدي غير المعروف التركيز في كأس زجاجية، ثم تغمس أقطاب مقياس pH في هذا محلول، وتقرأ قيمتها الابتدائية للمحلول وتسجل.
2. تُملأ السحاحة بمحلول المعايرة المعلوم تركيزه. يسمى هذا محلول المحلول القياسي.
3. تضاف قطرتين من كاشف مناسب ثم تضاف أحجام معلومة من محلول القياسي ببطء إلى محلول الموجود في الكأس وتحلط معه. ثم تقرأ قيمة pH وتسجل بعد كل إضافة. تستمر هذه العملية إلى أن يصل التفاعل إلى نقطة التكافؤ. وهي نقطة يتساوى عندها عدد مولات  $H^+$  من الحمض مع عدد مولات  $OH^-$  من القاعدة.

يبين الشكل 22a كيف تتغير قيمة pH للمحلول في أثناء معايرة 50.0 mL HCl الذي تركيزه 0.100 M، وهو حمض قوي، مع القاعدة القوية  $NaOH$  ذات التركيز M 0.100 M؛ حيث كانت قيمة pH الأولية لـ HCl تساوي 1.00. وفي أثناء إضافة  $NaOH$  يتعادل الحمض، وتزداد قيمة pH للمحلول تدريجياً. إلا أنه عندما تستهلك أيونات  $H^+$  جميعها تزداد قيمة pH على نحو كبير عند إضافة حجم صغير جداً من  $NaOH$ . وتحدث هذه الزيادة الحادة في قيمة pH عند نقطة تكافؤ المعايرة. إن إضافة المزيد من  $NaOH$  بعد نقطة التكافؤ ينجم عنه زيادة تدريجية مرة أخرى في pH.

لعلك تعتقد أنه يجب أن تكون نقطة التكافؤ في عمليات المعايرة جميعها عندما تكون قيمة pH تساوي 7؛ لأنها عند هذه النقطة تتساوى تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد، فيصبح محلول متعادلاً. ولكن هذا غير صحيح، فبعض المعايرات لها نقاط تكافؤ عند قيم pH أقل من 7، وبعضها له نقاط تكافؤ أكبر من 7. وتحدث هذه الاختلافات لأن هناك تفاعلات بين الأملاح التي تكونت والماء، كما ستعلم ذلك لاحقاً.

يبين الشكل 22b أن نقطة التكافؤ في معايرة حمض الميثانويك - وهو حمض ضعيف - بهيدروكسيد الصوديوم - وهي قاعدة قوية - تقع بين 8 و 9.

**اختبار الرسم البياني** حدد اختلافين بين الرسمين البيانيين في الشكل 22-2.


**نقطتا التكافؤ مختلفتان في الرسم البياني لمعايرة الحمض القوي بقاعدة قوية، تكون قيمة pH للحمض القوي عند البداية هي 1.00، في حين تكون قيمة pH للحمض الضعيف هي 3.6 والجزء العمودي لمنحنى الحمض القوي مع القاعدة القوية أطول من الجزء العمودي لمعايرة الحمض الضعيف**



**الشكل 2-23** يصبح لون الشاي الأحمر فاتحاً عند إضافة عصير الليمون إليه؛ لأنَّه يحتوي على مادة كيميائية تدعى الكواشف، ومعظم الكواشف جزيئات كبيرة تعمل بوصفها أحماضًا ضعيفة. ويعود السبب في تغيير لون الكواشف إلى اختلافات يسيرة في أنماط الروابط عندما يتآين جزء الكاشف أو لا يتآين.

**كاشف الأحماض والقواعد** غالباً ما يستعمل الكيميائيون أصباغاً كيميائية بدلاً من مقاييس pH لتحري نقطة التكافؤ عند معايرة حمض وقاعدة. وتسمى الأصباغ الكيميائية التي تتأثر لوانها بال محليل الحمضية والقواعدية **كاشف الأحماض والقواعد**. وهناك العديد من المواد الطبيعية التي تعمل عمل الكواشف، فإذا أضفت عصير الليمون إلى الشاي فسوف تلاحظ أن اللون الأحمر للشاي أصبح فاتحاً، كما في **الشكل 2-23**؛ إذ يحتوي الشاي على مواد تسمى بوليفينولات polyphenols، تحتوي على ذرات متأينة جزئياً من الهيدروجين، لذا فهي أحماض ضعيفة. وعند إضافة الحمض الموجود في عصير الليمون إلى كوب شاي يقل تأين الحمض في الشاي بحسب مبدأ لوتشاتلييه، فيصبح لون البوليفينولات غير المتأينة أكثر وضوحاً، ويظهر **الشكل 2-24** العديد من الكواشف التي يستعملها الكيميائيون. إن أزرق بروموميثيمول كاشف مناسب عند معايرة حمض قوي بقاعدة قوية. أما الفينولفاتلين فيغير لونه عند نقطة التكافؤ عند معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية، كما هو مبين في **الشكل 2-22 b**.

**الشكل 2-24** إن عملية اختيار الكاشف الصحيح مهمة جداً؛ إذ يجب أن يغير الكاشف لونه عند نقطة التكافؤ التي لا تكون دائماً عند  $pH = 7$ .





تكون نقطة نهاية المعايرة عندما يصبح اللون وردياً فاتحاً. تبين القراءة الدقيقة للسحاحة أن  $18.28 \text{ mL NaOH}$  المتركيز  $0.1000 \text{ M}$  قد تمت إضافته.



يضاف محلول القياسي ببطء إلى محلول الحمض. ويتحول الفينولفثالين إلى اللون الوردي، ولكن يختفي اللون عند تحريك محلول إلى أن يصل إلى نقطة النهاية.



تحتوي السحاحة على محلول القياسي  $0.1 \text{ M NaOH}$  ويحتوي الدورق المخروطي على  $25.00 \text{ mL}$  من محلول  $\text{HCOOH}$  مع قطرات من كاشف الفينولفثالين.


**الشكل 2-25** المعايرة طريقة دقيقة تحتاج إلى تدريب وممارسة. تعمل الورقة البيضاء الموضوعة تحت الدورق على توفير خلفية مناسبة تساعد على رؤية التغير في لون الكاشف.

**الكاشف نقطة نهاية المعايرة** يعد الكثير من الكواشف المستعملة في المعايرة أحاجضاً ضعيفة، لكل منها قيمة  $\text{pH}$  خاصة به، أو مدى  $\text{pH}$  يتغير لونه بعده. وتسمى النقطة التي يتغير لون الكاشف عندها **نقطة نهاية المعايرة**. أما نقطة التكافؤ فهي النقطة التي يتساوى عندها عدد مولات الحمض مع عدد مولات القاعدة، وتسمى نقطة التكافؤ بنقطة التعادل في حالة تفاعل الأحماض والقواعد القوية. لذا من المهم اختيار كاشف للمعايرة يغير لونه عند نقطة تكافؤ المعايرة الصحيحة. تذكر أن دور الكاشف أن يبين لك بدقة - عن طريق تغيير لونه - أنه قد تمت إضافة كمية كافية من محلول القياسي لتعادل محلول المجهول. يصف **الشكل 2-25** طريقة معايرة محلول مجهول التركيز من حمض الميثانويك  $\text{HCOOH}$  مع محلول  $\text{NaOH}$  تركيزه  $0.1000 \text{ M}$ .

## استراتيجية حل المسائل

### حساب المolarية

تعد المعادلة الموزونة لتفاعلات المعايرة المفتاح الرئيس لحساب المolarية المجهولة. فمثلاً تتم معايرة حمض الكبريتيك ببیدروکسید الصوديوم وفق المعادلة الآتية:



1. احسب عدد مولات  $\text{NaOH}$  في محلول المعياري من بيانات المعايرة:  
 $M_B$  : مolarية القاعدة؛  $V_B$  : حجم القاعدة.

$$M_B V_B = (\text{mol/L})(\text{L}) = \text{mol NaOH}$$

2. تستطيع أن تعرف من المعادلة أن نسبة مولات  $\text{H}_2\text{SO}_4$  إلى  $\text{NaOH}$  هي  $1:2$ ، أي أنه يتطلب  $2 \text{ mol NaOH}$  لتعادل  $1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$

$$\text{mol H}_2\text{SO}_4 = \text{mol NaOH} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4}{2 \text{ mol NaOH}}$$

3. تمثل  $M_A$  مolarية الحمض، بينما تمثل  $V_A$  حجم الحمض  $L$ .

$$M_A = \frac{\text{mol H}_2\text{SO}_4}{V_A}$$

طبق هذه الاستراتيجية عند دراستك للمثال 6-2 في الصفحة الآتية.

حساب المolarية من بيانات المعايرة تحتاج إلى محلول قياسي حجمه 18.28 mL، وتركيزه 0.1000 M للتعادل مع 25.00 mL من محلول حمض الميثانويك HCOOH. احسب مolarية محلول حمض الميثانويك.

### ١ تحليل المسألة

لديك مolarية محلول NaOH وحجمه، ولديك كذلك حجم محلول حمض الميثانويك HCOOH. حجم القاعدة المستعملة يساوي أربعة أخماس حجم الحمض تقريباً. إذن تكون مolarية الحمض أقل من 0.1 M.

**المطلوب**

$$M_A = ? \text{ mol/L}$$

$$M_B = 0.1000 \text{ M}$$

$$V_A = 25.00 \text{ mL HCOOH}$$

$$V_B = 18.28 \text{ mL NaOH}$$

**المعطيات**

### ٢ حساب المطلوب

اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة لتفاعل التعادل.  
 $\text{HCOOH}_{(aq)} + \text{NaOH}_{(aq)} \rightarrow \text{HCOONa}_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$   
 1 mol HCOOH 1 mol NaOH

$$V_B = 18.28 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0.01828 \text{ L}$$

حول حجم القاعدة من mL إلى L.

حساب عدد مولات NaOH.

$$\text{Mol NaOH} = M_B V_B$$

طبق العلاقة بين مولات القاعدة، ومolarية القاعدة، وحجم القاعدة.

$$\begin{aligned} \text{Mol NaOH} &= (0.1000 \text{ mol/L})(0.01828 \text{ L}) \\ &= 1.828 \times 10^{-3} \text{ mol NaOH} \end{aligned}$$

$$\text{عوض } V_B = 0.01828 \text{ L} \text{ و } M_B = 0.1000 \text{ M}$$

حساب مولات HCOOH.

$$\begin{aligned} 1.828 \times 10^{-3} \text{ mol NaOH} &\times \frac{1 \text{ mol HCOOH}}{1 \text{ mol NaOH}} \\ &= 1.828 \times 10^{-3} \text{ mol HCOOH} \end{aligned}$$

طبق العلاقة بين HCOOH و NaOH.

حساب مolarية HCOOH.

$$1.828 \times 10^{-3} \text{ mol HCOOH} = M_A V_A$$

استعمل العلاقة بين مولات الحمض، ومolarية الحمض،

$$M_A = \frac{1.828 \times 10^{-3} \text{ mol HCOOH}}{V_A}$$

وحجم الحمض.

أوجد قيمة  $M_A$ .

$$V_A = 25.00 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0.02500 \text{ L HCOOH}$$

حول حجم الحمض من mL إلى L.

$$M_A = \frac{1.828 \times 10^{-3} \text{ mol HCOOH}}{0.02500 \text{ L HCOOH}} = 7.312 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

عوض  $V_A = 0.02500 \text{ L}$ .

### ٣ تقويم الإجابة

تفق الإجابة مع توقع أن تكون مolarية HCOOH أقل من 0.1 M، كما أن الوحدة مناسبة.

#### مسائل تدريبية

43. ما مolarية محلول حمض النيتريك إذا لزم 43.33 mL KOH تركيزه 0.1000 M لمعادلة 20.00 mL من محلول حمض النيتريك؟

44. ما تركيز محلول الأمونيا المستعمل في مواد التنظيف المنزلي إذا لزم 49.90 mL HCl تركيزه 0.5900 M لمعادلة 25.00 mL من هذا محلول؟

45. تحفيز كم mL من NaOH الذي تركيزه 0.500 M يمكن أن يتعادل مع 25.00 mL من  $\text{H}_3\text{PO}_4$  تركيزه 0.100 M

**الإجابة في الصفحة التالية**

43. ما مolarية محلول حمض النيتريك إذا لزم 43.33 mL KOH ملائدة 0.1000 M من محلول حمض النيتريك؟

**اكتب معادلة التفاعل، واحسب عدد مولات KOH:**



$$43.33 \cancel{\text{mL KOH}} \times \frac{1 \cancel{\text{L}}}{1000 \cancel{\text{mL}}} \times \frac{0.1000 \text{ mol KOH}}{1 \cancel{\text{L KOH}}} \\ = 4.333 \times 10^{-3} \text{ mol KOH}$$

احسب عدد مولات  $\text{HNO}_3$ . ثم احسب مolarيتها:

$$4.333 \times 10^{-3} \cancel{\text{mol KOH}} \times \frac{1 \text{ mol HNO}_3}{1 \cancel{\text{mol KOH}}} \\ = 4.333 \times 10^{-3} \text{ mol HNO}_3$$

$$M_{\text{HNO}_3} = \frac{4.333 \times 10^{-3} \text{ mol HNO}_3}{0.02000 \text{ L HNO}_3} = 0.2167 \text{ M}$$

44. ما تركيز محلول الأمونيا المستعمل في مواد التنظيف المنزلي إذا لزم 49.90 mL HCl ملائدة 0.5900 M من هذا محلول 25.00 mL

**اكتب معادلة التفاعل، واحسب عدد مولات HCl:**



$$49.90 \cancel{\text{mL HCl}} \times \frac{1 \cancel{\text{L}}}{1000 \cancel{\text{mL}}} \times \frac{0.5900 \text{ mol HCl}}{1 \cancel{\text{L HCl}}} \\ = 2.944 \times 10^{-2} \text{ mol HCl}$$


احسب عدد مولات  $\text{NH}_3$ . ثم احسب مolarيتها:

$$2.944 \times 10^{-2} \cancel{\text{mol HCl}} \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{1 \cancel{\text{mol HCl}}} \\ = 2.944 \times 10^{-2} \text{ mol NH}_3$$

$$M_{\text{NH}_3} = \frac{2.944 \times 10^{-2} \text{ mol NH}_3}{0.02500 \text{ L NH}_3} = 1.178 \text{ M}$$

؟ 45. تحفيز كم mL من NaOH الذي تركيزه 0.500 M يمكّن أن يتعادل مع 25.00 mL من  $H_3PO_4$  تركيزه 0.100 M

اكتب معادلة التفاعل، واحسب عدد مولات أيونات  $H^+$ :



$$\begin{aligned} mol\ H^+ &= \frac{0.100\ mol\ H_3PO_4}{1\ L} \times \frac{3\ mol\ H^+}{1\ mol\ H_3PO_4} \\ &\quad \times 25.00\ mL \times \frac{1\ L}{1000\ mL} \\ &= 0.00750\ mol \end{aligned}$$

عند نقطة التعادل يكون:

$$mol\ H^+ = mol\ OH^- = 0.00750\ mol$$

من المolarية، احسب حجم NaOH اللازم:


$$Molar\ concentration\ M = \frac{(mol)\ OH^-}{Volume\ (L)}$$

$$0.500\ M = \frac{0.00750\ mol}{(L)NaOH}$$

$$(L_{NaOH})(M_{NaOH}) = 0.00750\ mol$$

$$(L_{NaOH}) = \frac{(0.00750\ mol)}{(0.500\ mol/L)} = 0.0150\ L$$

$$0.0150\ L \times \frac{1000\ mL}{1\ L} = 15.0\ ml\ NaOH$$




الشكل 2-26 يعطي كاشف البروموثيرمول الأزرق نتائج مدهشة عند إضافته إلى ثلاثة محليل من الأملاح الأيونية. فمحلول  $\text{NH}_4\text{Cl}$  حمضي، ومحلول  $\text{NaNO}_3$  متعادل، بينما محلول  $\text{KF}$  قاعدي. ويعزى التفسير إلى قوى الأحماض والقواعد التي تكونت منها هذه الأملاح.


## تميّه الأملاح Salt Hydrolysis

أضيفت بضع قطرات من محلول كاشف البروموثيرمول الأزرق - انظر الشكل 2-26 إلى محليل مائية من أملاح كلوريد الأمونيوم  $\text{NH}_4\text{Cl}$  ونترات الصوديوم  $\text{NaNO}_3$  وفلوريد البوتاسيوم  $\text{KF}$  تركيزها  $0.10\text{M}$ . وكما تلاحظ فقد غير محلول نترات الصوديوم لون الكاشف إلى اللون الأخضر، وهذا يعني أن محلول متعادل. ويشير اللون الأزرق في محلول  $\text{KF}$  إلى أن محلول قاعدي، بينما يدل اللون الأصفر لمحلول كلوريد الأمونيوم على أن محلول حمضي. لماذا تكون بعض محليل الأملاح متعادلة، وبعضها قاعدي وبعضها الآخر حمضي؟ يتفاعل الكثير من الأملاح مع الماء في عملية تعرف باسم **تميّه الأملاح**؛ حيث تستقبل الأيونات السالبة من الملح المتأين - في أثناء هذه العملية - أيونات الهيدروجين من الماء، أو تمنح الأيونات الموجبة من الملح المتفكك أيونات الهيدروجين للماء.

**الأملاح التي تنتج محليل قاعدية** ينتج محلل فلوريد البوتاسيوم عن قاعدة قوية  $\text{KOH}$  وحمض ضعيف  $\text{HF}$ ، ثم يتحلل هذا الملح إلى أيونات بوتاسيوم وأيونات فلوريد.



لا تتفاعل أيونات  $\text{K}^{+}$  مع الماء، وذلك بسبب تعادلها مع أيونات  $\text{OH}^{-}$  وتكون محلول قاعدي من  $\text{KOH}$ . ويعد أيون  $\text{F}^{-}$  قاعدة ضعيفة بحسب برونستد - لوري. لذا توجد بعض أيونات الفلوريد في حالة اتزان مع الماء، كما في التفاعل الآتي:




وهذا يعني أن المواد الناتجة تتكون من جزيئات فلوريد الهيدروجين وأيونات  $\text{OH}^{-}$  مما يجعل محلول قاعدياً.

**الأملاح التي تنتج محليل حمضية** ينتج محلل  $\text{NH}_4\text{Cl}$  عن قاعدة ضعيفة  $\text{NH}_3$  وحمض قوي  $\text{HCl}$ ، وعند إذابته في الماء يتفكك الملح ليتتج أيونات الأمونيوم وأيونات الكلوريد، كما في التفاعل الآتي:



لا تتفاعل أيونات  $\text{Cl}^{-}$  مع الماء، وذلك بسبب تعادلها مع أيونات الهيدرونيوم وتكون محلول حمضي  $\text{HCl}$ . أما أيون  $\text{NH}_4^{+}$  فهو حمض ضعيف بحسب برونستد - لوري. لذا تتفاعل أيونات الأمونيوم مع جزيئات الماء المنتجة حالة الاتزان الآتية:



ونتيجة لذلك تنتج جزيئات أمونيا وأيونات هيدرونيوم، مما يجعل محلول حمضيًا.

**الأملاح التي تنتج محليل متعادلة** ينتج محلل نترات الصوديوم  $\text{NaNO}_3$  عن حمض قوي  $\text{HNO}_3$  وقاعدة قوية  $\text{NaOH}$ . لذلك قد يحدث تميّه بسيط جداً للملح، وقد لا يحدث تميّه أبداً؛ لأن  $\text{Na}^{+}$  و  $\text{NO}_3^{-}$  لا يتفاعلان مع الماء، لذا يكون محلول نترات الصوديوم متعادلاً.

واجبات

46. اكتب معادلات لتفاعلات تميّه الأملاح التي تحدث عند إذابة الأملاح الآتية في الماء، وصنف كلاً منها إلى حمضي، أو قاعدي، أو متعادل:

- a. نترات الأمونيوم      b. كبريتات البوتاسيوم      c. إيثانوات الروبيديوم      d. كربونات الكالسيوم
47. تحفيز اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث عند معايرة هيدروكسيد الأمونيوم  $\text{NH}_4\text{OH}$  مع بروميد الهيدروجين  $\text{HBr}$ . وهل تكون قيمة pH عند نقطة التكافؤ أكبر أو أقل من 7؟

## الاجابة في الصفحة التالية


### المحاليل المنظمة Buffered Solutions

من المهم جداً لقناديل البحر المبينة في الشكل 27-2 أن تبقى قيم pH لمياه أحواض الأحياء المائية ضمن مدى صغير. وكذلك الأمر لجسم الإنسان؛ فمن المهم أيضاً بقاء قيمة pH ثابتة؛ حيث يجب أن يبقى pH للدم في الجسم ضمن مدى 7.1 إلى 7.7. وفي العصارة المعدية يجب أن يبقى pH بين 1.6 و 1.8 ليساعد على هضم أنواع معينة من الطعام. ويحافظ الجسم على pH ضمن حدود معينة من خلال إنتاج محلائل منتظمة.

**ما المحلول المنظم؟** المحلول المنظم محليل تقاوم التغيرات في قيمة pH عند إضافة كميات محددة من الأحماض أو القواعد. فمثلاً عند إضافة 0.01 mol من HCl إلى 1L من الماء النقي ينخفض pH من 7.0 إلى 2.0. وكذلك فإن إضافة 0.01 mol من NaOH إلى 1L من الماء النقي ترفع قيمة pH من 7.0 إلى 12.0. ولكن عند إضافة الكمية نفسها من HCl أو NaOH إلى 1L من محلول منظم فقد يتغير pH بها لا يزيد على 0.1 وحدة.

**كيف تعمل محليلات المنظم؟** محلول المنظم خليط من حمض ضعيف مع قاعدته المرافقة، أو قاعدة ضعيفة مع حمضها المرافق؛ حيث يعمل خليط الجزيئات والأيونات في محلول المنظم على مقاومة تغيرات pH عن طريق التفاعل مع أي أيونات هيدروجين، أو أيونات هيدروكسيد تضاف إلى محلول المنظم.

افرض مثلاً أن محلولاً منظماً يحتوي على تراكيز 0.1 M من حمض الهيدروفلوريك HF وفلوريد الصوديوم NaF؛ حيث يعطي  $\text{NaF}$  أيونات  $\text{F}^-$  بتركيز 0.1 M والتي تعد القاعدة المرافقة لحمض HF، لذا يتحقق الاتزان الآتي:



إضافة حمض عند إضافة حمض إلى هذا محلول المنظم فإن الاتزان يندفع إلى اليسار بحسب مبدأ لوتشاتلييه؛ لأن أيونات  $\text{H}^+$  المضافة من الحمض تكون ضغطاً على الاتزان. وللتقليل من أثر هذا الضغط تتفاعل أيونات  $\text{H}^+$  مع  $\text{F}^-$  لتكوين المزيد من جزيئات HF.



وبهذا يصل النظام إلى حالة الاتزان من جديد مع وجود كمية أكبر من HF غير المتفكك. ومع ذلك فإن pH محلول قد تغير قليلاً فقط؛ لأن اتجاه الاتزان إلى اليسار استهلك معظم أيونات  $\text{H}^+$  التي أضيفت.



الشكل 2-27 لكي تكون البيئة صحية لقناديل البحر، يجب أن تبقى قيمة pH للماء في أحواض الأحياء المائية بين 8.1 و 8.4.

تجربة  
عملية  
تحديد النسبة المئوية لحمض الإيثانويك في الخل  
ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الأذرارنية

46. اكتب معادلات لتفاعلات تميّه الأملاح التي تحدث عند إذابة الأملاح الآتية في الماء، وصنف كلاً منها إلى حمضي، أو قاعدي، أو متعادل:

.a. نترات الأمونيوم



المحلول حمضي

.b. كبريتات البوتاسيوم



المحلول متعادل

.c. إيثانوات الروبيديوم





المحلول قاعدي

.d. كربونات الكالسيوم



المحلول قاعدي


47. تحفيز اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث عند معايرة هيدروكسيد الأمونيوم  $\text{NH}_4\text{OH}$  مع بروميد الهيدروجين  $\text{HBr}$ . وهل تكون قيمة  $\text{pH}$  عند نقطة التكافؤ أكبر أو أقل من 7؟



ست تكون أيونات الهيدرونيوم، لذا ستكون  $\text{pH}$  أقل من 7.




**إضافة قاعدة عند إضافة قاعدة إلى محلول المنظم المكون من حمض الهيدروفلوريك وأيونات الفلوريد تتفاعل أيونات  $\text{OH}^-$  المضافة مع أيونات  $\text{H}^+$  لتكون  $\text{H}_2\text{O}$ ، وهذا يقلل من تركيز أيونات  $\text{H}^+$ ، فيتجه الاتزان إلى اليمين للتعويض عن أيونات  $\text{H}^+$ .**



مع أن اتجاه التفاعل إلى اليمين يقلل كمية  $\text{HF}$ ، ويتيح المزيد من  $\text{F}^-$ ، إلا أن  $\text{pH}$  يبقى ثابتاً تقريباً؛ لأن تركيز أيون  $\text{H}^+$  لم يتغير كثيراً. إن قدرة محلول المنظم على مقاومة تغير  $\text{pH}$  يتم تجاوزها في حالة إضافة كمية كبيرة من الحمض أو القاعدة. تسمى كمية الحمض أو القاعدة التي يستطيع محلول المنظم أن يستوعبها دون تغيير مهم في  $\text{pH}$  سعة محلول المنظم. وكلما زادت تراكيز الجزيئات والأيونات المنظمة في محلول زادت سعة محلول المنظم.

**اختيار محلول المنظم** يكون محلول المنظم أكثر فاعلية عندما يساوي تركيز الحمض تركيز القاعدة المرافق له، أو تكاد تكون متساوية. تأمل النظام المنظم المكون من  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  و  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ . الناتج عن خلط كميتين مولاريتين متساويتين من  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  و  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ .



ما قيمة  $\text{pH}$  لهذا محلول؟

$$K_a = 6.2 \times 10^{-8} = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$

لأن محلول مكون من كميتين مولاريتين متساويتين من  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  و  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  فإن  $[\text{HPO}_4^{2-}]$  يساوي  $[\text{H}_2\text{PO}_4^-]$ .

لذا فإن التركيزين يختزلان في تعبير ثابت تأين الحمض.

$$6.2 \times 10^{-8} = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log (6.2 \times 10^{-8}) = 7.21$$

وهكذا، عندما توجد كميات مولارية متساوية في نظام  $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$  المنظم فإن النظام يستطيع أن يحافظ على  $\text{pH}$  قريباً من 7.21. لاحظ أن  $\text{pH} = -\log K_a$ . يحتوي الجدول 7-2 على قائمة من أنظمة منظمة عديدة مع  $\text{pH}$  عندما يكون كل منها أكثر فاعلية.

المحاليل المنظمة والأزواج المترافق

الجدول 7-2

قيمة pH	الأزواج المترافق من الأحماض والقواعد في المحاليل المنظمة	معادلات تأين المحاليل المنظمة
3.20	$\text{HF}/\text{F}^-$	$\text{HF}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{F}^-_{(\text{aq})}$
4.76	$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	$\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})}$
6.35	$\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$	$\text{H}_2\text{CO}_3_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{HCO}_3^-_{(\text{aq})}$
7.21	$\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$	$\text{H}_2\text{PO}_4^-_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{HPO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$
9.4	$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	$\text{NH}_3_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})}$
10.70	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+/\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})}$




**التحليل**  
سيتغير موضع اتزان  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$  بحسب مبدأ لوتشاتليه اعتماداً على معدل الأيض في الجسم وعوامل أخرى. وبإضافة إلى ذلك تستطيع الرئتان أن تغير سرعة طرد  $\text{CO}_2$  من الجسم عن طريق التنفس، وتستطيع الكليتان أن تغير سرعة إزالة أيونات  $\text{HCO}_3^-$ .

### التفكير الناقد

1. حدد كم يزيد  $[\text{H}^+]$  إذا تغير pH الدم من 7.4 إلى 7.1.
2. اقترح سبباً يفسّر لماذا تعدد نسبة 20:1 من  $\text{HCO}_3^-$  إلى  $\text{CO}_2$  في الدم مناسب؟
3. توقع ما الوضع الذي يرتفع فيه pH الدم أو ينخفض؟ وفي أي اتجاه يميل اتزان  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$  في كل من الحالات الآتية:

  - a. شخص لديه حالة فيروسية شديدة في المعدة يتقيأ عدة مرات في 24 ساعة.
  - b. شخص يأخذ كمية كبيرة من  $\text{NaHCO}_3$  لوقاية حرقة فم المعدة.

كيف يحافظ الدم على قيمة pH ثابتة؟ يحتوي دم الإنسان على ثلاثة أنواع من الخلايا. الخلايا الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم كافة، والخلايا البيضاء التي تحارب العدو، والصفائح الدموية التي تساعد على التجلط عند حدوث نزف. لذا تضعف الوظائف الحساسة لهذه الخلايا إذا لم يحافظ الدم على pH ضمن مدى ضيق بين 7.1 و 7.7. وفوق هذا المستوى تفقد البروتينات في الجسم تراكيبيها ومقدرتها على أداء عملها. ولحسن الحظ فإن هناك عدة محليلات منظمة تحافظ على التوازن الضروري للأحماض والقواعد. وأهم هذه المحاليل المنظمة محلول حمض الكربونيك والكربونات الهيدروجينية  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ .



عندما تدخل الأحماض والقواعد مجرى الدم نتيجة النشاط العادي، تعدل أنظمة المحاليل المنظمة في الدم نفسها، حتى تحافظ بفاعلية على قيمة pH مناسبة.

### التفكير الناقد

1. حدد كم يزيد  $[\text{H}^+]$  إذا تغير pH الدم من 7.4 إلى 7.1

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-7.4) = 4.0 \times 10^{-8} \text{ M}$$

$$\text{عند } \text{pH} = 7.1 :$$

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-7.1) = 7.9 \times 10^{-8} \text{ M}$$

$$\frac{7.9 \times 10^{-8}}{4.0 \times 10^{-8}} = 2$$

ستكون أكبر بمرتين.



2. اقترح سبباً يفسّر لماذا تعد نسبة 20:1 من  $\text{HCO}_3^-$  إلى

$\text{CO}_2$  في الدم مناسبة للحفاظ على pH مناسب؟

**يلقي الجسم السليم الحمض في الدم عند ازدياد نشاطه، وتقوم أيونات الكربونات الهيدروجينية بمعادلة الحمض، وتدفع التفاعل نحو إنتاج ثاني أكسيد الكربون.**

3. توقع ما الوضع الذي يرتفع فيه pH الدم أو ينخفض؟ وفي أي اتجاه يميل اتزان  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$  في كل من الحالات الآتية:

a. شخص لديه حالة فيروسية شديدة في المعدة يتقيأ عدة مرات في 24 ساعة.

**القيء حمضي وهو يرفع pH. التفاعل المنظم يتوجه نحو اليمين، و تستطيع الكلى أن ترد بإزالة أيون الكربونات الهيدروجينية، ويجب على الشخص أن يبقى هادئاً للاحتفاظ بثاني أكسيد الكربون.**

b. شخص يأخذ كمية كبيرة من  $\text{NaHCO}_3$  لوقاية حرقة في المعدة.

**تزيادة قيمة pH بزيادة مستويات أيون الكربونات الهيدروجيني؛ مما يدفع التفاعل المنظم إلى اليسار مكوناً مزيداً من  $\text{CO}_2$ . ترد الكلى بإزالة أيون الكربونات الهيدروجيني، ويستطيع الشخص أن يتنفس بسرعة أكثر لطرد  $\text{CO}_2$ .**





**48. الفكرة الرئيسة** فسر لماذا تكون المعادلة الأيونية النهائية لتفاعل تبادل أي حمض قوي مع أي قاعدة قوية دائمًا هي المعادلة نفسها؟


بعد حذف الأيونات المتفرّجة من معادلة التبادل، يعد كل تفاعل تبادل تفاعلاً **1 mol** من أيون الهيدروجين مع **1 mol** من الهيدروكسيد لتكوين **1 mol** من الماء.

**49.** اشرح الفرق بين نقطة تكافؤ ونقطة نهاية المعايرة.  
**نقطة التكافؤ هي** pH التي تتساوى عندها مولات أيونات H<sup>+</sup> من الحمض، مع مولات أيونات OH<sup>-</sup> من القاعدة. أما **نقطة النهاية** فهي النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف المستعمل في المعايرة.

**50.** قارن بين نتائج تجربتين: الأولى إضافة كمية صغيرة من قاعدة إلى محلول غير منظم له pH = 7. والثانية عند إضافة الكمية نفسها من القاعدة إلى محلول منظم له pH = 7.

**تزداد قيمة pH للمحلول غير المنظم أكثر من قيمة pH للمحلول المنظم.**

51. احسب مolarية محلول حمض الهيدروبروميك HBr إذا احتاج إلى 30.35 mL من NaOH تركيزه 0.1000 M لمعايرة 25.00 mL من الحمض حتى نقطة التكافؤ.



يتفاعل كل 1 mol من HBr مع 1 mol من NaOH، احسب عدد مولات NaOH، وعدد مولات HBr.

$$\begin{aligned}\text{mol NaOH} &= M_B \times V_B \\ &= 0.1000 \text{ mol/L} \times 0.03035 \text{ L} \\ &= 0.003035 \text{ mol}\end{aligned}$$

$\text{mol NaOH} = \text{mol of HBr} = 0.003035 \text{ mol}$   
احسب مolarية HBr.

$$\begin{aligned}M &= \frac{(\text{mol}) \text{ HBr}}{\text{حجم محلول (L)}} \\ &= \frac{0.003035 \text{ mol}}{0.02500 \text{ L}} = 0.1214 \text{ M}\end{aligned}$$

52. فسر ما المواد التي يمكن استعمالها لعمل محلول منظم قيمة pH له 9.4 وما نسبتها؟  
استعمل الجدول 7-2.

استخدم الأمونيا، وأحد أملاحها مثل نترات الأمونيوم، أو كلوريد الأمونيوم. واستخدم كميات مolarية متساوية من القاعدة وملحها.

## التقويم 2-4

53. صمم تجربة صف كيف تصمم معايرة وتجريها باستعمال  $\text{HNO}_3$  تركيزه M 0.250 لتحديد مolarية محلول هيدروكسيد السيلزيوم؟

ضع حجمًا معلومًا من محلول  $\text{CsOH}$  في دورق، وأضف كاشفًا، وأملأ سحاحة ب محلول  $\text{HNO}_3$  تركيزه M 0.250 وسجّل قراءة السحاحة الأولية. ثُمّ أضف محلول  $\text{HNO}_3$  ببطء إلى محلول  $\text{CsOH}$  حتى نقطة النهاية، وسجّل القراءة النهائية للسحاحة. ثُمّ احسب حجم  $\text{HNO}_3$  المضاف مستعملاً حجم ومolarية  $\text{HNO}_3$  المضاف، وحجم  $\text{CsOH}$ ؛ لحساب مolarية محلول  $\text{CsOH}$ .

# الكيمياء من واقع الحياة



الشكل 2 تحبس عملية الخبز الفقاعات المكونة في أثناء التفاعل بين حمض وقاعدة، فتنتج كعكة خفيفة مليئة بالهواء.

يجب أن تخلط صودا الخبز بمكونات أخرى صلبة، وتضاف في النهاية إلى مخلوط العجين حتى يكون انطلاق ثاني أكسيد الكربون متظاهراً في كل أنحاء العجين، ويحدث تفاعل الحمض والقاعدة هذا بسرعة. إذا كانت صودا الخبز هي عامل التخمير الوحيد في الوصفة، وجب خبز العجين بسرعة وفوراً قبل أن تختفي الفقاعات الاختفاء. وتؤدي عملية الخبز إلى تعدد الفقاعات، فتنتفخ الكعكة. وعندما يتصلب العجين تحتجز الفقاعات، كما في الشكل 2.

**مسحوق الخبز** Baking Powder إذا لم تتضمن الوصفة سائلاً حمضيّاً فإن مسحوق الخبز يستعمل عوضاً عن ذلك. ومعظم مسحوق الخبز خليط من صودا الخبز وحمضين جافين. وأحد هذين الحمضين يتفاعل مع الصودا عندما يذوب في العجين، ويتفاعل الثاني مع الصودا عند التسخين. ومثل صودا الخبز يخلط مسحوق الخبز بالمكونات الأخرى الجافة، ويضاف في النهاية إلى العجين. ولكن العجائن التي يستعمل فيها مسحوق الخبز ليس من الضروري أن تخبز فوراً.

تحتوي العجائن التي يستعمل فيها سوائل حمضية معتدلة على مسحوق الخبز وصودا الخبز معاً؛ حيث يستطيع الحمض الزائد أن يعطى عمل مسحوق الخبز. ويعد مسحوق الخبز مصدراً موثوقاً لثاني أكسيد الكربون، وتساعد صودا الخبز على معادلة الحمض.

## الكتابة في الكيمياء


حلل إذا طلبت وصفة استعمال الطحين والملح والسكر والنخالة والجليب والبيض والسمن أو الزيت النباتي، فهل تستعمل صودا الخبز أو مسحوق الخبز؟ فسر إجابتك.

يجب استعمال صودا الخبز في الوصفة، الجليب حمضي قليلاً، ولديه قيمة pH تساوي 6.5


## تفاعلات الأحماض والقواعد وعملية الخبز

هل رأيت تمثيلاً لثورة بركان باستعمال الخل وصودا الخبز؟ لقد نتجت فقاعات ثاني أكسيد الكربون  $\text{CO}_2$  عن تفاعل التحلل الذي حدث بسرعة بعد تفاعل الخل  $\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$ ، وهو حمض، وصودا الخبز  $\text{NaHCO}_3$ ، وهي قاعدة، كما هو مبين أدناه.

### تفاعل الحمض والقاعدة



### التفكك



إن إطلاق ثاني أكسيد الكربون نتيجة التفاعل الكيميائي بين الحمض والقاعدة - انظر الشكل 1 - هو من أسباب انتفاخ الخبز والمعجنات. وتسمى المادة التي تؤدي إلى انتفاخ العجين عند خبزه عامل التخمير. والمادتان الكيميائيتان الرئستان في التخمير هما صودا الخبز ومسحوق الخبز.

**صودا الخبز** Baking Soda كربونات الصوديوم الهيدروجينية، وتسمى أيضاً بيكروبونات الصوديوم، وهو الاسم الكيميائي لصودا الخبز؛ حيث تتفاعل صودا الخبز عند استعمالها في الطبخ مع سوائل معتدلة الحموضية، فت تكون فقاعات ثانية لثاني أكسيد الكربون. وتشمل السوائل المعتدلة الحموضية الخل والعسل ودبس السكر وعصير الحمضيات ومخضوض اللبن وغيرها.



الشكل 1 تتكون فقاعات من غاز ثاني أكسيد الكربون عندما تضاف قاعدة صودا الخبز إلى حمض الخل.

# مختبر الكيمياء

## معايير القاعدة

**الخلفية المعايرة إجراء يمكن به تحديد مولارية القاعدة.**

**سؤال** كيف يمكنك تحديد مولارية محلول قاعدي؟

### المواد والأدوات الالزمة

سحاحة سعتها 50 mL	هيدروكسيد الصوديوم NaOH
محلول فينولفثالين	ميزان حساس
قارورة غسل حامل حلقة	فثالات البوتاسيوم الهيدروجينية $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$
حامل سحاحة دورق مخروطي سعته 250 mL	كأس زجاجية سعتها 250 mL
ماء مقطر ملعقة	ماء مقطر ملعقة

### إجراءات السلامة

تحذير: ينتج عن إذابة NaOH في الماء حرارة، كما أن الفينولفثالين قابل للاشتعال، لذا أبعده عن اللهب.

### الخطوات

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية.
2. ضع 4 g NaOH تقريباً في الدورق المخروطي الذي سعته 500 mL. ثم أذبها في كمية كافية من الماء، ثم أكمل حجم محلول ليصبح 400 mL تقريباً. ثم أغلق الدورق بالسدادة.
3. استعمل زجاجة الوزن لأخذ كتلة مقدارها 0.40 g تقريباً من فثالات البوتاسيوم الهيدروجينية  $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ ، الذي كتلته المولية = 204.32 g/mol، وضعها في الدورق المخروطي الذي سعته 250 mL. ثم سجل هذه الكتلة.
4. استعمل قارورة الغسل لغسل الجزء الداخلي من الدورق، وأضف 50 mL تقريباً من الماء، وقطرتين من محلول كاشف الفينولفثالين.
5. املأ السحاحة بمحلول NaOH، على أن يكون مستوى السائل عند علامة الصفر أو تحتها. للتخلص من أي هواء قد يكون عالقاً في السحاحة مرر كمية صغيرة من القاعدة إلى وعاء المهملات. لاحظ حجم محلول في السحاحة حتى أقرب 0.02 mL ، وسجل هذه القراءة الأولية.
6. ضع قطعة ورق بيضاء على قاعدة حامل الحلقة. وحرك الدورق حرفة دورانية في أثناء صب محلول NaOH بيضاء من السحاحة إلى الدورق.

### بيانات المعايرة

المحاولة 1	
	كتلة زجاجة الوزن + الحمض
	كتلة زجاجة الوزن
	كتلة الحمض الصلب
	مولات الحمض
	مولات القاعدة المطلوبة
	القراءة النهائية للسحاحة
	القراءة الأولية للسحاحة
	حجم القاعدة المستعمل (mL)
	مولارية القاعدة

7. عندما يبقى اللون الوردي فترة أطول بعد التحريك الدوراني للدورق أضف محلول القاعدة قطرة قطرة.
8. تكون نقطة النهاية حيث يتغير لون الحمض إلى اللون الوردي بعد إضافة قطرة قاعدة واحدة؛ ويبقى اللون الوردي بعدها ثابتاً.
9. أعد ملء السحاحة، واغسل الدورق بالماء. ثم أعد المعايرة حتى تحصل على قيم مولارية متقاربة لثلاث محاولات.
10. **التنظيف والتخليص من النفايات** تخلص من المحاليل المتعادلة في المصرف مع كمية وافرة من الماء.

### التحليل والاستنتاج

1. فسر البيانات في كل معايرة، احسب عدد مولات الحمض المستعمل بقسمة كتلة العينة على الكتلة المولية للحمض.
2. استنتاج كم مولاً من القاعدة يتطلب التفاعل مع مولات الحمض المستخدمة؟
3. احسب حوال حجم القاعدة إلى لترات.
4. احسب مولارية القاعدة بقسمة عدد مولات القاعدة على حجم القاعدة باللتر.
5. **تحليل الخطأ** هل اتفقت حساباتك للمولارية؟ فسر أي اختلافات.

### الاستقصاء

صمم تجربة احسب تركيز محلول حمض الإيثانويك (الخل) دون استعمال الكاشف.

الإجابة في الصفحة التالية

1. فسر البيانات في كل معايرة، احسب عدد مولات الحمض المستعمل بقسمة كتلة العينة على الكتلة المولية للحمض.

**KHC<sub>8</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>** من 0.00191 mol

2. استنتج كم مولاً من القاعدة يتطلب التفاعل مع مولات الحمض المستخدمة؟

النسبة المولية 1:1، إذن عدد مولات NaOH و KHC<sub>8</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub> متساوية.

3. احسب حوال حجم القاعدة إلى لترات.

0.00764 L

4. احسب مolarية القاعدة بقسمة عدد مولات القاعدة على حجم القاعدة باللتر.

0.250 M

5. تحليل الخطأ هل اتفقت حساباتك للمolarية؟ فسر أي اختلافات.

قد تشمل الاختلافات قراءات غير دقيقة للسحاحة أو تحديد الكتل، أو الاستمرار في إضافة القاعدة بعد نقطة النهاية، أو انسكاب المحاليل، وجود فقاعات داخل السحاحة.

### الاستقصاء

صمم تجربة احسب تركيز محلول حمض الإيثانويك (الخل) دون استعمال الكاشف.

اسكب 25.00 mL من الخل في دورق، وعير الخل بمحلول NaOH (تركيزه معلوم)، مستعملاً مقاييس pH لمراقبة pH الخل. تصل إلى نقطة النهاية عندما ينتج تغير كبير في pH بإضافة نقطة واحدة من NaOH.

# دليل مراجعة الفصل

2

**(الفكرة العامة)** يمكن تعريف الأحماض والقواعد باستعمال مفردات، منها أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد، أو أزواج الإلكترونات.

## 1-2 مقدمة في الأحماض والقواعد

**الفكرة الرئيسية** تساعد النظريات المختلفة **الأفكار الرئيسية**

- تحديد تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد ما إذا كان محلول حمضيًا، أم قاعديًا، أم متعددًا.
- يجب أن يحتوي حمض أرهيبيوس على ذرة هيدروجين قابلة للتأين. ويجب أن تحتوي قاعدة أرهيبيوس على مجموعة هيدروكسيد قابلة للتأين.
- حمض برونستد - لوري مادة مانحة لأيون هيدروجين، بينما قاعدة برونستد - لوري مادة مستقبلة لأيون هيدروجين.
- حمض لويس مادة تستقبل زوجاً من الإلكترونات، بينما قاعدة لويس مادة تعطي زوجاً من الإلكترونات.

- على وصف سلوك الأحماض والقواعد.
- المفردات**
- محلول الحمضي
  - محلول القاعدي
  - نظرية أرهيبيوس
  - نظرية برونستد - لوري
  - الحمض المرافق
  - القاعدة المرافقية
  - الأزواج المرافقية
  - مواد متعددة (أمفوتيكية)
  - نظرية لويس

## 2-2 قوة الأحماض والقواعد

**الفكرة الرئيسية** تأين الأحماض **الأفكار الرئيسية**

- وقوى القواعد في المحاليل تأيناً كلياً، بينما تأين الأحماض والقواعد القوية كلياً في المحاليل المائية المخففة، بينما تأين الأحماض والقواعد الضعيفة جزئياً في المحاليل المائية المخففة.
- تأين الأحماض والقواعد القوية كلياً في المحاليل المائية المخففة، بينما تأين الأحماض والقواعد الضعيفة جزئياً في المحاليل المائية المخففة.
  - تعد قيمة ثابت تأين الحمض أو القاعدة الضعيفة قياساً لقوة الحمض أو القاعدة.

- المفردات**
- الحمض القوي
  - الحمض الضعيف
  - ثابت تأين الحمض
  - القاعدة القوية
  - القاعدة الضعيفة
  - ثابت تأين القاعدة

## دليل مراجعة الفصل

2

### 2-3 أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني

#### الأفكار الرئيسية

- ثابت تأين الماء  $K_w$  يساوي حاصل ضرب تركيز أيون  $H^+$  وتركيز أيون  $OH^-$ .

$$K_w = [OH^-] [H^+]$$

- $pH$  محلول هو سالب لогاريتم تركيز أيون الهيدروجين.  $pOH$  هو سالب لогاريتم تركيز أيون الهيدروكسيد.

ومجموع  $pH$  و  $pOH$  يساوي 14.

$$pH = -\log [H^+]$$

$$pOH = -\log [OH^-]$$

$$pH + pOH = 14.00$$

- قيمة  $pH$  للمحلول المتعادل تساوي 7.0، وقيمة  $pOH$  في محلول نفسه تساوي 7.0؛ لأن تركيز أيونات الهيدروجين يساوي تركيز أيونات الهيدروكسيد.

**الفكرة الرئيسية** يعبر كل من  $pH$  و  $pOH$  عن تركيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد في المحاليل المائية.

#### المفردات

• ثابت تأين الماء  $K_w$


• الرقم الهيدروجيني  $pH$

• الرقم الهيدروكسيلي  $pOH$

### 2-4 التعادل

#### الأفكار الرئيسية

- يتفاعل حمض مع قاعدة لتكوين ملح وماء في تفاعل التعادل.
- تمثل المعادلة الأيونية النهائية الآتية تعادل حمض قوي مع قاعدة قوية:



- المعايرة عملية يستعمل فيها تفاعل التعادل بين حمض وقاعدة لتحديد تركيز محلول.
- تحتوي المحاليل المنظمة على مخالفات من جزيئات وأيونات تقاوم التغيرات في  $pH$ .

**الفكرة الرئيسية** يتفاعل الحمض مع القاعدة في تفاعل التعادل وينتج ملح وماء.

#### المفردات

• تفاعل التعادل

• الملح

• المعايرة

• محلول القياسي

• نقطة التكافؤ

• كاشف أحماض وقواعد

• نقطة النهاية

• تغذية الأملاح

• محلول المنظم

• سعة محلول المنظم

## التقويم

2


2-1

### اتقان المفاهيم

54. قارن بين المحاليل الحمضية والمعادلة والقادعية من حيث تركيز الأيونات.

تركيز أيونات  $H^+$  في محلول الحمضي أكبر من تركيز أيونات  $OH^-$  فيه، في حين يكون تركيز أيونات  $OH^-$  في محلول القاعدي أعلى من تركيز أيونات  $H^+$ ، كما يتساوى تركيز أيونات  $H^+$  و  $OH^-$  في محلول المتعادل.

55. اكتب معادلة كيميائية موزونة تمثل التأين الذافي للماء.




56. صنف كلًّا مما يأتي إلى حمض أرهيبيوس أو قاعدة أرهيبيوس:

<b>قاعدة</b>	$Mg(OH)_2$	.c	<b>حمض</b>	$H_2S$	.a
<b>حمض</b>	$H_3PO_4$	.d	<b>قاعدة</b>	$RbOH$	.b

57. علم الأرض تتكون فقاعات غاز عندما يضيف عالم الأرض بعض قطرات من  $HCl$  إلى قطعة صخر. ماذا قد يستنتج العالم عن طبيعة الغاز والصخر؟

**الغاز هو  $CO_2$ ، والصخر هو كربونات الكالسيوم  $CaCO_3$ .**

58. اشرح ما تعنيه المساحتان المظللتان عن اليمين من الخط العمودي الغامق في الشكل 28-2.



الشكل 2-28

تعني المساحة الكبرى الزرقاء أن المحاليل القاعدية تحتوي على تركيز أعلى من أيونات الهيدروكسيد، في حين تعني المساحة الصغرى الحمراء أن المحاليل الحمضية تحتوي أيضاً على أيونات الهيدروجين، ولكن بتركيز أقل من أيونات الهيدروكسيد.

59. اشرح الفرق بين الحمض الأحادي البروتون، والحمض الثنائي البروتون، والحمض الثلاثي البروتون، وأعط مثلاً على كل منها.

يستطيع الحمض الأحادي البروتون إعطاء  $H^+$  واحد مثل  $HCl$ ؛ ويستطيع الحمض الثنائي البروتون إعطاء أيونين من  $H^+$  مثل  $H_2SO_4$ ؛ في حين يعطي الحمض الثلاثي البروتون ثلاثة أيونات  $H^+$  مثل  $H_3SO_4$ .

60. لماذا يمكن استعمال  $H^+$  و  $H_3O^+$  بالتبادل في المعادلات الكيميائية؟

**أيون  $H_3O^+$  هو أيون هيدروجين مُتميّز.**

61. استعمل الرموز (> أو < أو =) للتعبير عن العلاقة بين تركيز أيونات  $H^+$  وأيونات  $OH^-$  في المحاليل الحمضية والمعادلة والقادعية.

**حمضيّ:  $[H^+] > [OH^-]$**

**متعادل:  $[H^+] = [OH^-]$**

**قادعيّ:  $[H^+] < [OH^-]$**

2-1

62. اشرح كيف يختلف تعريف حمض لويس عن تعريف حمض برونستد - لوري؟

**يعرف نموذج لويس الحمض بوصفه مستقبلاً لزوج من الإلكترونات، في حين يعرفه نموذج برونستد - لوري على أنه مانح لـأيون هيدروجين.**

تقان حل المسائل

63. اكتب معادلة كيميائية موزونة لكل مما يأتي:


a. تحلل هيدروكسيد الماغنيسيوم الصلب عند وضعه في الماء.




b. تفاعل فلز الماغنيسيوم مع حمض الهيدروبروميك.



c. تأين حمض البروبانويك  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$  في الماء.



d. التأين الثاني لحمض الكبريتيك في الماء



2-2

تقان المفاهيم

64. اشرح الفرق بين حمض قوي وحمض ضعيف.

**في المحاليل المائية المخففة، يتآكل الحمض القوي كلّياً، في حين يتآكل الحمض الضعيف جزئياً.**

65. اشرح لماذا تستعمل أسهم الاتزان في معادلات تأين بعض الأحماض؟

**تُستعمل أسهم الاتزان في الأحماض الضعيفة، التي تتآكل جزئياً في الماء لتصل إلى حالة الاتزان. وتُستعمل أسهم التفاعل في الأحماض القوية، التي تتآكل كلّياً في المحاليل المائية المخففة.**



الشكل 2-29

66. أي الكأسين في الشكل 2-29 قد تحتوي على محلول حمض الهيبوكلوروز بتركيز  $0.1 \text{ M}$ ؟ وضح إجابتك.


**الكأس اليمنى؛ لأنَّ حمض الهيبوكلوروز ضعيف، ويتأكل جزئياً في محلول الماء، ومواصيته للكهرباء منخفضة.**

## التقويم

2




71. اكتب المعادلة الكيميائية وتعبير  $K_b$  لتأين الأنيلين في الماء.  
الأنيلين قاعدة ضعيفة صيغتها  $C_6H_5NH_2$ .



$$K_b = \frac{[C_2H_5NH_3^+][OH^-]}{[C_2H_5NH_2]}$$

72. تفاعل القاعدة الضعيفة  $ZaH_2$  ، مع الماء لتعطي محلولاً تركيز أيون  $OH^-$  فيه  $2.68 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ، والمعادلة الكيميائية للتفاعل هي:



إذا كان  $[ZaH_2]$  عند الاتزان  $0.0997 \text{ mol/L}$  ، فما قيمة  $K_b$  لـ  $ZaH_2$  ؟

$$K_b = \frac{[ZaH_3^+][OH^-]}{[ZaH_2]} = \frac{(2.68 \times 10^{-4})(2.68 \times 10^{-4})}{(0.0997 - 2.68 \times 10^{-4})} \\ = 7.22 \times 10^{-7}$$

73. اختر حمضاً قوياً، واشرح كيف تحضر محلولاً مخففاً منه؟ ثم اختر حمضاً ضعيفاً، واشرح كيف تحضر محلولاً مركزاً منه؟

**قد يقول الطالب إنَّ محلول المخفف لحمض قويٍ يُحضر بإذابة كميةٌ صغيرةٌ من الحمض القويٍ في كميةٌ كبيرةٌ من الماء، أما محلول المركز لحمض ضعيفٍ، فيُحضر بإذابة كميةٌ كبيرةٌ من الحمض الضعيفٍ في كميةٌ صغيرةٌ من الماء.**

67. كيف تقارن بين قويٍّ حمضيٌّ ضعيفٌ في المختبر؟ وكيف تقوم بذلك من خلال معلومات تحصل عليها من جدول أو كتيب؟  
**قارن بين قدرة توصيل محاليل متساوية المolarية من الحمضين، وقارن أيضاً بين ثابت تأينهما.**


68. حدد الأزواج المترافقه في تفاعل  $H_3PO_4$  مع الماء.



**الحمض هو  $H_3PO_4$ ، وقاعدته المترافقه هي  $H_2PO_4^-$ ؛ أما القاعدة فهي  $H_2O_{(l)}$ ، والحمض المترافق هو  $H_3O^{+}$ .**

### اتقان حل المسائل

69. منظفات الأمونيا اكتب المعادلة الكيميائية وتعبير  $K_b$  لتأين الأمونيا في الماء. وكيف يستعمل محلول الأمونيا منظفاً آمناً للنوافذ مع أنه قاعدي؟



$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$$

حيث تُعدُّ الأمونيا قاعدة ضعيفة.

70. مطهر حمض الهيبوكلوروز مطهر صناعي. اكتب المعادلة الكيميائية وتعبير  $K_a$  لتأين حمض الهيبوكلوروز في الماء.



$$K_a = \frac{[H^+][ClO^-]}{[HClO]}$$

## تقويم الفصل

2

### 2-3

#### اتقان المفاهيم

74. ما العلاقة بين  $pOH$  وتركيز أيون  $OH^-$  في محلول؟

$$pOH = -\log [OH^-]$$

75. قيمة  $pH$  للمحلول A تساوي 2.0 وللمحلول B تساوي 5.0. أي المحلولين أكثر حموضية بناءً على تركيز أيون  $H^+$  في المحلولين، وكم مرة تزيد الحموضية؟

**حموضية محلول A هي  $10^{-3}$ ، أو أكثر 1000 مرة من حموضية محلول B.**

76. إذا تناقص تركيز أيونات  $H^+$  في محلول مائي، فهذا يجب أن يحدث لتركيز أيونات  $OH^-$ ؟ ولماذا؟

**يزداد  $[OH^-]$  لأن  $K_w = [H^+][OH^-]$ .**

77. استعمل مبدأ لوتشاتلييه لتوضيح ما يحدث للاتزان  $H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$  عند إضافة بعض قطرات من  $HCl$  إلى ماء نقي.

**يُضيف  $HCl$  أيونات  $H^+$  إلى الماء فيتجه الاتزان نحو اليسار.**

#### اتقان حل المسائل

78. ما  $[OH^-]$  في محلول مائي عند  $K = 298$  حيث  $[H^+] = 5.40 M \times 10^{-3}$

$$K_w = [H^+][OH^-]$$

$$[OH^-] = \frac{K_w}{[H^]} = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{5.40 \times 10^{-3}}$$

$$[OH^-] = 1.85 \times 10^{-12} M$$

78. ما قيمة  $pH$  و  $pOH$  للمحلول المذكور في السؤال 78؟

$$pH = -\log [H^+] = -\log (5.40 \times 10^{-3})$$

$$pH = 2.27$$

$$pOH = -\log [OH^-] = -\log (1.85 \times 10^{-12})$$

$$pOH = 11.7$$

80. لديك محلولان: 0.10 M  $HCl$  و 0.10 M  $HF$  ، أيهما يكون تركيز أيونات  $H^+$  فيه أعلى؟ احسب  $pH$  لكل من المحلولين . إذا علمت أن  $[H^+] = 7.9 \times 10^{-3} M$  في محلول  $HF$ .

**يُعد  $0.10 M HCl$  حمضًا قويًا،  $0.10 M HF$  حمضًا ضعيفًا.**

$$pH = -\log [H^+] = -\log 0.10 = 1.00$$

$$[H^+] = 7.9 \times 10^{-3} M, 0.10 M HF$$


$$pH = -\log [H^+] = -\log 7.9 \times 10^{-3} = 2.10$$

**يحتوي  $HCl$  على تركيز أعلى لأيونات  $H^+$ ؛ لأن قيمة  $pH$  له أقل.**

## تقدير الفصل

2

83. ما كواشف الأحماض والقواعد المبينة في الشكل 24-2، والتي من المناسب استعمالها في تفاعل التعادل المبين منحنى معايرته في الشكل 30-2؟ ولماذا؟



الشكل 2-30

البرومكريسول البنفسجي مناسب؛ لأنّه يغيّر لونه قرب نقطة التكافؤ pH التي تساوي 6.0.


84. متى يكون استعمال pH أفضل من الكاشف لتحديد نقطة النهاية لمعيرة حمض وقاعدة؟

يُستعمل مقياس pH، إذا لم يوجد كاشف يغيّر لونه عند نقطة التكافؤ أو قربها، أو عندما لا يتوافر كاشف.

85. ماذا يحدث عند إضافة حمض إلى محلول المنظم  $\text{HF} / \text{F}^-$ ؟

ينتج الحمض أيونات الهيدروجين التي تتفاعل مع أيونات  $\text{F}^-$  في محلول؛ لتكون جزيئات  $\text{HF}$ . وستقلّ pH قليلاً.

81. منظف الفلزات يستعمل حمض الكروميك منظفا صناعياً للفلزات. احسب قيمة  $K_a$  للتأين الثاني لحمض الكروميك إذا كان لديك محلول تركيزه M 0.040 من كرومات الصوديوم الهيدروجينية قيمة pH لها 3.946



$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-3.946) = 1.13 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = [\text{CrO}_4^{2-}] = 1.13 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CrO}_4^{2-}]}{[\text{HCrO}_4^-]} = \frac{(1.13 \times 10^{-4})^2}{(0.040 - 1.13 \times 10^{-4})}$$

$$= 3.2 \times 10^{-7}$$

### 2-4



#### تقان المفاهيم

82. ما الحمض والقاعدة اللذان يجب أن يتفاعلاً ليتتجا محلولاً مائياً من يوديد الصوديوم؟

يجب أن يتفاعل حمض الهيدروأيديك وهيدروكسيد الصوديوم.

## تقدير الفصل

b. بروميد الأمونيوم



89. تنقية الهواء يستعمل هيدروكسيد الليثيوم لتنقية الهواء بإزالة ثاني أكسيد الكربون. فإذا تمت معايرة عينة من محلول هيدروكسيد الليثيوم حجمها 25.00 mL بمحلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 0.3340 M فتطلب 15.22 mL من الحمض. فما مolarية محلول LiOH؟

اكتب معادلة التفاعل، واحسب عدد مولات HCl:



$$\begin{aligned}\text{mol HCl} &= V_A \times M_A = 0.01522 \text{ L} \times 0.3340 \text{ mol/L} \\ &= 0.005083 \text{ mol}\end{aligned}$$

احسب عدد مولات LiOH، ثم احسب المolarية:

$$\begin{aligned}\text{mol LiOH} &= (0.005083 \text{ mol HCl}) \times \frac{1 \text{ mol LiOH}}{1 \text{ mol HCl}} \\ &= 0.005083 \text{ mol}\end{aligned}$$

$$M_{\text{LiOH}} = \frac{\text{mol LiOH}}{\text{vol LiOH}} = \frac{0.005083 \text{ mol}}{0.02500 \text{ L}} = 0.2033 \text{ M}$$

86. عند إضافة الميثيل الأحمر إلى محلول مائي ينتج لون وردي. وعند إضافة الميثيل البرتقالي إلى محلول نفسه ينتج لون أصفر. ما مدى pH تقريباً للمحلول؟ استعمل الشكل 24-2.

ستكون قيمة pH بين 4.2 و 5.6 تقريباً.

87. أعط الاسم والصيغة الجزيئية للحمض والقاعدة اللذين أنتجا كلاً من الأملاح الآتية:

NaCl .a

القاعدة: هيدروكسيد الصوديوم .NaOH

الحمض: حمض الهيدروكلوريك .HCl

KHCO<sub>3</sub> .b

القاعدة: هيدروكسيد البوتاسيوم .KOH

الحمض: حمض الكربونيكي .H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

NH<sub>4</sub>NO<sub>2</sub> .c

القاعدة: الأمونيا .NH<sub>3</sub>

الحمض: حمض النيتروز .HNO<sub>2</sub>

CaS .d


القاعدة: هيدروكسيد الكالسيوم .Ca(OH)<sub>2</sub>

الحمض: حمض الهيدروكبريتيك .H<sub>2</sub>S

إتقان حل المسائل

88. اكتب معادلات كيميائية ومعادلات أيونية كلية لتمييز كل من الملحين الآتيين في الماء:

a. كربونات الصوديوم




2

## تقدير الفصل

92. كم mL من محلول HCl الذي تركيزه 0.225 M يُحتاج إليه لمعيرة 6.00 g من KOH؟

اكتب معادلة التفاعل، واحسب عدد مولات KOH:



$$6.00 \text{ g KOH} \times \frac{1 \text{ mol KOH}}{56.11 \text{ g KOH}} = 0.107 \text{ mol KOH}$$

احسب عدد مولات HCl:

$$0.107 \text{ mol KOH} \times \frac{1 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol KOH}} = 0.107 \text{ mol HCl}$$

احسب الحجم:

$$M_{\text{HCl}} = \frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}}$$

$$0.107 \text{ mol HCl} \times \frac{1 \text{ L}}{0.225 \text{ mol HCl}}$$

$$\times \frac{1000 \text{ mL HCl}}{1 \text{ L}} = 475 \text{ mL HCl}$$

90. أضيف 74.30 mL من محلول NaOH الذي تركيزه 0.43885 M لمعيرة 45.78 mL من حمض الكبريتيك حتى نقطة النهاية. ما مolarية محلول  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ؟

اكتب معادلة التفاعل، واحسب عدد مولات NaOH:



$$\text{mol NaOH} = V \times M = 0.07430 \text{ L} \times 0.4388 \text{ M}$$

$$= 0.03260 \text{ mol}$$

احسب عدد مولات  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ، ثم احسب المolarية:

$$\text{mol H}_2\text{SO}_4 = (0.03260 \text{ mol NaOH}) \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4}{2 \text{ mol NaOH}}$$


$$= \frac{0.03260}{2} = 0.01630 \text{ mol}$$

$$M_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{\text{mol H}_2\text{SO}_4}{\text{L H}_2\text{SO}_4} = \frac{0.01630 \text{ mol}}{45.78 \text{ mL}}$$

$$\times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 0.3561 \text{ M}$$

## مراجعة عامة

91. اكتب معادلة تفاعل التأين، وتعبير ثابت تأين القاعدة، للإيثيل أمين  $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$  في الماء.




$$K_b = \frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+][\text{OH}^-]}{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2]}$$


## 2

## تقدير الفصل

95. اكتب معادلتين كيميائيتين موزوتنين لتأين حمض الكربونيك في الماء، وحدد زوج الحمض والقاعدة المرافقين في كل معادلة.



الحمض:  $(\text{HCO}_3^{-})$ ، وقاعدته المرافق:  $(\text{H}_2\text{CO}_3)$   
القاعدة:  $(\text{H}_3\text{O}^{+})$ ، والحمض المرافق:  $(\text{H}_2\text{O})$ .



الحمض:  $(\text{CO}_3^{2-})$ ، وقاعدته المرافق:  $(\text{HCO}_3^{-})$   
القاعدة:  $(\text{H}_3\text{O}^{+})$ ، والحمض المرافق:  $(\text{H}_2\text{O})$ .

96. تكرير السكر يستعمل هيدروكسيد الإسترانشيوم في تكرير سكر الشمندر. ويمكن إذابة 4.1 g فقط من هيدروكسيد الإسترانشيوم في 1 L من الماء عند درجة حرارة 273 K. فإذا كانت ذوبانية هيدروكسيد الإسترانشيوم منخفضة إلى هذه الدرجة، فاشرح لماذا يمكن اعتباره قاعدة قلوية قوية؟

يتفكك  $\text{Sr}(\text{OH})_2$  الذائب في الماء جميعه مكوناً أيونات  $\text{OH}^-$  و  $\text{Sr}_2^+$

93. ما قيمة pH لمحلول تركيزه 0.200 M من حمض الهيبوبروموز  $\text{HBrO}$ ؟ إذا علمت أن  $K_a = 2.8 \times 10^{-9}$

$$[\text{BrO}^-] = [\text{H}^+]; [\text{HBrO}] = 0.200 \text{M} - [\text{H}^+]$$

بما أن قيمة  $K_a$  صغيرة، افترض أن  $[\text{H}^+]$  صغير جداً مقارنة بـ  $0.200 \text{M}$ . لذا،  $[\text{H}^+] \approx 0.200 \text{M}$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{BrO}^-]}{[\text{HBrO}]}$$

$$\frac{[\text{H}^+]^2}{0.200} = 2.8 \times 10^{-9}$$

$$[\text{H}^+]^2 = 2.8 \times 10^{-9} \times 0.200$$


$$[\text{H}^+] = 2.4 \times 10^{-5} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log(2.4 \times 10^{-5}) = 4.63$$

94. أي مما يأتي حمض متعدد البروتونات؟ اكتب معادلات تأين متتالية للأحماض المتعددة البروتونات في الماء.




يُعد كلّ من a و d حمضاً متعدد البروتونات.



2

## تقدير الفصل

- .99. اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الذي يحدث عند إضافة قاعدة إلى محلول المنظم .  $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$



التفكير الناقد

- .100. انقد العبارة الآتية: "يجب اعتبار المادة التي تحتوي صيغتها الكيميائية على مجموعة الهيدروكسيل قاعدة".

**هذه الجملة مضللة. إذا كانت المادة تتفكك، أو تتفاعل مع الماء لتنتج أيونات الهيدروكسيد في محلول، فإنها تُعد قاعدة، ولكن هناك مواد – منها الأحماض العضوية – تحتوي علىمجموعات الهيدروكسيل المرتبطة، بحيث تعطي أيونات الهيدروجين في الماء فتنتج محلول حمضي.**

- .97. ما تراكيز أيونات  $\text{OH}^-$  في محليل لها قيمة  $\text{pH}$  الآتية: 3.00 و 6.00 و 9.00 و 12.00 عند درجة حرارة 298 K وما هي قيمة  $\text{pOH}$  لها؟

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14.00; \text{pOH} = 14.00 - \text{pH}$$

$$[\text{OH}^-] = \text{antilog}(-\text{pOH})$$

$$\text{pOH} = 14.00 - 3.00 = 11.00$$

$$[\text{OH}^-] = \text{antilog}(-11.00) = 1.0 \times 10^{-11}$$

$$\text{pOH} = 14.00 - 6.00 = 8.00$$

$$[\text{OH}^-] = \text{antilog}(-8.00) = 1.0 \times 10^{-8}$$

$$\text{pOH} = 14.00 - 9.00 = 5.00$$

$$[\text{OH}^-] = \text{antilog}(-5.00) = 1.0 \times 10^{-5}$$

$$\text{pOH} = 14.00 - 12.00 = 2.00$$

$$[\text{OH}^-] = \text{antilog}(-2.00) = 1.0 \times 10^{-2}$$

- .98. جهاز  $\text{pH}$  في الشكل 2-31 مغموس في محلول حمض أحادي البروتون، HA، تركيزه 0.200 M عند درجة حرارة 303 K. ما قيمة  $K_a$  للحمض عند درجة حرارة 303 K



الشكل 2-31

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-\text{pH})$$


$$= \text{antilog}(-3.10) = 7.9 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$K_a = \frac{(7.9 \times 10^{-4})(7.9 \times 10^{-4})}{(0.200 - 7.9 \times 10^{-4})} = 3.1 \times 10^{-6}$$


## تقويم الفصل

2


103. حدد أحماض وقواعد لويس في التفاعلات الآتية:



**حمض لويس:  $H^+$  و  $H_2O$ , قاعدة لويس:  $OH^-$ .**




**حمض لويس:  $BCl_3$ , قاعدة لويس:  $BCl_4^-$ .**



**حمض لويس:  $SO_3$ , قاعدة لويس:  $H_2O$ .**

104. تفسير الرسوم العلمية ارسم منحنى الرقم الهيدروجيني pH مقابل الحجم الناتج عن معايرة حمض ثانوي البروتونات بمحلول NaOH تركيزه 0.10 M.

**يجب أن يبين المنحنى أن pH تزيد بسرعة أكبر قبل المنطقة الأفقية وبعدها قرب نقطة التكافؤ، حيث سيكون هناك سطح أفقى أكثر.**



101. حلل واستنتاج هل يمكن أن يصنف محلول حمضًا بحسب برونستد - لوري ولا يصنف حمضًا بحسب قاعدة أرهيبيوس؟ وهل يمكن أن يكون حمضًا بحسب نظرية برونستد - لوري وليس حمضًا بحسب نظرية أرهيبيوس؟ هل يمكن ألا يصنف حمض لويس بوصفه حمض أرهيبيوس أو برونستد - لوري؟ اشرح ذلك مع ذكر أمثلة.

**تُعدَّ أحماضُ أرهيبيوس جميعها أحماض برونستد - لوري أيضًا، كما تُعدَّ معظمُ أحماض برونستد - لوري أحماض أرهيبيوس، عندما تكون في محلول مائي، ومن أمثلتها:  $H_3PO_4$ ,  $H_2SO_4$ , و  $HCl$ . وتُعدَّ أحماض لويس مستقبلات أزواج الكترونات، وبما أنَّ أيون الهيدروجين يتقبل زوج الكترونات، فأحماض أرهيبيوس وبرونستد - لوري جميعها تُعدَّ أيضًا أحماض لويس، وبعض أحماض لويس لا تُعدَّ أحماض أرهيبيوس ولا برونستد - لوري، مثل،  $BF_3$ .**

102. طبق المفاهيم استعمل ثابت تأين الماء عند درجة حرارة 298 K لتفسير لماذا ينبغي للمحلول الذي قيمة pH له 3.0 أن تكون قيمة pOH له = 11.0  
المحلول الذي له pH 3.0 يكون تركيز أيون الهيدروجين فيه  $1.00 \times 10^{-3} M$ :

$$pH = -\log [H^+]$$

$$3.0 = -\log [H^+]$$

$$[H^+] = 1.00 \times 10^{-3}$$

عُوض هذه القيمة في:

$$[OH^-] = \frac{K_w}{[H^+]} = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{1.00 \times 10^{-3}} = 1.00 \times 10^{-11}$$

$$\begin{aligned} pOH &= -\log[OH^+] \\ &= \log(1.00 \times 10^{-11}) \end{aligned}$$

$$pOH = 11.0$$


## تقويم الفصل

2

105. السبب والنتيجة وضح كيف يعمل محلول المنظم من خالل النظام المنظم  $C_2H_5NH_3^+$ / $C_2H_5NH_2$ ? وبين مستعيناً بالمعادلات كيف يتأثر نظام (القاعدة الضعيفة / الحمض المرافق) عند إضافة كميات صغيرة من الأحماض والقواعد إلى محلول هذا النظام؟



عند إضافة حمض يتوجه الاتزان نحو اليسار، وعند إضافة قاعدة؛ تتحدد أيونات  $OH^-$  المضافة مع أيونات  $H^+$  ويتجه التفاعل نحو اليمين.



الشكل 2-32

يُحتمل أن تتآثر ذرة الهيدروجين الموجودة في مجموعة  $COOH^-$  فقط.

106. طبق المفاهيم تتغير قيمة  $K_w$  وغيرها من ثوابت الاتزان بحسب درجة الحرارة.  $K_w$  يساوي  $10^{-15}$  عند  $10^\circ C$ ، و  $10^{-14}$  عند  $25^\circ C$  و  $10^{-13}$  عند  $40^\circ C$ . في ضوء هذه المعلومات احسب قيم  $pH$  للماء النقى عند درجات الحرارة الثلاث هذه، وقارن بينها. هل يصح القول إن  $pH$  للماء النقى دائمًا 7.0؟ اشرح إجابتك.

$pH$  للماء النقى تساوى 7.268 عند  $10^\circ C$ ، وعند  $25^\circ C$  تساوى 6.998.  $pH$  تساوى 6.767.  $pH$  للماء النقى دائمًا 7.0؛ لأن  $pH$  للماء النقى يساوى 7.0 فقط عند  $25^\circ C$ ، أو  $298K$ .

## تقويم الفصل

2

### مسألة تحفيز

109. عند حرق 5.00 g من مركب في مسurer، ارتفعت درجة حرارة 2.00 kg من الماء من 24.5°C إلى 240.5°C. ما كمية الحرارة التي تنطلق عند حرق 1.00 mol من المركب (الكتلة المولية = 46.1 g/mol)؟

$$q = c \times M \times \Delta T$$

$$\Delta T = 40.5^\circ\text{C} - 24.5^\circ\text{C} = 16.0^\circ\text{C}$$

$$2.00 \text{ kg} \times \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} = 2000 \text{ g H}_2\text{O}$$

$$5.00 \cancel{\text{g compound}} \times \frac{1 \text{ ml compound}}{46.1 \cancel{\text{g compound}}} = 0.108 \text{ mol compound}$$

$$q = (4.184 \text{ J/(g. }^\circ\text{C)})(2.00 \times 10^3 \text{ g})(16.0^\circ\text{C})$$

$$= 1.34 \times 10^5 \text{ J}$$

$$= \frac{1.34 \times 10^5 \text{ J}}{0.108 \text{ mol}} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}}$$

$$= 1240 \text{ kJ/mol}$$

110. يتفاعل الهيدروجين والفلور لتكوين HF بحسب معادلة الاتزان الآتية:



هل تؤدي زيادة درجة الحرارة إلى زيادة كمية المادة الناتجة؟ اشرح ذلك.

**التفاعل طارد للحرارة؛ لأن إشارة  $\Delta H$  سالبة.** ولذلك

**تنتج حرارة من التفاعل، وبحسب مبدأ لوتشاتييليه، فإن**

**رفع درجة الحرارة سيؤدي إلى إزاحة الاتزان نحو اليسار نحو المتفاعلات، وبالتالي تقليل كمية المادة الناتجة وليس زيتها.**

108. لديك 20.0 mL من محلول حمض ضعيف، HX، و  $K_a = 2.14 \times 10^{-6}$ . وقد وجد أن pH للمحلول 3.800. ما كمية الماء المقطر التي يجب إضافتها إلى محلول لرفع pH إلى 4.000؟

**المحلول الأصلي:**

$$\begin{aligned} [\text{H}^+] &= \text{antilog}(-\text{pH}) \\ &= \text{antilog}(-4.000) \\ &= 1.58 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

$$\frac{[\text{H}^+][\text{X}^-]}{[\text{HX}]} = \frac{(1.58 \times 10^{-4})^2}{M_1} = 2.14 \times 10^{-6}$$

$$M_1 = \frac{(1.58 \times 10^{-4})^2}{(2.14 \times 10^{-6})} = 0.0117 \text{ M}$$

**المحلول المخفف:**

$$\begin{aligned} [\text{H}^+] &= \text{antilog}(-\text{pH}) \\ &= \text{antilog}(-4.000) \\ &= 1.00 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

$$2.14 \times 10^{-6} = \frac{(1.00 \times 10^{-4})^2}{M_2}$$

$$M_2 = \frac{(1.00 \times 10^{-4})^2}{2.14 \times 10^{-6}} = 0.00467 \text{ M}$$

**عدد مولات HX في المحلولين الأصلي والمخفف متساويان:**

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$(0.0117 \text{ M} \times 20.00 \text{ mL}) = (0.00467 \text{ M} \times V_2)$$

$$V_2 = \frac{(0.0117 \text{ mol/L})(20.00 \text{ mL})}{0.00467 \text{ mol/L}}$$

$$V_2 = 50.1 \text{ mL}$$

**أضف 30.1 mL من الماء المقطر إلى كل 20.0 mL من المحلول الأصلي.**

## تقدير الفصل

113. الأحماض الأمينية هناك عشرون حمضًا أمينيًّا تتحدد لتكوين البروتينات في أجهزة المخلوقات الحية. اكتب بحثًا عن تركيب وقيم  $K_a$  لخمسة أحماض أمينية وقوّتها. قارن بين قوى هذه الأحماض وقوى الأحماض في الجدول 4-2.

**ستتنوع إجابات الطلاب. فمثلاً،  $K_a$  لادة الفالين (الفلين) يساوي  $2.51 \times 10^{-4}$  عند  $298\text{ K}$ .**



الشكل 33-2

111. يبيّن الشكل 33-2 تغير الطاقة في أثناء سير تفاعل ما.

a. هل التفاعل طارد أم ماض للطاقة؟  
**التفاعل طارد للحرارة؛ لأن طاقة المواد الناتجة أعلى من طاقة المواد المتفاعلة.**

b. ما عدد خطوات آلية التفاعل لهذا التفاعل?  
**خطوتان، لأن المنحنى يظهر طاقتين تنشيط.**

الكتاب في الكيمياء

112. نظريات الأحماض والقواعد تخيل أنك الكيميائي برونستد في عام 1923م، وقد قمت بصياغة نظرية جديدة عن الأحماض والقواعد. اكتب رسالة إلى العالم السويدي أرهينيوس، تناقش فيها الفروق بين نظرية برونستد ونظرية أرهينيوس، وتشير فيها إلى مزايا نظرية برونستد.

**يجب أن توضح رسائل الطالب أن نظرية برونستد شملت الأحماض والقواعد التي عرفتها نظرية أرهينيوس جميعها، ولكنها ذهبت أبعد من ذلك، بشرحها كيف أن بعض المواد ومنها الأمونيا تُنتج محليل قاعدية، ولكنها لا تحتوي على أيون هيدروكسيد في تركيبها. وتوضح نظرية برونستد أيضًا دور الماء وأيون الهيدرونيوم في محليل الحمضية والقواعدية.**

2

## تقدير الفصل

116. ما قيمة pH في عام 2003؟ وما مقدار التغير في متوسط pH بين عامي 1990 و2003؟

**يمر خط الاتجاه في القيمة 4.48 في 2003م. تغير متوسط pH من 4.39 في عام 1990 إلى 4.48 في عام 2003، وكان مقدار التغير 0.18.**

## أسئلة المستندات

ماء المطر يبين الشكل 2-34 2 قياسات pH في عدد من مناطق المراقبة في إحدى الدول. وتمثل البقعة الوردية متوسط القياسات التي أخذت في جميع المناطق في وقت معين. ادرس الرسم البياني جيداً، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه.



الشكل 2-34

114. كيف يتغير متوسط pH للسنوات 2003م - 1990م؟ زادت قيمة pH تدريجياً من 4.25 تقريباً في 1990 م إلى 4.55 تقريباً في 2003م.

115. احسب  $[H^+]$  لأدنى وأعلى pH مسجلة على الرسم البياني. وكم مرة تزيد حمضية ماء المطر الأكثر حمضية على حمضية ماء المطر الأقل حمضية؟

أقل قيمة pH تساوي 4.08 في عام 1990م.

$$[H^+] = \text{antilog}(-4.08) = 8.3 \times 10^{-5} M$$

أكبر قيمة pH تساوي 4.85 في عام 1998م.

$$[H^+] = \text{antilog}(-4.85) = 1.4 \times 10^{-5} M$$

$$\frac{8.3 \times 10^{-5}}{1.4 \times 10^{-5}} = 5.9$$

5.9 مرات أكثر حمضية.

# اختبار مقتن

4. بروميد الهيدروجين HBr حمض قوي ومادة أكالة شديدة.  
ما pOH محلول HBr الذي تركيزه M 0.0375 ؟

12.574 .a

12.270 .b

1.733 .c

1.433 .d

$$pH = -\log(0.0375) = 1.430$$

$$pOH = 14 - 1.43 = 12.574$$

استعن بالجدول أدناه للإجابة عن الأسئلة من 5 إلى 7.

ثوابت التأين وبيانات pH لبعض الأحماض العضوية		
	ال.Acidity	الحمض
$K_a$	pH محلول تركيزه 1.000 M	
$1.78 \times 10^{-4}$	1.87	HA
$3.55 \times 10^{-3}$	?	HB
?	2.43	HX
$7.08 \times 10^{-3}$	1.09	HD
$9.77 \times 10^{-5}$	2.01	HR

5. أي حمض أقوى؟

HA .a

HB .b

HX .c

HD .d

6. ما ثابت تأين حمض HX؟

$1.0 \times 10^{-5}$  .a

$2.43 \times 10^0$  .b

$3.72 \times 10^{-3}$  .c

$7.3 \times 10^4$  .d

7. ما قيمة pH محلول حمض السيانو إيثانويك الذي

تركيزه M 0.40 ؟

2.06 .a

1.22 .b

2.45 .c

1.42 .d

## أسئلة الاختيار من متعدد

استعن بالرسم البياني أدناه للإجابة عن السؤالين 1 و 2.



1. ما قيمة pH عند نقطة التكافؤ لهذه المعايرة؟

10 .a

9 .b

5 .c

1 .d

2. ما الكافش الأكثر فاعلية لتحري نقطة النهاية هذه المعايرة؟

a. الميثيل البرتقالي الذي مده 4.4 – 3.2

b. فينوفثالين الذي مده 10 – 8.2

c. البروموكريسول الأخضر الذي مده 5.4 – 3.8

d. الثايمول الأزرق الذي مده 9.6 – 8.0

3. ينتج التنفس الخلوي mol 38 تقريباً من ATP مقابل كل مول يستهلك من الجلوكوز:



إذا كان كل 1 mol من ATP ينتج 30.5 kJ من الطاقة فما كمية الطاقة التي يمكن الحصول عليها من قطعة حلوي تحتوي على 130.0 g من الجلوكوز؟

27.4 kJ .a

836 kJ .b

1159 kJ .c

$$130.0 \text{ g} \times (1 \text{ mol}/180.18 \text{ g}) \times 3970 \text{ kJ}$$

$$\times (38 \text{ mol ATP}/1 \text{ mol جلوكوز}) \times (30.5 \text{ kJ mol ATP})$$

$$= 836 \text{ kJ}$$

100

# اختبار مفمن

## أسئلة الإجابات المفتوحة

10. أضيف 5.00 mL من HCl تركيزه M 6.00 إلى 95.00 mL من الماء النقي، وأصبح الحجم النهائي للمحلول 100 mL. ما قيمة pH للمحلول؟

احسب عدد مولات  $H^+$ ، تركيزها، ثم احسب pH:

$$\text{mol HCl} = \text{mol H}^+ = 0.00500 \text{ L} \times 6.00 \text{ mol/L} \\ = 0.0300 \text{ mol}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{0.0300 \text{ mol H}^+}{0.100 \text{ L}} = 0.300 \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log (0.300) = 0.523$$

11. محلول مائي منظم بحمض البنزويك  $C_6H_5COOH$  وبنزوات الصوديوم  $C_6H_5COONa$ ، تركيز كل منها 0.0500 M. فإذا كان  $K_a$  لحمض البنزويك يساوي  $6.4 \times 10^{-5}$ ، فما قيمة pH للمحلول؟

$$K_a = 6.4 \times 10^{-5} = \frac{[\text{H}^+] [\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$[\text{H}^+] = (6.4 \times 10^{-5}) \times \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \\ = (6.4 \times 10^{-5}) \times \frac{0.0500}{0.0500} = 6.4 \times 10^{-5} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 6.4 \times 10^{-5} \text{ M} = 4.19$$

8. ماذا نعني بقولنا: إن قيمة  $K_{eq}$  أكثر من 1؟

- a. هناك مواد متفاعلة أكثر من النواتج عند الاتزان.  
b. هناك نواتج أكثر من المواد المتفاعلة عند الاتزان.  
c. سرعة التفاعل الامامي عالية عند الاتزان.  
d. سرعة التفاعل العكسي عالية عند الاتزان.

## أسئلة الإجابات القصيرة

9. الأحماض والقواعد الشائعة استعمل البيانات الموجودة في الجدول أدناه للإجابة عن الأسئلة الآتية:

pH	المادة
11.3	الأمونيا المتريلية
2.3	عصير الليمون
9.4	مضاد الحموضة
7.4	الدم
3.0	المشروبات الغازية

a. أيّ مادة أكثر قاعدية؟

**الأمونيا المتريلية**

b. أيّ مادة أقرب إلى التعادل؟

**الدم**

c. أيّ مادة فيها تركيز  $\text{H}^+ = 4.0 \times 10^{-10} \text{ M}$ ؟

**مضاد الحموضة**

d. أيّ مادة لها  $\text{pOH} = 11.0$ ؟

**المشروبات الغازية**

e. كم مرّة تزيد قاعدية مضاد الحموضة على قاعدية الدم؟

**100 مرّة**

تم تحميل وعرض المادة من :



# موقع واجباتي

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترقي ب مجال التعليم على الإنترت ويستطيع الطالب تصفح حلول الكتب مباشرة لجميع المراحل التعليمية المختلفة



حمل التطبيق من هنا



قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# الكيمياء ٣

التعليم الثانوي - نظام المسارات  
السنة الثالثة

قام بالتأليف والمراجعة  
فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولابدّ

طبعة 2023-1445

ح) وزارة التعليم ، 1444هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم

الكيمياء 3. / وزارة التعليم. - الرياض ، 1444هـ .

ص 178؛ 21×27 سم

ردمك : 978-603-511-329-8

1- الكيمياء - تعليم - السعودية 2- التعليم الثانوي - السعودية -  
كتب دراسية. أ. العنوان

1444/2767

ديوی 540,712

رقم الإيداع : 1444/2767

ردمك : 978-603-511-329-8

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:  
يسعدنا تواصلكم: لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# تفاعلات الأكسدة والاختزال

## Redox Reactions

3

ج

**الفكرة العامة** تعد تفاعلات الأكسدة والاختزال من العمليات الكيميائية الشائعة في الطبيعة وفي الصناعة، وتتضمن انتقالاً للإلكترونات.


### 3-1 الأكسدة والاختزال

**الفكرة الرئيسية** يعد تفاصلاً للأكسدة والاختزال تفاعلين متكملين؛ إذ تأكسد ذرة وتحتزل أخرى.

### 3-2 وزن معادلات الأكسدة والاختزال

**الفكرة الرئيسية** تصبح معادلات الأكسدة والاختزال موزونةً عندما تكون الزيادة الكلية في أعداد التأكسد متساويةً لانخفاض الكلي في أعداد التأكسد للذرات الداخلة في التفاعل.

## حقائق كيميائية



- يمكن زيادة لمعان العصا الضوئية النشطة بتسخينها، لكن البريق لن يستمر طويلاً.
- ليس بالضرورة أن يكون الضوء الناتج عن تفاعلات الأكسدة والاختزال مصحوباً بالحرارة.
- يستعمل نحو 90% تقريباً من الأحياء البحرية شكلاً من أشكال الضوء الحيوي الذي يتولد من تفاعلات الأكسدة والاختزال.



## نشاطات تمهيدية

وزن معادلات الأكسدة والاختزال صمم المطوية الآتية لتساعدك على تلخيص المعلومات حول الطائق المختلفة في وزن معادلات الأكسدة والاختزال.



### المطويات

منظمات الأفكار

**الخطوة 1** اجمع طبقتين من الورق، واجعل طرف الورقة العلوية على بعد 2 cm من حافة الورقة السفلية كما في الشكل.



**الخطوة 2** انح الحواف السفلية إلى أعلى لتكون أربعة تفرعات متساوية. ثم ثبت الثانية بالضغط عليها لتحافظ على التفرع في مكانه جيداً، كما في الشكل المجاور.



**الخطوة 3** ثبت الثانية وعنونها على النحو الآتي: وزن معادلات الأكسدة والاختزال، طريقة عدد التأكسد، معادلة الأكسدة والاختزال الأيونية الكلية، أنصاف التفاعل.

**المطويات** استعمل المطوية في القسم 2-3، ولخّص ما تقرؤه حول موازنة معادلات الأكسدة والاختزال، واعرض مثلاً على كل طريقة.

**استقصاء** ماذا يمكن أن يحدث للنحاس لو وضع في محلول كبريتات الحديد؟ صمم تجربة لاختبار فرضيتك.

لن يحدث تفاعل عندما يوضع النحاس في محلول كبريتات الحديد، ويجب أن يكون الاستقصاء مشابهاً للتجربة الاستهلاية

## تجربة استهلاكية

ماذا يحدث عندما يتفاعل الحديد وكبريتات النحاس II؟ يتبع الصدأ عندما يتتفاعل الحديد والأكسجين، ويتفاعل الحديد أيضاً مع مواد أخرى غير الأكسجين.



### خطوات العمل

1. اقرأ نموذج احتياطات السلامة في المختبر.

2. استعمل قطعة من ورق الصنفراة لتلميع مسماك الحديد.

3. أضف 3 mL تقريباً من محلول 1.0 M من كبريتات النحاس  $\text{CuSO}_4 \text{ II}$  إلى أنبوب اختبار، وضع المسماك الذي جرى تلميعه في محلول  $\text{CuSO}_4$ ، ثم ضع أنبوب الاختبار في حامل الأنابيب، وراقبه مدة 10 دقائق، ثم سجل ملاحظاتك.

### تحليل النتائج


1. فسر ما يحدث للون محلول كبريتات النحاس.

**يتحول لون محلول الأزرق إلى اللون الأخضر الفاتح**

2. حدد المادة التي التصقت بالمسماك.

### النحاس

3. اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة لهذا التفاعل.



## 3-1

### الأهداف

- تصف تفاعلات الأكسدة والاختزال.
- تحدد العوامل المؤكسدة والمختزلة.
- تحدد عدد التأكسد لعنصر في مركب.
- تفسر تفاعلات الأكسدة والاختزال من حيث التغير في حالة التأكسد.

### مراجعة المفردات

**الأيون المتفرج** الأيون غير المشترك في التفاعل ولا يظهر في المعادلة الأيونية.

### المفردات الجديدة

تفاعل الأكسدة والاختزال  
الأكسدة  
الاختزال  
العامل المؤكسد  
العامل المختزل

## الأكسدة والاختزال Oxidation and Reduction

**الفكرة الرئيسية** يُعد تفاعلاً الأكسدة والاختزال تفاعلين متكملين؛ إذ تتأكسد ذرة وتختزل أخرى.

**الربط مع الحياة** يتوج ضوء العصا الضوئية عن تفاعل كيميائي، فعندما تكسر الكبسولة الزجاجية داخل الإطار البلاستيكى يحدث تفاعل بين مادتين، وتنقل الإلكترونات، فتتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة ضوئية.


### انتقال الإلكترون وتفاعل الأكسدة والاختزال

### Electron Transfer and Redox Reactions

يمكن تصنيف التفاعلات الكيميائية في العادة إلى خمسة أنواع من التفاعلات هي: التكوين، التفكك، والاحتراق، والإحلال البسيط، والإحلال المزدوج. ومن خواص تفاعلات الاحتراق والإحلال البسيط أنها يتضمنان انتقال الإلكترونات من ذرة إلى أخرى، كما هو الحال في كثير من تفاعلات التكوين والتفكك. ففي تفاعل التكوين على سبيل المثال، يتفاعل الصوديوم  $\text{Na}$ ، والكلور  $\text{Cl}_2$  لتكوين المركب الأيوني  $\text{NaCl}$ ، وينتقل إلكترونان من ذرتى صوديوم إلى جزء الكلور  $\text{Cl}_2$  ويكون أيونان من الصوديوم وأيونان من الكلوريد، وتكون المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل على النحو الآتي:




والمعادلة الأيونية الكلية (الأيونات المكونة للبلورة):




أما تفاعل الماغنيسيوم في الهواء الذي يتضمن انتقال الإلكترونات فهو مثال على تفاعل الاحتراق.



المعادلة الأيونية الكلية (الأيونات المكونة للبلورة)




عندما يتفاعل الماغنيسيوم مع الأكسجين، كما في الشكل 1-3، فإن كل ذرة ماغنيسيوم تعطي إلكترونين إلى كل ذرة أكسجين، وتتحول ذرة الماغنيسيوم إلى أيون  $\text{Mg}^{2+}$ ، وتتحول



الشكل 1-3 يتضمن تفاعل الماغنيسيوم مع الأكسجين انتقال الإلكترونات من الماغنيسيوم إلى الأكسجين؛ لذا فإن هذا التفاعل هو تفاعل أكسدة واحتزال.

صف التفاعل بين الماغنيسيوم والأكسجين.

التفاعل هو تفاعل احتراق.



الشكل 3-2 التفاعل بين محلول أيونات البروميد وغاز الكلور هو تفاعل أكسدة، هنا تنتقل الإلكترونات من أيونات البروم إلى الكلور.

ذرة الأكسجين إلى الأيون  $\text{O}^{2-}$ ، ويُسمى التفاعل الذي انتقلت فيه الإلكترونات من إحدى الذرات إلى ذرة أخرى **تفاعل الأكسدة والاختزال**.

لناخذ تفاعل الإحلال البسيط بين محلول المائي للكلور وأيونات البروميد لتكوين محلول مائي من كlorيد البوتاسيوم والبروم الموضح في الشكل 2-3.

المعادلة الكيميائية الكاملة:


$2\text{KBr}_{(\text{aq})} + \text{Cl}_{2(\text{aq})} \rightarrow 2\text{KCl}_{(\text{aq})} + \text{Br}_{2(\text{aq})}$  المعادلة الكلية:

يُلاحظ أن الكلور يكتسب الإلكترونات من أيونات البروميد ليكون أيونات الكلوريد، وعندما يفقد أيوناً البروميد الإلكترونات تتحدد ذرتاً البروم برابطة تساهيمية لتكوين جزيء  $\text{Br}_2$ . إن تكوين الرابطة التساهيمية بمشاركة الإلكترونات هو أيضاً تفاعل أكسدة واحتزال.

**الأكسدة والاحتزال** أطلقت كلمة الأكسدة فيما مضى على التفاعلات التي تتضمن اتحاد المادة بالأكسجين، أما الآن فتعرف عملية **الأكسدة** على أنها فقدان ذرة المادة للإلكترونات. تفحص مرةً أخرى معادلة تفاعل الصوديوم والكلور الكلية، تلاحظ أن الصوديوم قد تأكسد لأنه فقد إلكترونًا.




وحتى يحدث تفاعل الأكسدة يجب أن تكتسب الإلكترونات التي تفقدتها المادة المتأكسدة من قبل ذرات أو أيونات مادة أخرى، وبعبارة أخرى يجب أن تكون هناك عملية مرافقة تتضمن اكتساب الإلكترونات المفقودة. أما عملية **الاحتزال** فتعرف على أنها اكتساب ذرات المادة للإلكترونات. وبالرجوع إلى مثال كلوريد الصوديوم فإن تفاعل الاحتزال المرافق لتفاعل الأكسدة هو احتزال الكلور.





إذن فالأكسدة والاحتزال عمليتان متراقبتان متكاملتان؛ فلا يحدث تفاعل الأكسدة إلا إذا حدث تفاعل احتزال، ومن المهم جدًا التمييز بين تفاعلي الأكسدة والاحتزال.



**الشكل 3-3** يتفاعل كل من فلز البوتاسيوم وغاز الكلور تفاعلاً أكسدة واحتزال لتكوين كلوريد البوتاسيوم.



**التغير في عدد التأكسد** تذكر أن عدد التأكسد لذرة في المركب الأيوني هو عدد الإلكترونات التي فقدتها أو اكتسبتها الذرة عندما تكونت الأيونات، وأن تفاعل البوتاسيوم مع الكلور، الموضح في **الشكل 3-3**، هو تفاعل أكسدة واحتزال، ومعادلة تفاعل فلز البوتاسيوم مع غاز الكلور هي على النحو الآتي:



يوجد البوتاسيوم ضمن عناصر المجموعة الأولى في الجدول الدوري، التي تمثل إلى فقد إلكترون واحد في التفاعل؛ بسبب انخفاض كهربرسالبيتها، وعدد تأكسدها  $+1$ . ومن ناحية أخرى يوجد الكلور ضمن عناصر المجموعة 17 التي تمثل إلى اكتساب إلكترونات؛ لأن كهربرسالبيتها عالية، وعدد تأكسدها في كثير من المركبات  $-1$ . ففي مفهوم الأكسدة والاحتزال يمكن القول إن ذرات البوتاسيوم قد تأكسدت من حالة الصفر إلى حالة  $+1$ ؛ لأن كل ذرة فقدت إلكتروناً، واحتزالت ذرات الكلور من الصفر إلى الحالة  $-1$ ، فكل ذرة أو أيون عند احتزالة يقل عدد تأكسده. وعلى العكس من ذلك عندما تأكسد ذرة أو أيون يزيد عدد تأكسدها.

ويعدّ عدد التأكسد أداةً يستعملها العلماء لكتابة المعادلة الكيميائية لمساعدتهم على الاحتفاظ بمسار حركة الإلكترونات في تفاعل الأكسدة. ويكتب عدد التأكسد مع الإشارة السالبة أو الموجبة قبل العدد ( $+3, +2, +1$ ،  $-1, -2, -3$ )، في حين تُكتب إشارة الشحنة الأيونية بعد العدد ( $+3, +2, +1$ ،  $-1, -2, -3$ ).

عدد التأكسد:  $+3$       الشحنة الأيونية:  $+3$

**ماذا قرأت؟** حدد أي العناصر أكثر قابليةً لاكتساب الإلكترونات: البوتاسيوم

أم الكلور؟ **الكلور**

### مهن في الكيمياء


**صانع الفخار** فنان يصنع الفخار، ويستعمل مواد تحتوي على أيونات فلزية لإضفاء الألوان المختلفة على الفخار عند حرقه. وتظهر المواد الزجاجية، التي تحتوي على أيونات النحاس، باللون الأخضر المائل إلى الزرقة عند تأكسدها، وتعطي اللون الأحمر عند حرقها في الفرن.



الجدول 3-1 ملخص تفاعلات الأكسدة والاختزال	
	العملية
• X يفقد إلكترونًا. • X عامل مختزل ويتأكسد. • يزيد عدد التأكسد للمادة X.	• المادة المتفاعلة تفقد إلكترونًا. • يتأكسد العامل المختزل. • يزيد عدد التأكسد للمادة X.
• Y يكتسب إلكترونًا. • الأخرى تكتسب إلكترونًا. • يختزل العامل المؤكسد. • يقلّ عدد التأكسد للمادة Y.	• المادة المتفاعلة الأخرى تكتسب إلكترونًا. • يختزل العامل المؤكسد. • يقلّ عدد التأكسد للمادة Y.

## العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة Oxidizing and Reducing Agents

يمكن وصف تفاعل البوتاسيوم - الكلور في الشكل 3-3 بأن البوتاسيوم قد تأكسد بواسطة الكلور. المادة التي يحدث لها اختزال (تكتسب إلكترونات) تُسمى **عاملًا مؤكسداً**، أما المادة التي يحدث لها أكسدة (تفقد إلكترونات) فتُسمى **عاملًا مختزلًا**؛ لذا فالعامل المختزل في تفاعل البوتاسيوم - الكلور هو البوتاسيوم؛ أي المادة التي تأكسدت.



العامل المختزل: K

العامل المؤكسد: Cl<sub>2</sub>

ومن التطبيقات الشائعة على تفاعلات الأكسدة والاختزال إزالة الشوائب من الفلزات. وتُعدُّ العوامل المؤكسدة والمختزلة الأخرى مفيدة في الحياة اليومية. فعلى سبيل المثال عند إضافة مبيض الغسيل إلى الملابس لتبييضها، فإنك تستعمل محلولاً من هيبوكلوريت الصوديوم NaClO؛ وهو عامل مؤكسد يؤدي إلى أكسدة البقع والأصباغ ومواد أخرى. ويلخص الجدول 1-3 الطائق المختلفة لوصف تفاعلات الأكسدة والاختزال.

### تجربة

#### ملاحظة تفاعل الأكسدة والاختزال

كيف يمكن إزالة الشوائب من الفضة؟

الخطوات

1. اقرأ نموذج الأمان في المختبر.

2. لِمَع قطعة من رقائق الألومنيوم برفق مستعملًا الصوف لإزالة أي طبقة مؤكسدة تغطيها.

3. لف قطعة صغيرة متأكسدة من معدن الفضة برقائق الألومنيوم، وتأكد من التصاق المنطقة المتأكسدة تماماً برقائق الألومنيوم.

4. ضع القطعة الملفوفة في كأس سعتها 400 mL، وأضف كمية محددة من ماء الصنبور حتى تغطيها تماماً.

5. أضف مقدار ملعقة من صودا الخبز، ومقدار ملعقة من ملح المائدة إلى الكأس.

6. أمسك الكأس بالماسك وضعها على السخان، وسخن محتوياتها حتى درجة الغليان، مع الحفاظ على الحرارة مدة 15 دقيقة تقريباً حتى تزول الشوائب.

#### التحليل


- اكتب معادلة تفاعل الفضة مع كبريتيد الهيدروجين، التي تنتج كبريتيد الفضة والهيدروجين.
- اكتب معادلة تفاعل كبريتيد الفضة (الشوائب) مع رقائق الألومنيوم والتي تنتج كبريتيد الألومنيوم والفضة.
- حدد أي الفلزات أكثر نشاطاً: الألومنيوم أم الفضة؟ وكيف تعرف ذلك من النتائج؟
- فسر لماذا يجب لا تستعمل أواني الألومنيوم عند تنظيف مواد مصنوعة من الفضة؟




ملحق

**التحليل**

1. اكتب معادلة تفاعل الفضة مع كبريتيد الهيدروجين، التي تنتج كبريتيد الفضة والهيدروجين.



2. اكتب معادلة تفاعل كبريتيد الفضة (الشوائب) مع رقائق الألومنيوم والتي تنتج كبريتيد الألومنيوم والفضة.



3. حدد أي الفلزات أكثر نشاطاً: الألومنيوم أم الفضة؟ وكيف تعرف ذلك من النتائج؟

**للألومنيوم أعلى جهد تأكسد؛ لأنّه يتآكسد في التفاعل**


4. فسر لماذا يجب ألا تستعمل أواني الألومنيوم عند تنظيف مواد مصنوعة من الفضة؟

**يمكن أن تتلف أوعية الألومنيوم**




## تفاعلات الأكسدة والاختزال والكهروسالبية Redox and Electronegativity

لا تقتصر تفاعلات الأكسدة والاختزال على تحول ذرات العناصر إلى أيونات أو العكس، بل تتضمن بعض تفاعلات الأكسدة والاختزال تغيرات في الجزيئات أو الأيونات الذرية التي تتّحد فيها الذرات تساهمياً بذرات أخرى. فعلى سبيل المثال، تمثّل المعادلة الآتية تفاعل الأكسدة والاختزال المستعمل في صناعة الأمونيا:



وهذه العملية لا تتضمن أيونات ولا انتقالاً للإلكترونات. فالمتفاعلات والنواتج جميعها مركبات جزيئية، ومع ذلك يعد تفاعل تأكسد واحتزال؛ إذ يعد النيتروجين عاملًا مؤكسداً، والهيدروجين عاملًا محتزلاً. في وضع مثل الأمونيا حيث تشارك ذرتان في الإلكترونات، كيف يمكننا القول إن إحدى الذرات فقدت الإلكترونات وتأكسدت، في حين اكتسبت الذرة الأخرى الإلكترونات واحتزلت؟ لإنجابة عن ذلك تحتاج إلى معرفة الذرة التي تجذب الإلكترونات بقوة أكبر، أو بعبارة أخرى معرفة أي الذرات لها كهرروسالية أكبر. يوضح الشكل 4-3 تزايد الكهرروسالية من اليسار إلى اليمين عبر الدورة، وتقلّب بصورة عامة كلما اتجهنا في المجموعة إلى أسفل.



وتعدّ عناصر المجموعتين 1 و 2 ذات الكهرروسالية المنخفضة عوامل محتزلة قوية، وعناصر المجموعة 17 والأكسجين في المجموعة 16 ذات الكهرروسالية العالية عوامل مؤكسدة قوية. وتتساوي كهرروسالية الهيدروجين 2.20 تقريباً، في حين تبلغ كهرروسالية النيتروجين 3.04 تقريباً. وبهدف دراسة تفاعلات الأكسدة والاختزال فإنه كلما زادت كهرروسالية الذرة، مثل النيتروجين في هذه الحالة، يُعامل كما لو احتزل باكتسابه الإلكترونات من الذرة الأخرى وهي الهيدروجين في هذه الحالة. وعلى العكس، فإنّ الذرة الأقل كهرروسالية وهي الهيدروجين قد تأكسدت بفقدانها الإلكترونات لصالح الذرة الأخرى وهي النيتروجين.

تزايد الكهرروسالية																	
1 2		13 14 15 16 17 18															
↑	Li	Be			O	F											
	Na	Mg					Cl										
	K	Ca					Br										
	Rb	Sr					I										
	Cs	Ba															

تزايد الكهرروسالية

عامل محتزلي

**الشكل 4-4** تزايد كهرروسالية العناصر من اليسار إلى اليمين عبر الجدول الدوري، وتقلّب في الاتجاه نحو أسفل عبر المجموعة الواحدة. وتعدّ العناصر ذات الكهرروسالية المنخفضة عوامل محتزلة قوية، والعناصر ذات الكهرروسالية المرتفعة عوامل مؤكسدة قوية.

**توقع** أي العناصر يمكن أن تكون أقوى بوصفها عوامل مؤكسدة، وأيها أقوى بوصفها عوامل محتزلة؟

**F : أقوى عامل مؤكسد.**

**Cs : أقوى عامل محتزلي**



## واقع الكيمياء في الحياة الأكسدة



**الصدأ** يتأكسد الحديد عندما يلامسه الهواء الطلق، مكوناً أكسيد الحديد III  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  ويسمى الصدا، والصدأ شائع جداً؛ لأن مركبات الحديد سريعة التفاعل مع الأكسجين، والحديد النقي غير شائع في الطبيعة. حالياً يستعمل الفولاذ وهو سبيكة يعدها الحديد المكون الأساسي لها. وهناك طرائق كثيرة يمكن اتباعها لحماية الحديد كالطلاء، والدهان، وإضافة المواد البلاستيكية لحماية منتجات الحديد من الأكسدة.

**تفاعلات الأكسدة والاختزال تمثل المعادلة الآتية تفاعل أكسدة واحتزال الألومنيوم والحديد.**



حدد المادة التي تأكسدت والمادة التي احتزلت في هذا التفاعل.


حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل.

### 1 تحليل المسألة


لقد أعطيتَ المتفاعلات والنواتج في التفاعل، لذا عليك تحديد انتقال الإلكترونات الحاصل، ثم يمكنك تطبيق تعريف العامل المؤكسد والعامل المختزل للإجابة عن السؤال.

### 2 حساب المطلوب

حدد عمليتي التأكسد والاختزال.



وأصبح أيون الألومنيوم.



فقدتها الألومنيوم.

لأن الألومنيوم تأكسد لذا فهو العامل المختزل، ولأن الحديد احتزى لذا فهو العامل المؤكسد.

### 3 تقويم الإجابة





تأكسد الألومنيوم في هذه العملية بفقدانه الإلكترونات، في حين احتزى الحديد واكتسب الإلكترونات، ومن ثم يتضح تعريف كل من الأكسدة والاختزال والعامل المؤكسد والعامل المختزل مع ما تقدم. لاحظ أن عدد تأكسد الأكسجين لم يتغير في هذا التفاعل؛ لذا لا يعده الأكسجين عاملًا مفتاحيًّا لحل المسألة.

#### مسائل تدريبية


1. حدد التغيرات، في كل مما يلي سواء أكانت أكسدة أم احتزلاً؟ وتذكر أن  $e^-$  هو رمز الإلكترون:





2. حدد العناصر التي تأكسدت والعناصر التي احتزلت في العمليات الآتية:



3. حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعل الآتي:



4. تحفيز حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعل الآتي:





**الإجابة في الصفحة التالية**







1. حدد التغيرات، في كل مما يلي سواء أكانت أكسدة أم اختزالاً؟ وتذكر أن  $e^-$  هو رمز الإلكترون:



## أكسدة


## اختزال




## اختزال

## أكسدة


2. حدد العناصر التي تأكسدت والعناصر التي اختزلت في العمليات الآتية:




**يتأكسد Br، في حين يُختزل Cl.**



**يتأكسد Ce<sup>2+</sup>، في حين يُختزل Cu<sup>2+</sup>.**



**يتأكسد Zn، في حين يُختزل O<sub>2</sub>.**



**يتأكسد Na، في حين يُختزل H<sup>+</sup>.**




3. حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعل الآتي:




يُعد  $\text{Ag}^{+}$  العامل المؤكسد، في حين يُعد  $\text{Fe}$  العامل المختزل.  
لذا، تختزل أيونات  $\text{Ag}^{+}$ ، وتتأكسد ذرات  $\text{Fe}$ .

4. تحفيز حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعل الآتي:



يُعد  $\text{I}_2$  العامل المؤكسد، في حين يُعد  $\text{Mg}$  العامل المختزل.



يُعد  $\text{Cl}_2$  العامل المؤكسد، في حين يُعد  $\text{H}_2\text{S}$  العامل المختزل.




## تحديد أعداد التأكسد Determining Oxidation Numbers

لنفهم جميع أنواع تفاعلات الأكسدة والاختزال لا بد من تعرف الطريقة التي يتم بها تحديد عدد التأكسد (n) لذرات العناصر الداخلة في التفاعل، ويلخص الجدول 2-3 القواعد التي يستعملها الكيميائيون لتسهيل عملية التحديد.

لاحظ أن الجدول لا يتضمن العناصر الانتقالية وأشباه الفلزات واللافلزات التي قد يكون لها أكثر من عدد تأكسد في المركبات المختلفة. فعلى سبيل المثال لل الحديد أعداد تأكسد مختلفة يُستدلُّ عليها من خلال الألوان الموضحة في الشكل 5-3.

الجدول 2-3 قواعد تحديد أعداد التأكسد للعناصر		
عدد التأكسد (n)	مثال	القاعدة
0	Na, O <sub>2</sub> , Cl <sub>2</sub> , H <sub>2</sub>	1. عدد تأكسد الذرة غير المتحدة يساوي صفرًا.
+2	Ca <sup>2+</sup>	2. عدد تأكسد الأيون الأحادي الذرة يساوي شحنة الأيون.
-1	Br <sup>-</sup>	
-3	NH <sub>3</sub> في N	3. عدد تأكسد الذرة الأكثر كهروسالبية في الجزيء أو الأيون المعقد هو الشحنة نفسها التي سيكون عليها كما لو كان أيوناً.
-2	NO في O	
-1	LiF في F	4. عدد تأكسد العنصر الأكثر كهروسالبية (الفلور) هو دائمًا -1 – عندما يرتبط بعنصر آخر.
-2	NO <sub>2</sub> في O	5. عدد تأكسد الأكسجين في المركب دائمًا يساوي 2 – ما عدا مركبات فوق الأكسيد كما في المركب فوق أكسيد الهيدروجين <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , حيث يساوي 1 – . وعندما يرتبط بالفلور عنصر الوحدة الذي له كهروسالبية أعلى من الأكسجين يكون عدد تأكسده موجباً.
-1	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> في O	
+2	OF <sub>2</sub> في O	
-1	NaH في H	6. عدد تأكسد الهيدروجين في معظم مركباته يساوي +1 – ما عدا الهيدريدات فيساوي 1
+1	K	
+2	Ca	7. عدد تأكسد فلزات المجموعتين الأولى والثانية والألومنيوم يساوي عدد إلكترونات المدار الخارجي.
+3	Al	
(+2) + 2(-1) = 0	CaBr <sub>2</sub>	8. مجموع أعداد التأكسد في المركبات المتعادلة يساوي صفرًا.
(+4) + 3(-2) = -2	SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	9. مجموع أعداد التأكسد للمجموعات الذرية يساوي شحنة المجموعة.



الشكل 5-3 صخر يوضح طبقات من الحديد ناتجة عن الاختلاف في حالة تأكسد الحديد.

تجربة  
عملية

ميل الفلزات إلى فقد الإلكترونات

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثرائية

## مثال 2-3

**تحديد أعداد التأكسد** استعمل قواعد تحديد أعداد التأكسد لحساب عدد التأكسد لكل عنصر في مركب كلورات البوتاسيوم  $KClO_3$  وفي أيون الكبريت  $SO_3^{2-}$ .

**1 تحليل المسألة**

أعطيت أعداد التأكسد في قواعد تحديد أعداد التأكسد لكل من الأكسجين والبوتاسيوم، وأعطيت الشحنة الكلية للأيون أو المركب. استخدم هذه المعلومات، وطبق القواعد، وحدد عدد التأكسد لكل من الكلور والكبريت (اجعل  $n$  عدد التأكسد للعنصر في السؤال).

المطلوب	المعطيات
$n_{Cl} = ?$	$KClO_3$
$n_S = ?$	$SO_3^{2-}$
	$n_O = -2$
	$n_K = +1$

**2 حساب المطلوب**

بيّن أعداد التأكسد لكل من العناصر المعروفة، واجعل مجموع أعداد التأكسد للعناصر في المركب أو الأيون مساوية للصفر أو لشحنة الأيون، ثم جد القيمة المجهولة من أعداد التأكسد.

$$(n_K) + (n_{Cl}) + 3(n_O) = 0$$

$$(+1) + (n_{Cl}) + 3(-2) = 0$$

$$1 + n_{Cl} + (-6) = 0$$

$$n_{Cl} = +5$$

$$(n_S) + 3(n_O) = -2$$

$$(n_S) + 3(-2) = -2$$

$$n_S + (-6) = -2$$

$$n_S = +4$$

مجموع أعداد التأكسد للمركب المتعادل هو صفر.

ولفلزات المجموعة الأولى يكون  $+1 = n$ .

$$\text{عُوض } 2 \quad n_K = +1, n_O = -2$$

جد قيمة  $n_{Cl}$ .

مجموع أعداد التأكسد للأيون المتعدد الذرات يساوي شحنة الأيون.

$$\text{عُوض } 2 \quad n_O = -2$$

جد قيمة  $n_S$ .

**3 تقويم الإجابة**


لقد طبقت قواعد حساب أعداد التأكسد تطبيقاً صحيحاً. فجميع أعداد التأكسد لكل عنصر أخذت القيمة الصحيحة لها.

**مسائل تدريبية**

5. حدد عدد التأكسد للعنصر المكتوب بلون داكن في الصيغ الجزيئية الآتية:






6. حدد عدد التأكسد للعنصر المكتوب بلون داكن في صيغ الأيونات الآتية:



7. حدد عدد التأكسد للنيتروجين في الجزيئات الآتية:



8. تحفيز حدد التغير الكلي في عدد تأكسد كل من العناصر في معادلات الأكسدة والاختزال الآتية:



.5. حَدَّدْ عدد التأكسد للعنصر المكتوب بلون داكن في الصيغ الجزيئية الآتية:






**+3**

**+5**

**+7**

.6. حَدَّدْ عدد التأكسد للعنصر المكتوب بلون داكن في صيغ الأيونات الآتية:




**+6**

**+5**

**-3**

.7. حَدَّدْ عدد التأكسد للنيتروجين في الجزيئات الآتية:




**-2**


**-3**

**-3**


.8. تحفيز حَدَّدْ التغير الكلي في عدد تأكسد كلٌّ من العناصر في معادلات الأكسدة والاختزال الآتية:



**-2، O؛ +4، C**



**Zn؛ لا تغيير، Cl؛ +1، I؛ -1**




**Cd؛ +2، O؛ -2، C؛ لا تغيير**




## أعداد التأكسد في تفاعلات الأكسدة والاختزال

### Oxidation Numbers in Redox Reactions

بعد أن درست أعداد التأكسد عليك أن تكون قادرًا على الربط بين تفاعلات الأكسدة والاختزال والتغير في عدد التأكسد. وبالرجوع إلى معادلة التفاعل الذي شاهدته في بداية الدرس وهو استبدال البروم بالكلور  $\text{Cl}_2$  في محلول بروميد البوتاسيوم  $\text{KBr}$ .



ابداً أو لاً بتحديد عدد التأكسد لجميع العناصر في المعادلة الموزونة مستخدماً الجدول 3-3، ثم راجع التغيرات كما هو موضح في المعادلة أدناه.



ستلاحظ أن عدد تأكسد البروم قد تغير من 1- إلى صفر، بزيادة مقدارها 1. وقد تغير في الوقت نفسه عدد تأكسد الكلور من صفر إلى 1-؛ أي قل بمقدار 1؛ لذا اختزل الكلور وتأكسد البروم.

عندما تأكسد الذرة يزيد عدد التأكسد، وعندما تختزل يقل عدد التأكسد. لاحظ أنه ليس هناك تغير في عدد تأكسد البوتاسيوم؛ لأن أيون البوتاسيوم لا يشترك في التفاعل؛ لذا يُعدّ أيوناً متفرجاً.

الجدول 3-3 أعداد التأكسد لبعض العناصر

عدد التأكسد	-2	-1	+3	+2	+1	
الألومنيوم			x			
الباريوم				x		
البروم	x					
الكاديوم			x			
الكالسيوم			x			
السيزيوم				x		
الكلور	x					
الفلور	x					
المييدروجين	x			x		
اليود	x					
الليثيوم				x		
الماغنيسيوم			x			
الأكسجين	x					
البوتاسيوم			x			
الصوديوم			x			
الفضة			x			
الإسترانشيوم			x			

## التقويم 3-1

### الخلاصة

تتضمن تفاعلات الأكسدة والاختزال انتقال إلكترونات من ذرة إلى أخرى.

عندما تختزل ذرة أو أيون يقل عدد تأكسدها، وعندما تأكسد ذرة أو أيون يزداد عدد تأكسدها.


في تفاعلات الأكسدة والاختزال التي تتضمن مركبات جزيئية وأيونات متعددة الذرات بروابط تساهمية، فالذرات الأعلى كهروتسالبية تختزل، في حين تأكسد الذرات ذات الكهروتسالبية الأقل.

9. الفكرة **» الرئيسة** فسر لماذا يجب أن يحدث تفاعلاً للأكسدة والاختزال دائمًا معاً؟

10. صف دور كل من العوامل المؤكسدة والمختزلة في تفاعلات الأكسدة والاختزال. وكيف يتغير كل منها في التفاعل؟

11. اكتب معادلة تفاعل فلز الحديد مع حمض الهيدروبروميك لتكون بروميد الحديد III وغاز الهيدروجين. ثم حدد التغير الكلي في عدد تأكسد العنصر الذي اختزل والعنصر الذي تأكسد.

12. حدد عدد التأكسد للعنصر الذي يظهر باللون الداكن في المركبات الآتية:



13. حدد عدد التأكسد للعنصر الذي يظهر باللون الداكن في الأيونات الآتية:



14. الرسم البياني واستعماله تعدد الفلزات القلوية عوامل مختزلة قوية. ارسم رسمًا بيانيًا توضح فيه كيف تزداد أو تقل قابلية الفلزات القلوية للاختزال كلما اتجهنا أسفل المجموعة ابتداءً من الصوديوم حتى الغوانسيوم:



الفكرة ► الرئيسية . 9.


فَسِّرْ لِمَاذَا يُجَبُ أَنْ يَحْدُثْ تِفَاعِلًا الْأَكْسَدَةِ وَالْأَخْتِرَالَ دَائِمًا مَعًا؟

**إذا فقدت ذرة إلكتروناً فلا بد من وجود مادة أخرى تكتسب  
الإلكترون المفقود.**

10. صُفْ دور كلٍّ مِنَ العوامِلِ المؤكسدةِ والمختزلةِ في تفاعلاتِ الأكسدةِ والاختزالِ. وكيف يتغير كلٌّ منها في التفاعل؟

**يؤدي العامل المؤكسد إلى تأكسد عامل آخر، وذلك بانتزاع  
الإلكترونات منه، أما العامل المختزل فيختزل المادة  
الأخرى بمنحها إلكترونات.**

11. اكتب معادلة تفاعل فلز الحديد مع حمض الهيدروبروميك لتكون بروميد الحديد III وغاز الهيدروجين. ثم حدد التغير الكلي في عدد تأكسد العنصر الذي اختزل والعنصر الذي تأكسد.



**يتأكسد Fe، ويختزل H.**




12. حدد عدد التأكسد للعنصر الذي يظهر باللون الداكن في المركبات الآتية:

$\text{CuWO}_4$ .d	$\text{Sb}_2\text{O}_5$ .c	$\text{CaN}_2$ .b	$\text{HNO}_3$ .a
+6	+5	-3	+5

13. حدد عدد التأكسد للعنصر الذي يظهر باللون الداكن في الأيونات الآتية:

$\text{NH}_2^-$ .d	$\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$ .c	$\text{MnO}_4^-$ .b	$\text{IO}_4^-$ .a
-3	+3	+7	+7

14. الرسم البياني واستعماله تعد الفلزات القلوية عوامل مختزلة قوية. ارسم رسمًا بيانيًّا توضح فيه كيف تزداد أو تقل قابلية الفلزات القلوية للاختزال كلما اتجهنا أسفل المجموعة ابتداءً من الصوديوم حتى الفراسيوم.



بصورة عامة، عندما تتجه من أعلى إلى أسفل في الجدول الدوري ضمن المجموعة الواحدة، يزداد الميل نحو فقد الإلكترونات، وبذلك تزداد قابلية الاختزال.

## 3-2

### الأهداف

- تربط التغير في عدد التأكسد بانتقال الإلكترونات.
- تستعمل التغير في عدد التأكسد لوزن معادلات الأكسدة والاختزال.
- تزن معادلة الأكسدة والاختزال الأيونية الكلية مستعملاً طريقة نصف التفاعل.

### مراجعة المفردات

**المعادلة الأيونية الكلية:**  
معادلة أيونية تتضمن الجسيمات المشاركة في التفاعل فقط.

### المفردات الجديدة

طريقة عدد التأكسد  
نصف التفاعل

**الشكل 3-6 من الصعب**  
أحياناً وزن بعض المعادلات  
الكيميائية كما في تفاعلات  
الأكسدة والاختزال بين النحاس  
وحمض النيتريك؛ لأن العناصر  
تظهر أكثر من مرة في كل جهة  
من المعادلة.




## وزن معادلات الأكسدة والاختزال Balancing Redox Reactions

**الفكرة الرئيسية** تصبح معادلات الأكسدة والاختزال موزونةً عندما تكون الزيادة الكلية في أعداد التأكسد متساويةً للانخفاض الكلي في أعداد التأكسد للذرات الداخلة في التفاعل.

**الربط مع الحياة** عندما تفسد المواد الدهنية في الأطعمة، يقال إنها أصبحت حمضية؛ إذ تتكسر الجزيئات الكبيرة خلال تفاعلات الأكسدة والاختزال متنجة رائحة كريهة. وتعد المعادلة الخاصة بهذه العملية معقدة جدًا، ولكننا نستطيع وزنها باستعمال القواعد نفسها التي استعملناها في وزن المعادلات الأبسط.

### The Oxidation–Number Method

يجب وزن المعادلات الكيميائية لتوضيح الكميات الصحيحة للمتفاعلات والنواتج. لذا ادرس المعادلات غير الموزونة الآتية للتفاعل الذي يحدث عندما يوضع النحاس في محلول مركز من حمض النيتريك، كما في الشكل 6-3. يتبع غاز  $\text{NO}_2$  اللون هو ثاني أكسيد النيتروجين  $\text{NO}_2$  من اختزال أيونات النيترات  $\text{NO}_3^-$ . أما محلول الأزرق فيتيح عن تأكسد النحاس Cu إلى أيون النحاس  $\text{Cu}^{2+}$  (II).



لاحظ أن الأكسجين يظهر فقط في مادة متفاعلة واحدة هي  $\text{HNO}_3$ ، ولكنه يظهر في النواتج الثلاثة جميعها، أما النيتروجين فيظهر في  $\text{HNO}_3$  وفي اثنين من النواتج. مثل معادلة الأكسدة والاختزال هذه التي يظهر فيها العنصر نفسه في عدة مواد متفاعلة وناتجة يصعب وزنها. وكما تعلم، فعندما تفقد الذرة الإلكترونات يزداد عدد تأكسدها، وعندما تكتسب الذرة الإلكترونات يقل عدد تأكسدها. ويجب أن يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة عدد الإلكترونات المفقودة. ولذا يجب أن يكون مجموع الزيادة في عدد التأكسد متساوياً لمجموع الانخفاض في أعداد التأكسد للذرات المشتركة في التفاعل. وتسمى مثل هذه الطريقة طريقة عدد التأكسد، وتعتمد على المبادئ في الجدول 4-3.

### الجدول 3-4 طريقة عدد التأكسد

حدّد أعداد التأكسد لجميع الذرات في المعادلة.
حدّد الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت.
حدّد التغير في عدد التأكسد للذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت.
اجعل التغير في أعداد التأكسد متساوياً في القيمة؛ وذلك بضبط المعاملات في المعادلة.
استعمل الطريقة التقليدية في وزن المعادلة الكيميائية الكلية، إذا كان ذلك ضرورياً.

طريقة عدد التأكسد زن معادلة الأكسدة والاختزال الآتية:  $\text{Cu}_{(s)} + \text{HNO}_3_{(aq)} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_{2(aq)} + \text{NO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$

### ١ تحليل المسألة


استخدم قواعد تحديد عدد التأكسد، ويجب أن تتساوى زيادة عدد التأكسد للذرات المتأكسدة مع نقصان عدد التأكسد للذرات المختزلة.

ثم اضبط المعاملات لوزن المعادلة.

### ٢ حساب المطلوب

حدد أعداد التأكسد للذرات كلها في المعادلة:

يزداد عدد التأكسد للنحاس من صفر إلى +2.



ويقل عدد التأكسد للنيتروجين من +5 إلى +4.

حدد أعداد التأكسد للذرات كلها في المعادلة:

Cu تأكسد N اختزلت O لم تتغير H لم تتغير NO<sub>3</sub><sup>-</sup> لم تتغير في أيون النترات

حدد التغيرات في عدد التأكسد لجميع الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت.

تأكسد النحاس: لأنه خسر إلكترونات التغيير في عدد تأكسد Cu = +2

التغيير في عدد تأكسد N = -1 اختزل النيتروجين: لأنه اكتسب إلكترونًا

اجعل التغيير في أعداد التأكسد متساوياً في القيمة؛ وذلك بضبط المعاملات في المعادلة:

لما كان التغيير في عدد التأكسد N هو 1 -، فإنه يجب إضافة المعامل 2

إلى الوزن. وهذا المعامل ينطبق على كل من HNO<sub>3</sub> و NO<sub>2</sub>.

استعمل الطريقة التقليدية في وزن بقية المعادلة:

يجب زيادة معامل HNO<sub>3</sub> من 2 إلى 4 موازنة 4 ذرات نيتروجين في النواتج.

Cu<sub>(s)</sub> + 4HNO<sub>3(aq)</sub> → Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2(aq)</sub> + 2NO<sub>2(g)</sub> + H<sub>2</sub>O<sub>(l)</sub>

أُضيف المعامل 2 إلى H<sub>2</sub>O موازنة 4 ذرات هيدروجين في الجهة اليسرى.





Cu<sub>(s)</sub> + 4HNO<sub>3(aq)</sub> → Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2(aq)</sub> + 2NO<sub>2(g)</sub> + 2H<sub>2</sub>O<sub>(l)</sub>

### ٣ تقويم الإجابة


عدد ذرات كل عنصر متساوية على جانبي المعادلة.

#### مسائل تدريبية



استعمل طريقة عدد التأكسد في وزن معادلات الأكسدة والاختزال الآتية






استعمل طريقة عدد التأكسد في وزن معادلات الأكسدة والاختزال الآتية:






يزداد عدد التأكسد للكلور Cl من 1- إلى 1+، في حين يقلّ عدد التأكسد للنيتروجين N من 5+ إلى 2.



يزداد عدد التأكسد للحديد Fe من 0 إلى 3+، في حين يقلّ عدد التأكسد للقصدير Sn من 4+ إلى 2+.



يزداد عدد التأكسد النيتروجين N من 3 - إلى 0، في حين يقلّ عدد التأكسد النيتروجين N من 4 + إلى 0.



يزداد عدد التأكسد للكبريت S من 4 + إلى 6 +، في حين يقلّ عدد التأكسد للبروم Br من 0 إلى -1 -.



## مختبر تحليل البيانات

\* مبنية على بيانات واقعية

### حل واستئناف

كيف تعمل تفاعلات الأكسدة والاختزال على إطلاق المكوك الفضائي؟ يكتسب المكوك الفضائي 72% تقريباً من قوة اندفاعه من صواريخ الإطلاق التي تستعمل الوقود الصلب خلال الدقيقتين الأوليين من عملية إطلاق الصاروخ، ويرتبط صاروخان على هيئة قلم الرصاص معاً من كلا الجانبين بخزان الهيدروجين السائل ووقود الأكسجين. ويحتوي كل صاروخ على 499,000 kg تقريباً من مزيع الدفع.

### البيانات والملاحظات


مزيع الدفع في صواريخ الاستاد	
النسبة المئوية	المكونات
69.6	فوق كلورات الأمونيوم
16	الألومينيوم
0.4	المادة المحفزة
12.04	الأسمنت
1.96	معامل المعالجة

أخذت هذه البيانات من:

\*Dumoulin, Jim. "Solid Rocket Boosters." NSTSShuttle Reference Manual. 1988

### التفكير الناقد

1. زن استعمال طريقة عدد التأكسد في وزن المعادلة الكيميائية لتفاعل صاروخ الإسناد.




2. حدد أي العناصر تأكسدت، وأيها اختزلت؟

3. استدل ما مزايا استعمال تفاعل وقود الصواريخ الصلب (solid rocket boosters) SRB في الدقيقتين الأوليين من الإطلاق؟


4. احسب ما عدد مولات بخار الماء الناتجة عن تفاعل واحد من SRB؟

## وزن معادلات الأكسدة والاختزال الأيونية الكلية Balancing Net Ionic Redox Equations



يفضل الكيميائيون في بعض الأحيان التعبير عن تفاعلات الأكسدة والاختزال بأبسط ما يمكن، كما في المعادلات التي توضح عمليات الأكسدة والاختزال فقط. وبالرجوع مجدداً إلى المعادلة الموزونة لتفاعل تأكسد النحاس في محلول حمض النيتريك:



نلاحظ أن التفاعل يحدث في محلول مائي؛ لذا فإن  $\text{HNO}_3$ ، وهو حمض قوي سوف يتآكل كلياً، كما أن نترات النحاس  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$  ستتفكك إلى أيونات؛ لذا يمكن كتابة المعادلة على النحو الآتي:



توجد أربعة أيونات من النترات في طرف المواد المتفاعلة؛ اثنان منها فقط قد تغيرا إلى ثانوي أكسيد النيتروجين، وبقي الأيونان الآخران متفرجين، بحيث يمكن حذفهما من المعادلة. ولتبسيط الأمور، يكتب الكيميائيون أيونات الهيدروجين في صورة  $\text{H}^{+}_{(aq)}$  مع الاتفاق على وجودها في صورة  $\text{H}_3\text{O}^{+}_{(aq)}$ . والآن يمكن كتابة المعادلة ليبيان المواد المشتركة في التفاعل على النحو الآتي:



(في وسط حمضي)  $\text{Cu}_{(s)} + \text{NO}_3^{-}_{(aq)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + \text{NO}_{2(g)}$



وفي هذه الحالة، تُحذف أيونات الهيدروجين وجزيئات الماء لأن أيّاً منها لم يحدث لها أكسدة أو اختزال. وتوجد في محلول أيونات الهيدروجين  $\text{H}^{+}$  وجزيئات الماء بوفرة وتستطيع المشاركة في تفاعل الأكسدة والاختزال سواء في صورة متفاعلات أو نواتج. وتحدث بعض تفاعلات الأكسدة والاختزال فقط في المحاليل القاعدية، وعند وزن معادلات هذه التفاعلات يمكن إضافة أيونات الهيدروكسيد  $\text{OH}^{-}$  وجزيئات الماء إلى طرفي المعادلة.

الإجابة في الصفحة التالية

1. زن استعمل طريقة عدد التأكسد في وزن المعادلة



الكيميائية لتفاعل صاروخ الإسناد.



2. حدد أي العناصر تأكسدت، وأيها اختزلت؟

يتأكسد النيتروجين والألومنيوم، ويختزل الكلور.


3. استدل ما مزايا استعمال تفاعل وقود الصواريخ الصلب (SRB) في solid rocket boosters (SRB) الدقيقتين الأوليين من الإطلاق؟

لذا يمكن أن يوضع بكميات كبيرة في خزانات أكبر مما لو كان في حالة أخرى كالسائلة مثلاً. وبعد أن يُحرق المقدار الضخم من الوقود يتم التخلص من خزاناته الثقيلة، لذا تصبح المركبة أخف.

4. احسب ما عدد مولات بخار الماء الناتجة عن تفاعل واحد من (SRB)؟

$$4.16 \times 10^6 \text{ mol H}_2\text{O}$$

**وزن معادلة الأكسدة والاختزال الأيونية الكلية زن معادلة الأكسدة والاختزال الآتية:**




### ١ تحليل المسألة

استعمل قواعد تحديد عدد التأكسد. يجب أن تتساوى الزيادة في عدد التأكسد للذرات التي تأكسدت مع النقصان في عدد التأكسد للذرات التي اخترلت. يحدث التفاعل في وسط حمضي، اضبط معاملات لوزن التفاعل.

### ٢ حساب المطلوب

حدد أعداد التأكسد لجميع الذرات في المعادلة.



استعمل القواعد في الجدول 2-3

حدد الذرات التي اخترلت والذرات التي تأكسدت.

ازداد عدد تأكسد البروم من 1- إلى الصفر


نقص عدد تأكسد الكلور من 7+ إلى 1-.

حدد التغير في عدد التأكسد للذرات التي تأكسدت والذرات التي اخترلت. التغير في عدد التأكسد:

ازداد عدد تأكسد البروم من 1- إلى الصفر

نقص عدد تأكسد الكلور من 7+ إلى 1-.

اجعل التغير في قيم عدد التأكسد متساوياً، وذلك بضبط معاملات المعادلة:




بما أن التغير في عدد التأكسد لـ  $\text{Br}$  هو 1+: لذا يجب أن تضيق المعامل


8 لوزن المعادلة الكيميائية.  $4\text{Br}_2$  تمثل 8 ذرات  $\text{Br}$  لوزن 8- في

الجانب الأيسر.

أضف عدداً كافياً من أيونات الهيدروجين وجزيئات الماء إلى المعادلة؛ لوزن ذرات الأكسجين على طرف المعادلة:



بما أنك تعرف أن التفاعل يتم في وسط حمضي، يمكنك





إضافة أيونات الهيدروجين  $\text{H}^+$  إلى طرف المعادلة.

### ٣ تقويم الإجابة



عدد ذرات كل عنصر متساويان في كلا طرفي المعادلة. وكما في المعادلة الأيونية فإن الشحنة الكلية في الطرف الأيمن تساوي الشحنة الكلية في الطرف الأيسر.

#### مسائل تدريبية



استعمل طريقة عدد التأكسد في وزن المعادلات الأيونية الكلية الآتية:






استعمل طريقة عدد التأكسد في وزن المعادلات الأيونية الكلية الآتية:





يزداد عدد التأكسد للكبريت S من 2- إلى 0، في حين يقل عدد التأكسد للنيتروجين N من 5+ إلى 2.



يزداد عدد التأكسد لليود I من 1- إلى 0، في حين يقل عدد التأكسد للكروم Cr من 6+ إلى 3.



يزداد عدد التأكسد للخارصين Zn من 0 إلى 2+، في حين يقلّ عدد التأكسد للنيتروجين N من 5+ إلى 4.



يزداد عدد التأكسد لليود I من 1- إلى 0، في حين يقلّ عدد التأكسد للمنجنيز Mn من 7+ إلى 4.



**الشكل 3-7** تُصدر بعض الكائنات الحية ضوءاً لأهداف مختلفة: لجذب الإناث، أو للدفاع عن الصغار. ويساعد الضوء المنبعث على الرؤية والتمييز والإدراك.


**الربط** علم الأحياء فيم تشتراك أسماك أعماق المحيط والذباب الناري مع البكتيريا المضيئة؟ إن هذه الأنواع من الكائنات -وكائنات أخرى- تطلق الضوء. والضوء المنبعث ما هو إلا تحويل لطاقة الوضع في الروابط الكيميائية إلى طاقة ضوئية خلال تفاعلات الأكسدة والاختزال. وينبعث الضوء بوسائل مختلفة اعتماداً على أنواع الكائنات. ففي الذباب الناري الموضح في الشكل 7-3، يتجزأ الضوء عن تأكسد جزيئات اللوسيفيرن Luciferin. ولا يزال العلماء يكتشفون سر الإضاءة الحيوية؛ في بعض الكائنات المضيئة تطلق الضوء باستمرار، في حين تطلق الكائنات الأخرى ضوءاً عندما تتعرض للمضايقة. ويبعد أن بعض أسماك أعماق البحار وقناديل البحر لها قدرة على التحكم في الضوء الذي تطلقه.

### وزن معادلة الأكسدة والاختزال باستعمال طريقة نصف التفاعل Balancing Redox Reactions Using Half-Reactions



المواد في الكيمياء هي أيّ جسيمات توجد في المعادلة؛ حيث يوجد في معادلة الاتزان الآتية:



أربعة أنواع من المواد، كتالي جزيئان وهما  $\text{H}_2\text{O}$  و  $\text{NH}_3$ ، وأيونان هما  $\text{NH}_4^+$  و  $\text{OH}^-$  وتحدث تفاعلات الأكسدة والاختزال عندما توجد مواد قادرة على منح الإلكترونات (عوامل مختزلة) لمواد أخرى قريبة منها، ولها قدرة على كسب هذه الإلكترونات (عوامل مؤكسدة). فعلى سبيل المثال يمكن للحديد أن يختزل أنواعاً عدداً من العوامل المؤكسدة، بما فيها الكلور.




وفي هذا التفاعل تأكسد كل ذرة حديد بفقدانها 3 إلكترونات لتصبح أيون  $\text{Fe}^{3+}$ . وفي الوقت نفسه، فإن كل ذرة كلور في  $\text{Cl}_2$  تختزل باكتسابها إلكتروناً واحداً لتصبح أيون  $\text{Cl}^-$ .



تمثل هذه المعادلات أنصاف تفاعلات؛ حيث يُمثل كل نصف تفاعل أحد جزأيه تفاعل الأكسدة والاختزال؛ أي تفاعل الأكسدة أو تفاعل الاختزال. ويبين الجدول 5-3 التنوع في أنصاف تفاعلات الاختزال التي تتضمن تأكسد  $\text{Fe}^{3+}$ .


### الجدول 5-3 تفاعلات الأكسدة والاختزال التي يحدث فيها تأكسد الحديد

نصف تفاعل الاختزال	نصف تفاعل التأكسد	التفاعل الكلي (غير الموزون)
$\text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{O}^{2-}$		$\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$
$\text{F}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{F}^-$		$\text{Fe} + \text{F}_2 \rightarrow \text{FeF}_3$
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\text{Fe} + \text{HBr} \rightarrow \text{H}_2 + \text{FeBr}_3$
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$		$\text{Fe} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Ag} + \text{Fe}(\text{NO}_3)_3$
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$		$\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Cu} + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$



**الشكل 3-8** يترسب النحاس على الحديد نتيجة لتفاعل الأكسدة والاختزال بين الحديد ومحلول كبريتات النحاس، ويمكنك وزن المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل بطريقة نصف التفاعل.

سوف تتعلم المزيد عن أهمية أنصاف التفاعلات عند دراستك الكيمياء الكهربائية لاحقاً، ولكن في الوقت الحالي سوف تتعلم كيف تستعمل أنصاف التفاعل لوزن معادلة الأكسدة. فعلى سبيل المثال، تمثل المعادلة غير الموزونة الآتية التفاعل الذي يحدث عند وضع صفيحة من الحديد في محلول كبريتات النحاس II، كما في الشكل 3-8.



تتأكسد ذرات الحديد عندما تفقد الإلكترونات لأيونات النحاس II. أما خطوات وزن معادلات الأكسدة والاختزال باستخدام طريقة نصف التفاعل فهي موضحة في الجدول 6-3.

#### المطويات

ضمّن مطويتك معلومات من هذا القسم.

#### المفردات



##### المفردات الأكاديمية

##### الطريقة (Method)



آلية لعمل شيء ما. يستعد الطلبة لامتحان بطرائق مختلفة.

#### الجدول 6-3 طريقة نصف التفاعل



1. اكتب المعادلة الأيونية الكلية للتفاعل، مهملأً الأيونات المترجة.





2. اكتب نصفي تفاعل الأكسدة والاختزال للمعادلة الأيونية الكلية.





3. زن الذرات والشحنات في كل نصف تفاعل.



4. زن المعادلات على أن يكون عدد الإلكترونات المفقودة في التأكسد يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة في الاختزال.




5. اجمع نصفي التفاعل الموزونين، وأعد الأيونات المترجة.



**وزن معادلة الأكسدة والاختزال باستعمال طريقة نصف التفاعل**

**زن معادلة التأكسد والاختزال للتفاعل الآتي مستعملاً طريقة نصف التفاعل:**



### ١ تحليل المسألة

يحدث التفاعل في الوسط الحمضي، استعمل قواعد تحديد أعداد التأكسد وخطوات وزن المعادلة بطريقة نصف التفاعل لوزن معادلة التفاعل بين برمجيات البوتاسيوم وثاني أكسيد الكبريت.


### ٢ حساب المطلوب

اكتب المعادلة الأيونية الكلية للتفاعل.


احذف المعاملات، والأيونات المترجة.

اكتب معادلة نصفي تفاعل الأكسدة والاختزال للمعادلة الأيونية الكلية، متضمنة أعداد التأكسد.


استخدم القواعد الواردة في الجدولين 3-6 و 3-7.



زن الذرات والشحنات في نصفي التفاعل.




تتوافر جزيئات  $\text{H}_2\text{O}$  في الوسط الحمضي بكثرة، ويمكن




استخدامها في وزن ذرات الأكسجين في أنصاف التفاعل؛ وكذلك

تتوافر أيونات  $\text{H}^+$  بسهولة، ويمكن أن تستخدم في وزن الشحنة.

اضبط المعاملات على أن يكون عدد الإلكترونات المفقودة في التأكسد (2) يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة في الاختزال (5).





المضاعف المشترك الأصغر 5 هو 10. وبالضرب التبادلي




ستحصل على وزن لنصفي تفاعل التأكسد والاختزال.

اجمع نصفي التفاعل اللذين تم وزنهما، وبسط المعادلة بحذف أو تجميع المواد المشابهة في طرفي المعادلة.



أعد وضع الأيونات المترجة ( $\text{K}^+$ )، وكذلك حالات المواد.



أضف أيونات  $\text{K}^+$  إلى أيونات  $\text{MnO}_{4^-}$  في الجهة اليسرى، وأحد أيونات  $\text{SO}_{4^{2-}}$




إلى الجهة اليمنى. ثم وزع الأيونات المتبقية بين أيون  $\text{H}^+$  وأيونات  $\text{Mn}^{2+}$ .

### ٣ تقويم الإجابة

تشير مراجعة المعادلة الموزونة إلى أن عدد ذرات كل عنصر هو نفسه في طرفي المعادلة.

#### مسائل تدريبية




استعمل طريقة نصف التفاعل لوزن معادلات الأكسدة والاختزال الآتية:






**الإجابة في الصفحة التالية**





استعمل طريقة نصف التفاعل لوزن معادلات الأكسدة والاختزال الآتية:



اضرب نصف تفاعل الأكسدة في 3، ثم اجمعه مع نصف تفاعل الاختزال:




a. اكتب نصفي تفاعل الأكسدة والاختزال ثم زنهما:




b. اضرب نصف تفاعل الأكسدة في 2، واضرب نصف تفاعل الاختزال في 5، لجعل عدد الإلكترونات متساوٍ في نصفي التفاعل:




c. اجمع نصفي التفاعل بعد حذف المتشابهات:





d. بعد الاختصار نحصل على المعادلة الموزونة الآتية:



25. تحفيز (في الوسط القاعدي)  $\text{N}_2\text{O}_{(\text{g})} + \text{ClO}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{NO}_2^-_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$




اضرب نصف تفاعل الاختزال في 2، ثم اجمعه مع نصف تفاعل الأكسدة:



## استراتيجية حل المسألة


### وزن معادلات الأكسدة والاختزال

حدد المواد التي تأكسدت والمواد التي اختزلت، وأيتها تعد عوامل مؤكسدة، وأيها تعد عوامل مختزلة؟



### طبق الاستراتيجية

زن المعادلة الآتية مستعملًا المخطط



## التقويم 3-2

### الخلاصة

- يصعب وزن معظم معادلات الأكسدة والاختزال باستعمال الطريقة التقليدية.
- تعتمد طريقة عدد التأكسد على مساواة عدد الإلكترونات المفقودة من الذرات بعدد الإلكترونات المكتسبة من قبل ذرات أخرى.
- لوزن معادلات التفاعلات في الوسط الحمضي، أضف عدداً كافياً من أيونات الهيدروجين وجزيئات الماء.
- أضف عدداً كافياً من أيونات الهيدروكسيد وجزيئات الماء، لوزن معادلات التفاعلات في الوسط القاعدي.
- نصف التفاعل هو أحد جزأي تفاعل الأكسدة والاختزال.


26. الفكرة الرسالة فسر كيف يرتبط التغير في عدد التأكسد بعمليات الأكسدة والاختزال؟

27. صُف لماذا يُعدّ من المهم معرفة الظروف التي يتم فيها تفاعل الأكسدة والاختزال في محلول المائي بهدف وزن معادلة التفاعل؟

28. فَسِّر خطوات طريقة عدد التأكسد لوزن المعادلة.




29. حَدَّد ماذا يوضح نصف تفاعل التأكسد؟ وماذا يوضح نصف تفاعل الاختزال؟

30. اكتب نصف تفاعل الأكسدة ونصف تفاعل الاختزال لتفاعل الأكسدة والاختزال الآتي:



31. حَدَّد إذا كان نصف تفاعل الأكسدة هو  $Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+} + 2e^-$  ونصف تفاعل الاختزال هو  $Au \rightarrow Au^{3+} + 3e^-$ ، فما أقل عدده من أيونات القصدير II وأيونات الذهب III يمكن أن تتفاعل حتى لا يتبقى إلكترونات؟

32. طبق زن المعادلات الآتية:





26. **الفكرة الرئيسة** فَسِّرْ كيف يرتبط التغير في عدد التأكسد بعمليات الأكسدة والاختزال؟

عندما يحدث انتقال للإلكترونات من ذرة إلى أخرى خلال تفاعلات الأكسدة والاختزال يحدث تغيير في الشحنة الكلية لهذه الذرات؛ وذلك لأن النواة، وبخاصة عدد البروتونات فيها، لا تتغير خلال هذا النوع من التفاعلات أبداً.

27. صُفْ لِمَا يُعَدُّ مِنَ الْمَهْمَ مَعْرِفَة الظروُف التي يتم فيها تفاعل الأكسدة والاختزال في المحلول المائي بهدف وزن معادلة التفاعل؟  
من المهم معرفة وجود  $H^+$  و  $OH^-$  لوزن المعادلة.

#### طريقة عدد التأكسد

#### الجدول 4-6

حدّد أعداد التأكسد لجميع الذرات في المعادلة.

حدّد الذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت.

حدّد التغيير في عدد التأكسد للذرات التي تأكسدت والذرات التي اختزلت.

اجعل التغيير في أعداد التأكسد متساوياً في القيمة، وذلك بضبط المعاملات في المعادلة.

استعمل الطريقة التقليدية في وزن المعادلة الكيميائية الكلية، إذا كان ذلك ضرورياً.



• 29. حدد ماذا يوضح نصف تفاعل التأكسد؟ وماذا يوضح نصف تفاعل الاختزال؟


**يوضح نصف تفاعل الأكسدة مقدار عدد الإلكترونات التي يفقدها العنصر والتي تسبب ازدياد عدد تأكسده. في حين يوضح نصف تفاعل الاختزال عدد الإلكترونات المكتسبة والتي تسبب نقصان عدد تأكسده.**

30. اكتب نصف تفاعل الأكسدة ونصف تفاعل الاختزال لتفاعل الأكسدة



31. حدد إذا كان نصف تفاعل الأكسدة هو  $\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^-$






ونصف تفاعل الاختزال هو  $\text{Au}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Au}$ ، فما أقل عدده من أيونات القصدير II وأيونات الذهب III يمكن أن تتفاعل حتى لا يتبقى إلكترونات؟





3 أيونات  $\text{Sn}^{2+}$ ، وأيونان  $\text{Au}^{3+}$ .




32. طبق زن المعادلات الآتية:



.c. (في الوسط الحمضي)





شكل 2 يمكن مقارنة مظهر اللومينول من مسرح الجريمة ب بصمات يد المتهم.

**الأدلة المتوجهة Glowing evidence** يمكن أن تكشف بقع الدم عن أ направ المكان، معطية دلائل حول نوعية السلاح المستخدم في إتمام الجريمة. إذ يمكن أن يُرسِّد وهج اللومينول على السجاد المحققين حول بقع الدم. كما قد تدل البصمات الدموية في الشكل 2 على المجرم.

وهناك آخرون يستخدمون اللومينول غير المحققين؛ ففي حوادث السيارات، يمكن أن يكشف اللومينول ما إذا كان المهاجم مرتدًا حزام الأمان أم لا، حتى لو صدمت السيارة في أثناء المطر، أو البرد، أو كانت متعرضة لأشعة الشمس المباشرة التي قد تغير بقع الدم.

**رذاذ الخل الأخير Spray of last resort** هناك مواد أخرى تحتوي على الحديد، بالإضافة إلى الدم، وتجعل اللومينول يتوجه، ويمكن للخبراء فقط معرفة الاختلافات. والأكثر أهمية أن اللومينول يمكن أن يتداخل مع اختبارات أخرى؛ وهذا السبب لا يلجلأ رجال التحقيق إلى استخدام اللومينول حتى يكملوا جميع اختباراتهم الأخرى.

## في الميدان


**المهنة : محقق البحث الجنائي**

### الدم المضيء Blood That Glows

في الطب الشرعي الحديث يمكن استخدام مادة كيميائية تسمى "اللومينول"؛ حيث تتيح للمحققين القدرة على رؤية الآثار.

**الأثر الأزرق المخضر Blue-green whisper** يتأكد اللومينول عندما يلامس الحديد، كما في الشكل 1 . وتنتج في هذه العملية جزيئات الطاقة في صورة ضوء أزرق مخضر واضح، ويظهر الوهج الباهت الأزرق للومينول في الغرفة المظلمة للمحققين عند وجود آثار الدماء غير الظاهرة، وهي ما لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. حيث تكون خلايا الدم بشكل أساسي من الهيموجلوبين، وهو بروتين يحتوي على حديد.

ولاستخدام اللومينول، يلجأ المحققون إلى مزج مسحوق أبيض  $C_8H_7N_3O_2$  بفوق أكسيد الهيدروجين  $H_2O_2$  وكيموبيات أخرى؛ مما يجعل من المزيج سائلاً يمكن أن يُنشر في المنطقة التي يتوقع أن تحتوي على كمية ضئيلة من الآثار يجعلها تتوهج. يقوم المصور الفوتوغرافي للطب الشرعي بالتقاط صور فوتوغرافية سريعة بكاميرات خاصة يمكنها التقاط كل من الوجه الخافت للومينول والمنطقة المضيئة من حولها.



شكل 1 يتأكد اللومينول في الكأس عند إضافة مسمار من الحديد.

### الكيمياء

الكتابة في

صحيفة الأخبار اكتب مقالة لصحيفة الأخبار تصف فيها كيف يقود اللومينول المحققين إلى الاشتباه بال مجرمين. صنف نوع الإثبات المستخدم في التحقيق.

# مختبر الكيمياء

## تعرف شاحنة متهاكلة (قديمة)

الملاحظات				
محلول مجهول	ZnSO <sub>4</sub>	HCl	AgNO <sub>3</sub>	
				Cu
				Pb
				Fe
				Mg

10. كرر الخطوة 8 بإضافة محلول كبريتات الباردصين  $\text{ZnSO}_4$  إلى العمود الثالث.

11. كرر الخطوة 8، بإضافة محلول المجهول إلى العمود الرابع.

12. اسْمِح باستمرار التفاعلات مدة خمس دقائق، ثم صفها، واتَّبِع "لَا تفاعل" لأي حجرة لم يكن هناك دليل على حدوث تفاعل فيها.

13. التنظيف والتخلص من النفايات تخلص من النفايات الصلبة والمحاليل كما يرشدك المعلم، واغسل المواد والأدوات، وأعدها إلى أماكنها.

### التحليل والاستنتاج

1. لُخِّصَ النتائج التي لاحظتها في كل فجوة. كيف عرفت بحدوث تفاعل كيميائي؟

2. أعمل نموذجاً اكتب معادلة تفاعل موزونة لكل تفاعل شاهدته، وحدد في كل معادلة المواد التي تأكسدت والمواد التي احتزلت.

3. استناداً إلى بياناتك، أي المحاليل أكثر تلويناً للمياه؟ فسر إجابتك.

4. استخدم المتغيرات والثوابت والضوابط لـما إذا كان مهماً مقارنة التفاعلات للمحلول المجهول مع أكثر من محلول معروف واحد؟

5. ابحث اكتب تقريراً حول أهمية الكيماويات التي توجد في النظام البيئي.

6. توسيع ماذا تتوقع إذا كان محلول نترات الرصاص  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  أحد المحاليل المستعملة؟

7. تحليل الخطأ قارن إجابتك بإجابات الطلبة الآخرين في المختبر. فسر وجود أي من الفروق.

### الاستقصاء

صمم تجربة ضع فرضية حول الطريقة التي يمكنك بها إزالة الكيماويات من مصادر المياه دون إلحاق أذى إضافي بالبيئة والمنطقة المحيطة بها، ثم صمم تجربة لاختبار فرضيتك.

## الإجابة في الصفحة التالية

**الخلفية النظرية** هناك شيء ما يتفاعل مع المعادن التي توجد على أجسام العديد من القوارب في النهر المجاور لشاحنة متهاكلة (قديمة). وقد درج المحقق ذلك بثلاثة أسباب محتملة، ترتبط بثلاثة ملوثات كيميائية. ومهتمتك أن تختبر هذه الملوثات وتقارنها بعينة من النهر. والحيوانات التي تعتمد على مياه النهر بوصفها مصدراً أساسياً لها، تحتاج إلى مساعدتك لحل لغز الشاحنة المتهاكلة ومن ثم معرفة الملوثات الحقيقة لمياه النهر.

**سؤال** كيف يمكن استخدام سلسلة تفاعلات كيميائية في تحديد طبيعة الشيء الذي يؤدي إلى تلوث مصدر المياه؟

### المواد الكيميائية والأدوات اللازمة

Fe	0.1 M AgNO <sub>3</sub>
Mg	0.1 M HCl
ملقط	0.1 M ZnSO <sub>4</sub>
محلول مجهول المكونات	قطارة عدد (4)
أسلاك نحاس	طبق تفاعلات بلاستيكي 24 فجوة
حببات Pb صلبة	

### إجراءات السلامة

**تحذير:** تُعد نترات الفضة  $\text{AgNO}_3$  مادة شديدة السمية، وتحذير إلى تكون البقع على الجلد والملابس.


### خطوات العمل

- اقرأ تعليمات السلامة في المختبر.
- صمم جدولًا لتسجيل بياناتك.
- ضع طبق التفاعلات البلاستيكي على ورقة بيضاء.
- ضع قطعة من أسلاك النحاس في أربع فجوات من الصف الأول.
- كرر الخطوة 4، وذلك بإضافة عينات صغيرة من الحديد إلى أربع فجوات في الصف الثاني.
- كرر الخطوة 4، وذلك بإضافة عينات صغيرة من الرصاص إلى أربع فجوات في الصف الثالث.
- كرر الخطوة 4، وذلك بإضافة قطع من شريط الماغنيسيوم إلى أربع فجوات في الصف الرابع.
- ضع 20 قطرة من محلول نترات الفضة  $\text{AgNO}_3$  في كل فجوة من العمود الأول.
- كرر الخطوة 8، بإضافة حمض الهيدروكلوريك  $\text{HCl}$  إلى العمود الثاني.



1. لخص النتائج التي لاحظتها في كل فجوة. كيف عرفت بحدوث تفاعل كيميائي؟  
**ستعتمد الإجابات على محلول المجهول المستخدم.**

2. اعمل نموذجاً اكتب معادلة تفاعل موزونة لكل تفاعل شاهدته، وحدد في كل معادلة المواد التي تأكسدت والمواد التي اخترلت.



3. استنتاجاً لبياناتك، أي المحاليل أكثر تلويناً للمياه؟ فسر إجابتك.

4. استخدم المتغيرات والثوابت والضوابط لماذا كان مهمًاً مقارنة التفاعلات للمحلول المجهول مع أكثر من محلول معروف واحد؟





5. ابحث اكتب تقريراً حول أهمية الكيماويات التي توجد في النظام البيئي.

6. توسيع ماذا تتوقع إذا كان محلول نترات الرصاص  $Pb(NO_3)_2$  II أحد المحاليل المستعملة؟

لن تتفاعل نترات الرصاص مع النحاس Cu أو الرصاص Pb، ولكنها تتفاعل مع Fe و Mg.

7. تحليل الخطأ قارن إجابتك بإجابات الطلبة الآخرين في المختبر. فسر وجود أي من الفروق.

ستتنوع الإجابات.

### الاستقصاء

صمم تجربة ضع فرضية حول الطريقة التي يمكنك بها إزالة الكيماويات من مصادر المياه دون إلحاق أذى إضافي بالبيئة والمنطقة المحيطة بها، ثم صمم تجربة لاختبار فرضيتك.

ستتنوع الإجابات. ويستطيع الطلاب القيام بالتجربة مع إضافة مواد متنوعة تتفاعل مع المحلول المجهول. وستعتمد الإجابات على المحلول المستخدم بوصفه ملولاً مجهولاً.

# دليل مراجعة الفصل

3

**الفكرة العامة** تعدّ تفاعلات الأكسدة والاختزال من العمليات الكيميائية الشائعة في الطبيعة وفي الصناعة، وتتضمن انتقالاً للإلكترونات.


## 3-1 الأكسدة والاختزال

**الفكرة الرئيسية** يعدّ تفاعلاً للأكسدة **المفاهيم الرئيسية**

- والاختزال تفاعلين متكملين؛ إذ تأكسد ذرة إلى أخرى.
- وتتضمن تفاعلات الأكسدة والاختزال انتقال الإلكترونات من ذرة إلى أخرى.
- عندما تخترل ذرة أو أيون فإن عدد التأكسد ينخفض، وعندما تتأكسد ذرة أو أيون فإن عدد التأكسد يزداد.
- تعامل الذرات ذات الكهروسالبية العالية، في تفاعلات الأكسدة والاختزال التي تتضمن مركبات جزيئية (والأيونات المتعددة الذرات التي تحتوي على روابط تساهمية) كما لو اخترلت، في حين تعامل الذرات ذات الكهروسالبية المنخفضة كما لو تأكسدت.

### المفردات

- تفاعل الأكسدة والاختزال
- الأكسدة
- الاختزال
- عامل المؤكسد
- عامل المختزل



## 3-2 وزن معادلات الأكسدة والاختزال

**الفكرة الرئيسية** تصبح معادلات الأكسدة **المفاهيم الرئيسية**

- والاختزال موزونة عندما تكون الزيادة كل من المواد المتفاعلة والناتجة باستعمال الطريقة التقليدية.
- يصعب وزن معادلات الأكسدة والاختزال التي يظهر فيها العنصر نفسه في الكلية في أعداد التأكسد متساوية للاختفاض.
- تعتمد طريقة عدد التأكسد على مساواة عدد الإلكترونات التي تفقد من الكلي في أعداد التأكسد للذرات الداخلة في التفاعل.
- تعتمد طريقة عدد التأكسد على مساواة عدد الإلكترونات التي تكتسب من ذرات أخرى.
- تضاف أيونات الهيدروجين وجزيئات الماء لوزن معادلات التفاعلات في الوسط الحمضي.
- تضاف أيونات الهيدروكسيد وجزيئات الماء لوزن معادلات التفاعلات في الوسط القاعدي.
- نصف التفاعل هو أحد جزأيه تفاعل الأكسدة والاختزال.

### المفردات

- طريقة عدد التأكسد
- نصف التفاعل

## 3-1

تقان المفاهيم

ما أهم خواص تفاعلات الأكسدة والاختزال؟

**تتضمن تفاعلات الأكسدة والاختزال جميعها انتقالاً للإلكترونات.**

34. فسر، لماذا لا تتضمن جميع تفاعلات الأكسدة الأكسجين؟  
**تشير كلمة "الأكسدة" في الأصل إلى التفاعلات التي تتضمن الأكسجين فقط، إلا أن الأكسدة الآن تعرف على أنها فقد ذرات المادة للإلكترونات.**

35. ماذا يحدث للإلكترونات في الذرة عندما تأكسد، أو تختزل؟

**فقد الإلكترونات، تكتسب الإلكترونات.**

36. عرف عدد التأكسد.

**عدد الإلكترونات المفقودة أو المكتسبة من قبل الذرة في المركب الأيوني عندما ت تكون الأيونات.**

37. ما عدد التأكسد لكل من الفلزات القلوية الأرضية والفلزات القلوية في مركباتها؟

**الفلزات القلوية الأرضية = +2، الفلزات القلوية = +1**

38. كيف يرتبط عدد التأكسد في عمليات التأكسد بعدد الإلكترونات المفقودة؟ وكيف يرتبط عدد التأكسد في عمليات الاختزال بعدد الإلكترونات المكتسبة؟

**التفاوت في عدد التأكسد يساوي عدد الإلكترونات المفقودة في التأكسد، أو عدد الإلكترونات المكتسبة في الاختزال.**




الشكل 9-3

39. ما سبب الاختلاف في أشكال خراطة النحاس الموضحة في الشكل 9-3؟


**الاختلاف في عدد تأكسد النحاس، +1، +2.**

40. النحاس واهواء تبدأ أواني النحاس في الظهور بلون أخضر بعد تعرضها للهواء. ويتفاعل فلز النحاس في عملية الأكسدة هذه مع الأكسجين لتكوين أكسيد النحاس الصلب، والذي يكون الغطاء الأخضر. اكتب تفاعل الأكسدة والاختزال، وعرّف ما الذي تأكسد، وما الذي اختزل في هذه العملية.



**يتأكسد النحاس Cu، في حين يختزل الأكسجين O.**

43. ما العامل المخترل في المعادلة الموزونة الآتية؟



**Sn**

44. ما عدد التأكسد للمنجنيز في  $\text{KMnO}_4$ ؟

**+7**

45. حدد عدد التأكسد للعنصر الظاهر باللون الداكن في المواد والأيونات الآتية:

$\text{CaCrO}_4$  .a

**+6**

$\text{NaHSO}_4$  .b

**+6**


$\text{NO}_2^-$  .c

**+3**


$\text{BrO}_3^-$  .d

**+5**

46. حدد أي أنصاف التفاعلات الآتية أكسدة، وأيها احتزال؟




**أكسدة**




.b

إتقان حل المسائل


41. حدد المواد التي تأكسدت والتي احتزلت في معادلات الأكسدة والاحتزال الآتية:



**يتأكسد الجاليوم Ga، في حين يُحتَزل البروم Br<sub>2</sub>.**




**يتأكسد الخارصين Zn، في حين يُحتَزل الهيدروجين H.**




**يتأكسد الماغنيسيوم Mg، في حين يُحتَزل النيتروجين N<sub>2</sub>.**

42. حدد العامل المؤكسد والعامل المخترل في كل من معادلات الأكسدة والاحتزال الآتية:




**يُعد النتروجين N<sub>2</sub> عاملًا مؤكسداً، في حين يُعد الهيدروجين H<sub>2</sub> عاملًا مُخترلاً.**





**يُعد اليود I عاملًا مؤكسداً، في حين يُعد الصوديوم Na عاملًا مُخترلاً.**

124

**احتزال**






47. أي المعادلات الآتية لا تمثل تفاعل أكسدة واحتزال؟ فسر إجابتك.




**لا يمثل الاختيار a الأكسدة والاحتزال؛ لأنه لم يحدث تغيير في أعداد تأكسد أيٌ من ذرات التفاعل.**

48. حدد عدد التأكسد للنيتروجين في كل من الجزيئات أو الأيونات الآتية:



49. حدد أعداد التأكسد لكل عنصر في المركبات أو الأيونات الآتية:



50. فسر كيف يختلف أيون الكبريت  $\text{SO}_3^{2-}$  عن ثالث أكسيد الكبريت  $\text{SO}_3$ ، الموضح في الشكل 10-3؟

يُعد  $\text{SO}_3^{2-}$  أيوناً متعدد الذرات، وعدد التأكسد للكبريت فيه يساوي +4، في حين يُعد  $\text{SO}_3$  مركباً وعدد التأكسد للكبريت فيه يساوي +6.

### اتقان المفاهيم

51. قارن بين معادلة الأكسدة والاحتزال الموزونة في الوسط الحمضي والوسط القاعدي.

يمكن له  $\text{H}_2\text{O}$  أن تشارك في تفاعلات الأكسدة والاحتزال التي تحدث في المحاليل الحمضية، إما بوصفها متفاعلات أو نواتج. ويتضمن تفاعل الأكسدة والاحتزال في محلول القاعدي  $\text{OH}^-$  وإما على صورة متفاعلات أو نواتج.

52. فسر لماذا تعدد كتابة أيون الهيدروجين على هيئة  $\text{H}^+$  في تفاعلات الأكسدة والاحتزال تبسيطاً ل الواقع.

**تشهد أيونات الهيدروجين بالماء في المحاليل المائية في**


شكلها المائي، أيونات الهيدرونيوم  $\text{H}_3\text{O}^+$ ، ولا يمكن أن توجد في صورة  $\text{H}^+$ . ولكنها تكتب في بعض الأحيان في

صورة  $\text{H}^+$  لتبسيط المعادلة الكيميائية المكتوبة.

## 3

## تقدير الفصل

57. هل المعادلة الآتية تمثل عملية أكسدة أم عملية اختزال؟ فسر إجابتك.





**عملية اختزال؛ إذ تكتسب الإلكترونات، ويقل عدد تأكسد الخارصين  $\text{Zn}$ .**

58. صف ما يحدث للإلكترونات في كل نصف تفاعل من عملية الأكسدة والاختزال.

**تكتسب الإلكترونات من قبل بعض المواد خلال نصف تفاعل الاختزال، وتفقد الإلكترونات من بعض المواد خلال نصف تفاعل الأكسدة.**

**اتقان حل المسائل**

59. استعمل طريقة عدد التأكسد لوزن معادلات الأكسدة والاختزال الآتية:



**-1**



53. لماذا يتغير علوك قبل أن تبدأ بوزن معادلة تفاعل الأكسدة والاختزال معرفة ما إذا كان التفاعل يحدث في وسط حمضي أو قاعدي؟

**توفر المحاليل أيونات  $\text{H}^+$ ، أو أيونات  $\text{OH}^-$  اللازمة لوزن معادلة الأكسدة والاختزال بالقدر نفسه. لكنها لا تتغير في أثناء التفاعل، لذا يمكن حذفها من المعادلة.**


54. فسر ما الأيون المتفرج؟

**الأيونات المتفرجة هي الأيونات التي توجد في الحسابات الكيميائية على طرفي معادلة الأكسدة والاختزال بالقدر نفسه. لكنها لا تتغير في أثناء التفاعل، لذا يمكن حذفها من المعادلة.**

55. عرف مصطلح أنواع المواد بدلاً من تفاعلات الأكسدة والاختزال.

**المادة أي صنف من الوحدات الكيميائية توجد في عمليات الأكسدة أو الاختزال، وقد تكون أيوناً أو جزيئاً، أو ذرات حررة.**

56. هل المعادلة الآتية موزونة؟ فسر إجابتك.











**لا تساوي الشحنة الكلية في الجهة اليسرى الشحنة الكلية في الجهة اليمنى.**







### 3

## تقدير الفصل

61. استخدم طريقة عدد التأكسد لوزن معادلات الأكسدة والاختزال الآتية:






60. زن المعادلات الأيونية الكلية لتفاعلات الأكسدة والاختزال الآتية:



3

تقسيم الفصل











الشكل 3-11



يعد الحديد  $\text{Fe}$  العامل المحتزل، في حين يعد التيتانيوم  $\text{Ti}$  العامل المؤكسد.

125



**62.** استعمل طريقة عدد التأكسد لوزن معادلات الأكسدة والاختزال الآتية:










## 3

## تقويم الفصل


65. اكتب نصفي التفاعل اللذين يكونان معادلة الأكسدة والاختزال الموزونة الآتية:



64. اكتب نصفي تفاعل الأكسدة والاختزال في كل من معادلات الأكسدة والاختزال الآتية على الصورة الأيونية إذا حدث في محلول المائي:



اختزال



أكسدة

### 3 تقويم الفصل




الشكل 12-3

67. النحاس عندما توضع شرائح النحاس في محلول نترات الفضة كما في الشكل 12-3 يبدو فلز الفضة أزرق اللون، وت تكون نترات النحاس II. اكتب المعادلة الكيميائية غير الموزونة، ثم حدد حالة التأكسد للكل عنصر فيها. اكتب أيضاً نصف المعادلة التفاعلية، وحدد أيهما تأكسد، وأيهما اختزل. وأخيراً اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل.


**المعادلة غير الموزونة :**












**حالة التأكسد للمواد المتفاعلة :**






**المعادلة الكيميائية الموزونة :**




69. استعمل طريقة نصف التفاعل لوزن معادلات تفاعلات الأكسدة والاختزال الآتية، مضيفاً جزيئات الماء وأيونات الهيدروجين (في الوسط الحمضي)، أو أيونات الهيدروكسيد (في الوسط القاعدي) إذا تطلب الأمر ذلك:



68. استخدم طريقة عدد التأكسد لوزن معادلات الأكسدة والاختزال الأيونية الآتية:











**المعادلة الموزونة:**




70. استخدم طريقة عدد التأكسد في وزن معادلات الأكسدة والاختزال الآتية:



70. زن معادلة التأكسد والاختزال الآتية، وأعد كتابتها بشكلها الأيوني الكامل، ثم اشتق المعادلة الأيونية الكلية، وزنها بطريقة نصف التفاعل. على أن تكون الإجابة النهائية بمعاملات الوزن ولكن على النحو الآتي:  
 $\text{KMnO}_{4(\text{aq})} + \text{FeSO}_{4(\text{aq})} + \text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})} \rightarrow$




**المعادلة الكلية:**



**المعادلة النهائية:**

















**أنصاف التفاعل:**





## 3

## تقدير الفصل



72. استخدم طريقة نصف التفاعل في وزن هذه المعادلات مضيفاً جزيئات الماء وأيونات الهيدروجين (في الوسط الحمضي)، أو أيونات الهيدروكسيد (في الوسط القاعدي) عند الحاجة. واحفظ بالمعادلات الموزونة في صورة معادلة أيونية نهائية:








### 3

## تقدير الفصل

.75. استعمل قواعد تحديد عدد التأكسد لإكمال الجدول 7-3.






الجدول 7 - 6 بيانات المركبين		
القاعدة	عدد التأكسد	العنصر
7	+1	K in KBr
8	-1	Br in KBr
1	0	Cl in Cl <sub>2</sub>
7	+1	K in KCl
8	-1	Cl in KCl
1	0	Br in Br <sub>2</sub>

.76. حدد العوامل المختزلة في المعادلات الآتية:




### مراجعة عامة


.73. حدد عدد التأكسد لكل عنصر من العناصر الظاهرة بلون داكن:




.74. حدد كلاً من التغيرات الآتية إذا كانت أكسدة أو اختزال:




**أكسدة**



**أكسدة**



**اختزال**









**اختزال**




## 3

## تقدير الفصل





79. وزن معادلات الأكسدة والاختزال الأيونية الآتية بأي طريقة من طرائق وزن المعادلات.




77. اكتب معادلة أيونية موزونة مستعملًا أزواج أنصاف تفاعلات الأكسدة والاختزال الآتية:





(في الوسط الحمضي)



(في الوسط القاعدي)



78. ما عدد تأكسد الكروم في كل من المركبات الموضحة في الشكل 13-3؟




الشكل 13-3

+ في كل منها


### 3

## تقدير الفصل



زن معادلات الأكسدة والاختزال الآتية بأي طريقة من طرائق الوزن:



$3(+5)$




b.  $KClO_{3(aq)} + HCl_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} + ClO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + KCl_{(s)}$



.82




80. الأحجار الكريمة الياقوت حجر كريم يتكون من أكسيد الألومنيوم، أما لونه الأحمر فقد جاء من احتوائه على مقادير ضئيلة من أيونات الكروم III التي تحل محل أيونات الألومنيوم. ارسم تركيب أكسيد الألومنيوم، ووضح التفاعل الذي تحل فيه أيونات الكروم محل أيونات الألومنيوم. هل هذا التفاعل تفاعل تأكسد واختزال؟






لا، يُعد تفاعل أكسدة واختزال؛ لأنَّه لا يوجد تغيير في أعداد التأكسد.

.b

81. زن معادلات الأكسدة والاختزال الأيونية الآتية بأي طريقة من طرائق الوزن:



.b. (في الوسط الحمضي)




### تقويم الفصل 3

c. حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل لكلا التفاعلين.

**يُعد كل من  $\text{NO}_2^-$  و  $\text{NO}_3^-$  عاملًا مؤكسداً، في حين يُعد  $\text{NH}_4^+$  عاملًا مختزلًا.**

d. اكتب جملة توضح فيها كيف أن انتقال الإلكترونات

الذي حدث في هذين التفاعلين مختلف عن التفاعل الآتي:



**في التفاعلين الأوليين تأكسد النيتروجين واختزل، أما في التفاعل**

**الثالث فقد حدث تفاعل الأكسدة والاختزال بين عنصرين**

**مختلفين.**


84. حلّ ادرس المعادلة الأيونية الكلية أدناه، للتفاعل الذي

يحدث عند تأكسد أيون الثيوکبريتات  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  إلى أيون

رابع ثيونات  $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ . زن المعادلة مستعملًا طريقة

نصف التفاعل. وسوف يساعدك الشكل 3-14 على

تحديد أعداد التأكسد لاستعمالها.



85. توقع اعتبر أن جميع المركبات الآتية مركبات مستقرة

حقيقة. ما الذي يمكنك أن تستدل عليه عن حالة

التأكسد للفوسفور في مركباته؟






**للفوسفور حالات تأكسد متعددة (+5, +3, -2, -3)**



**مما يجعله مرناً عند اتحاده باللافزات.**

#### التفكير الناقد

طبق تبين المعادلات الآتية تفاعلات الأكسدة والاختزال التي تستخدم لتحضير غاز النيتروجين النقي وغاز ثاني أكسيد النيتروجين وغاز أول أكسيد النيتروجين  $\text{N}_2\text{O}$  في المختبر:



a. حدد عدد التأكسد لكلا عنصر في المعادلتين، ثم ارسم خططًا توضح فيه التغيير في عدد التأكسد الذي يحدث في كل تفاعل.



b. حدد الذرة التي تأكسدت والذرة التي اختزلت في كلا التفاعلين.

من  $\text{N}^{3-}$  إلى  $\text{N}_2$ : يفقد  $3e^-$  (تأكسد)

من  $\text{N}^{3+}$  إلى  $\text{N}_2$ : يكتسب  $3e^-$  (اختزل)

من  $\text{N}^{3-}$  إلى  $\text{N}^{1+}$ : يفقد  $4e^-$  (تأكسد)

128


من  $\text{N}^{5+}$  إلى  $\text{N}^{1+}$ : يكتسب  $4e^-$  (اختزل)

## تقويم الفصل 3

### مسألة تحفيز

.89. اكتب المعادلة الكيميائية لكل تفاعل موصوف فيما يأتي دون كتابة المعاملات لوزنها، ثم حدد حالة التأكسد لكل عنصر في المعادلة. ثم اكتب نصفي التفاعل محدداً أيهما نصف تفاعل أكسدة وأيهما نصف تفاعل اختزال.

a. عند وضع أكسيد الزئبق (II) الصلب في أنبوب وتسخينه بلطف يتكون الزئبق السائل في قاع أنبوب الاختبار وتصاعد فقاعات غاز الأكسجين من أنبوب الاختبار.




حالات التأكسد


نصفي التفاعل



المعادلة الكيميائية الموزونة:



.86. جد الخل تؤكسد بـ منجنات البوتاسيوم أيونات الكلوريد لتكون غاز الكلور وأيون منجنيز  $\text{Mn}^{2+}$ . قم بموازنة معادلة تفاعل التأكسد والاختزال الذي يحدث في الوسط الحمضي.




.87. في نصف التفاعل  $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NH}_4^+$ ، في أي الطرفين يجب إضافة الإلكترونات؟ قم بإضافة العدد الصحيح من الإلكترونات للطرف الذي يحتاج إلى ذلك، ثم أعد كتابة المعادلة.

انخفض عدد تأكسد N من 5+ إلى 3-؛ لذا يجب أن يكون N قد اكتسب 8 الإلكترونات على الجانب الأيسر



الشكل 3-15

.88. استعمل طريقة نصف التفاعل لوزن معادلة تفاعل الأكسدة والاختزال الذي يحدث بين أيونات الديايكرومات وأيونات اليوديد في الوسط الحمضي، والذي يوضحه الشكل 3-15.




## 3

## تقويم الفصل

b. عند وضع قطع من النحاس الصلب في محلول نترات الفضة، تتكون نترات النحاس II الأزرق ويظهر فلز الفضة في المحلول.

## المعادلة الكيميائية




حالات التأكسد



نصفي التفاعل



## المعادلة الكيميائية الموزونة :



## 3

## تقدير الفصل

95. الأواني الفضية اكتب طريقة لتنظيف الأواني الفضية من الملوثات الناتجة عن عمليات الأكسدة والاختزال. وتأكد من تضمين ذلك معلومات نظرية تصف فيها العملية في خطوات متسلسلة تجعل أي شخص قادرًا على تنفيذ هذه المهمة.

**ستتنوع الإجابات، ولكن على الطالب ابتداع طريقة منطقية تعتمد على المفاهيم التي تعلموها في مختبر الكيمياء لهذا الفصل.**

96. النحاس كان النحاس فلزًّاً مهمًّا قبل استخلاص فلزات الحديد والفضة والذهب خاصة، واستعمال خاماته في صناعة الأدوات والأواني والمجوهرات والأعمال الفنية. وكان يصهر بتسخين خاماته مع الفحم إلى درجة حرارة عالية كما كان الحال قبل 8000 سنة. قارن بين عمليات استخراج النحاس واستعمالاته في الحضارات القديمة والآن.




## تقدير إضافي

الكتابة في الكيمياء

94. الفولاذ ابحث عن دور تفاعلات الأكسدة والاختزال في صناعة الفولاذ، واكتب ملخصاً للنتائج التي حصلت عليها متضمناً الرسوم المناسبة والمعادلات التي تمثل التفاعلات.

**قد تتضمن إجابات الطالب وصفاً ورسوماً لبعض الخامات الآتية أو جميعها:**

**الخامات الرئيسية للحديد وأكاسيده، الهيماتيت ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )، الماجنتيت ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ )، وكربونات الحديد  $\text{FeCO}_3$  II، وتُعد أكثر خامات الحديد شيوعاً والتي تختزل في الفرن اللافح. والتفاعل المهم في هذا الفرن هو تفاعل أكسدة الفحم لأول أكسيد الكربون:**  $2\text{C}_{(s)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{CO}_{(g)}$  **وكذلك اختزال خام الحديد بواسطة أول أكسيد الكربون الذي يتم في العادة على خطوات هي:**



3

## تقدير الفصل

## أسئلة المستندات

أعمال الزجاج تتأثر الألوان المكونة في زجاج السيراميك كما في الشكل 3-16 بدرجة حرارة التسخين؛ حيث تُكسب الأيوناتُ الفلزية النحاس الذي له أكثر من حالة أكسدةً ألواناً مختلفة عند تسخينه. تتوافر كميات كبيرة من الأكسجين في أثناء عمليات الحرق مما يجعل أيونات النحاس الموجودة في الزجاج تلون اللهب باللون الأخضر المائل إلى الزرقة. وفي حالة الاختزال يوجد الأكسجين بكميات قليلة، وتزداد كمية ثاني أكسيد الكربون مما يجعل أيونات النحاس في الزجاج تميل إلى اللون الأحمر.



الشكل 3-16

97. اكتب معادلة لما يحدث في الآنية الخزفية الموضحة في الشكل 3-16.



98. استناداً إلى لون آنية النحاس الخزفية، أيهما أكثر ميلاً للتآكسد، وأيهما أكثر ميلاً للاختزال؟

**اللون الأحمر:** يكون  $\text{Cu}^{1+}$  الأكثر اختزالاً.

**اللون الأخضر:** يكون  $\text{Cu}^{2+}$  الأكثر تآكسداً.

# اختبار مقتن

## أسئلة الاختيار من متعدد

5. العنصر الأعلى كهروسالبية بين العناصر الآتية

هو:

Cl .a

N .b

O .c

F .d

6. المادة التي عدد تأكسدها يساوي صفرًا هي:


Cu<sup>2+</sup> .a

H<sub>2</sub> .b

SO<sub>3</sub><sup>2-</sup> .c

Cl<sup>-</sup> .d

7. التفاعل بين يوديد الصوديوم والكلور موضح على النحو الآتي:



أي الأسباب الآتية تبقى حالة تأكسد الصوديوم دون تغيير:

أيون متفرج. Na<sup>+</sup> .a

لا يمكن أن يختزل. Na<sup>+</sup> .b

عنصر غير متعدد. Na<sup>+</sup> .c

أيون أحادي الذرة. Na<sup>+</sup> .d

1. أي مما يأتي لا يعد عاملاً مختصلاً في تفاعل الأكسدة والاختزال؟


a. المادة التي تأكسدت

b. مستقبل الإلكترون

c. المادة الأقل كهروسالبية




d. مانح الإلكترون

التفاعل بين النيكل و كلوريد النحاس II موضح على النحو الآتي:



استعمل المعادلة الكيميائية في الإجابة عن السؤالين 2 و 3.

2. ما نصفا تفاعل الأكسدة والاختزال للتفاعل؟



3. العامل المختصّل في المعادلة هو:

NiCl<sub>2</sub> .a

Cu .b

CuCl<sub>2</sub> .c

Ni .d

4. رقم التأكسد للكلور في HClO<sub>4</sub> هو:

+7 .a

+5 .b

+3 .c

+1 .d

# اختبار مقنن

## أسئلة الإجابات المفتوحة

استعمل جدول العناصر الآتي للإجابة عن الأسئلة من 10 إلى 12.

		الكهروسالبية															
		1	2	13	14	15	16	17	18								
نسبة الكهروسالبية	1		Li	Be		O	F										
	2		Na	Mg			Cl										
	3		K	Ca			Br										
	4		Rb	Sr		I											
	5		Cs	Ba													
	6																
	7																

10. أي العناصر تمثل أقوى عامل مؤكسد؟

F

11. أي العناصر تمثل أقوى عامل مخترل؟


Cs

12. أي العناصر لها أقل كهروسالبية؟

Cs

## أسئلة الإجابات القصيرة

استعمل المعادلة أدناه للإجابة عن السؤالين 9، 8، علمًا أن المعادلة الأيونية الكلية بين اليود وأكسيد الرصاص IV موضحة على النحو الآتي:



8. حدد عدد التأكسد لكل مشارك في التفاعل.



أعداد التأكسد هي:

صفر 4+2- 5+2- 2+

9. فسر كيف تحدد العنصر الذي تأكسد والعنصر الذي اختزل؟

العناصر التي تأكسدت زاد عدد تأكسدها (I) أما العناصر التي اختزلت فقد قل عدد تأكسدها (Pb).

**حلول كيمياء 4**  
**التعليم الثانوي**  
**نظام المقررات**  
**الفصل 5 الدرس 5-1**

## مسائل تدريبية


اكتب معادلة موزونة لتفاعل الخلية الكلي لكل من أزواج أنصاف التفاعلات الآتية . احسب جهد الخلية القياسي ، ثم اكتب رمز الخلية . ارجع إلى قواعد وزن معادلات الأكسدة والاختزال التي درستها سابقاً .

طريقة الحل : ننظر إلى العنصرين أيهما له جهد اختزال أكثر يكون هو تفاعل الاكسدة .


$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0$$

وثم نكتب رمز الخلية : نكتب أولاً نصف تفاعل الأكسدة باستعمال رمز المادة المقاولة ثم الناتجة .



ونكتب بعد ذلك نصف تفاعل الاختزال عن اليمين ، ونفصل بين نصفي التفاعل بخطين عموديين .




- بما أن لاختزال  $Pt^{+2}$  أكبر جهد اختزال فإن نصف التفاعل هذا يستمر في الاتجاه الطردي في صورة اختزال ، في حين يستمر نصف تفاعل  $Sn^{+2}$  في الاتجاه العكسي في صورة أكسدة .



$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0 = + 1.18 V - (-0.1375 V) = + 1.32 V$$




- بعد أن نحدد معادلة الاختزال ومعادلة الأكسدة التي نكتبها في الاتجاه المعاكس نحصل على :






نقوم بموازنة الالكترونات في معادلات نصفي الخلية بضرب كلتا المعادلتين في المعامل المناسب ، ثم نجمعها .


(نضرب معادلة 2 ب 3 ، ونضرب معادلة  $Cr_{(s)}$  ب 2 ) ونجمع المعادلتين :





$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0 = -0.28 V - (-0.744 V) = + 0.46 V$$



$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0 = + 0.851 V - (-0.913 V) = + 1764 V$$






4) تحفيز اكتب معادلة موزونة لتفاعل الخلية ، واحسب الجهد القياسي لتفاعل الذي يحدث عندما يتم توصيل هذه الخلايا معاً ، ثم اكتب رمز الخلية .




الحل : نضرب المعادلة الأولى ب 4 ، ونضرب المعادلة الثانية ب 3 وذلك لموازنة الالكترونات ،

ونقلب المعادلة الثانية لأن لها جهد احتزان أقل . وثم نجمع المعادلتين :




$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0 = + 0.957 V - (+0.401 V) = +0.556 V$$




### مسائل تدريبية

احسب جهد الخلية لتحديد ما إذا كانت تفاعلات الأكسدة والاختزال الآتية تحدث بصورة تلقائية كما هي مكتوبة أم لا ، واستخدم الجدول 1-5 لمساعدتك على تحديد أنصاف التفاعل الصحيحة :




$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0 = + 0.3419 V - (-0.1375 V) = +0.4794 V$$

التفاعل تلقائي لأن  $0 > E_{Cell}^0$




$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0 = - 0.1262 V - (-2.372 V) = +2.246 V$$

التفاعل تلقائي لأن  $0 < E_{Cell}^0$



$$E_{Cell}^0 = E_{2Hg^{+2}}^0 - E_{MnO_4^-}^0 = 0.920 V - (+1.507 V) = -0.587 V$$


التفاعل غير تلقائي لأن  $0 < E_{Cell}^0$



$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0 = - 0.28 V - 2.010 V = -2.29 V$$

التفاعل غير تلقائي لأن  $0 < E_{Cell}^0$


(9) تحفيز اكتب المعادلة ، وحدد جهد الخلية  $E^\circ$  للخلية الآتية باستعمال الجدول 1-2 . هل التفاعل تلقائي ؟



بما أن الألومنيوم على اليسار فإنه يمثل معادلة الأكسدة ، والرثيق على اليمين فهو يمثل معادلة الاختزال .



نضرب معادلة الرثيق ب 3 ، ونضرب معادلة الألومنيوم ب 2 ونجمع المعادلتين :



$$E_{Cell}^0 = 0.920 \text{ V} - (-1.662 \text{ V}) = +2.582 \text{ V}$$

لتفاعل تلقائي لأن  $0 > E_{Cell}^0$

## التقويم 5-1

(10) صف الظروف التي يؤدي عندها تفاعل الأكسدة والاختزال إلى تدفق التيار الكهربائي خلال السلك .

- شُّج الخلية الكهروكيميائية التي تحتوي على نصفي تفاعل التأكسد والاختزال والموصولين بقطنطرة ملحية سيلاً من الإلكترونات (تياراً كهربائياً) خلال سلك التوصيل .






(11) حدد مكونات الخلية الجفانية ، وفسر دور كل مكون في عملية تشغيل الخلية .

- تتكون الخلية الجفانية من أنود وكاثود وقطنطرة ملحية وسلك توصيل بين القطبين .

يحدث التأكسد على الأنود ، في حين يحد الاختزال على الكاثود .


وتسمح القنطرة الملحية بحركة الأيونات من محلول إلى آخر ، كما يسمح السلك بمرور الإلكترونات من الأنود إلى الكاثود .

(12) اكتب المعادلة الموزونة لتفاعل الخلية التلقائي الذي يحدث في الخلية التي لها أنصاف تفاعل الاختزال الآتية :




(13) حدد الجهد القياسي للخلية الكهروكيميائية ، حيث تمثل كل معاناة التفاعل الكلي لل الخلية .

وحدد أيضاً هل التفاعلات المكتوبة أدناه ظرفانية أم غير ظرفانية .




$$E_{Cell}^0 = -1.662 V - (+0.3419 V) = -2.004 V$$

التفاعل غير ظرفاني لأن  $E_{Cell}^0 < 0$



$$E_{Cell}^0 = +0.851 V - (+0.153) = +0.698 V$$

التفاعل ظرفاني لأن  $E_{Cell}^0 > 0$



$$E_{Cell}^0 = E_{NO_3^-}^0 - E_{Cd^{+2}}^0 = +0.775 V - (-0.4030) = +1.178 V$$

التفاعل ظرفاني لأن  $E_{Cell}^0 > 0$

(14) صمم خريطة مفاهيم للبند 1-2 مبدئاً بالمصطلح "خلية كهروكيميائية" ، ثم أدرج جميع المصطلحات الجديدة في خريطتك .



**حلول كيمياء 4**  
**التعليم الثانوي**  
**نظام المقررات**  
**الفصل 5 الدرس 2**

## التقويم 5-2

(15) حدد ما الذي يتآكسد؟ وما الذي يختزل في بطارية الخلية الجافة الخارصين والكربون؟ وما الخواص التي تجعل الخلية الجافة القلوية أكثر تطوراً من أنواع البطاريات الجافة الأقدم؟

- يتآكسد الخارصين  $Zn$  ، في حين يختزل ثاني أكسيد المنغنيز  $MnO_2$  في العجينة الموصولة للتيار .

يوجد الخارصين  $Zn$  في الخلية القلوية على هيئة مسحوق ، مما يوفر مساحة سطح أكبر لتفاعل ، ولا تحتاج البطاريات القلوية إلى عمود الكربون بوصفه كاثوداً ، لذا يمكن تصنيعها بأحجام صغيرة .

(16) فسر ماذا يحدث عند إعادة شحن البطارية؟

- يجبر مصدر الطاقة المضاف إلى نظام الخلية على العمل في الاتجاه غير التلقائي (العكس) ، لذا تعاد المواد الأصلية والتي أصبحت مستفادة إلى الخلية .

(17) صُفَّ أنصاف التفاعل التي تحدث في خلية وقود الهيدروجين ، واتكتب معادلة التفاعل الكلية .

- يتآكسد غاز الهيدروجين على الأنود بوجود أيونات الهيدروكسيد إلى جزيئات ماء ، في حين يختزل غاز الأكسجين على الكاثود بوجود جزيئات الماء إلى أيونات هيدروكسيد . ويمثل التفاعل الكلي بالمعادلة الآتية :  $2H_2O_{(l)} \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$  .


(18) صُفَّ عمل أنود عندما يستخدم قطباً مضخّياً . وفيما يتشابه عمله مع الجلفنة؟

للأنود المضخّي جهد اختزال أقل من جهد اختزال الفلز المراد الحفاظ عليه ومنع تأكله . وبتشابه عمله مع الجلفنة حيث تتشقق طبقة الجلفنة التي تتكون من الخارصين أو تتكتّر . إذ يفضل الخارصين التأكل تاركاً الفلز الذي تحته خاليًا من التأكل .

(19) فسر لماذا يعد الليثيوم اختياراً جيداً ليكون أنوداً للبطارية؟

- يعد الليثيوم  $Li$  عنصراً خفيفاً ، وله أقل جهد اختزال من الفلزات جميعها ، وعند مقارنته بنصف تفاعل الاختزال نفسه ، فإنه ينتج طاقة أكبر مما تتوجه نصف خلية الخارصين .

(20) احسب باستعمال بيانات الجدول 5-1 جهد خلية الهيدروجين-الأكسجين الموضحة في الصفحة 53 .



$$E_{cell}^0 = +0.401\text{ V} - (-0.8277\text{ V}) = +1.229\text{ V}$$

(21) صمم تجربة استخدم معرفتك بالأحماض في ابتكار طريقة لتحديد ما إذا كان المركم الرصاصي مشحوناً بصورة كاملة أم أن شحنه بدأ ينفذ .

- يمكن معايرة عينة حمض الكبريتيك الموصول للتيار والمأخوذ من بطارية مع قاعدة ،

ومقارنة مولاريتها بمolarية عينة من محلول حمض الكبريتيك المأخوذ من بطارية أخرى جديدة .

**حلول كيمياء 4**  
**التعليم الثانوي**  
**نظام المقررات**  
**الفصل 5 الدرس 3**

### التقويم 3

(22) عَرَفَ التحليل الكهربائي ، واربطة مع تلقائية تفاعل الأكسدة والاختزال .

- التحليل الكهربائي : عملية استعمال الطاقة الكهربائية لإنتاج تفاعل كيميائي .  
وهو عملية غير تلقائية .

(23) فَسَرَ اختلاف نواتج التحليل الكهربائي لكل من مصهور كلوريد الصوديوم وماء البحر .

- ينتج عن تحليل ماء البحر غاز الهيدروجين وغاز الكلور ، وهيدروكسيد الصوديوم ،  
وي المنتج عن تحليل مصهور كلوريد الصوديوم فلز الصوديوم ، وغاز الكلور .  
واختلاف النواتج عائد لأن التحليل الكهربائي للماء المالح يتضمن محتواً مائياً يؤثر في النتائج .

(24) صُفِّ كِيفَ تَتَمُّ تَنْقِيَةُ النَّحَاسِ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْ مَصْهُورِ خَامِهِ بِالْتَّحْلِيلِ الْكَهْرَبَائِيِّ؟

- يتضمن ناتج تحليل مصهور النحاس ذرات النحاس Cu التي تتآكسد إلى أيونات  $Cu^{+2}$  ثم تخترن إلى ذرات Cu نقية ، حيث تترسب الشوائب بعيداً .

(25) فَسَرَ أَهْمَىَةُ إِعَادَةِ تَدوِيرِ الْأَلُومِنِيُومِ بِالرَّجُوعِ إِلَىِ عَمَلِيَةِ هُولِ -هِيِرِولِيتِ .

تَتَطَلَّبُ عَمَلِيَةُ هُولِ -هِيِرِولِيتِ درَجَاتٍ عَالِيَّةٍ وَكَمِيَاتٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْكَهْرَبَاءِ لِفَصْلِ الْأَلُومِنِيُومِ مِنْ خَامِهِ ،  
فِي حِينَ تَحْتَاجُ إِعَادَةِ التَّدوِيرِ إِلَىِ الْحَرَارَةِ الَّتِي يَتَطَلَّبُهَا صَهْرُ الْفَلَزِ فَقَطِ .

(26) صُفِّ الْأَنُودُ وَالْكَاثُودُ فِي خَلِيَّةِ تَحْلِيلِ كَهْرَبَائِيِّ يَسْتَعْمِلُ فِيهَا الْذَّهَبُ لِطَلَاءِ الْأَشْيَاءِ وَالْأَجْسَامِ .

- يَتَكَوَّنُ الْأَنُودُ مِنْ قَطْعَةِ مِنَ الْذَّهَبِ ، فِي حِينَ يَتَكَوَّنُ الْكَاثُودُ مِنْ جَسْمِ الْمَرَادِ طَلاَوِهِ .


(27) فَسَرَ لِمَذَا يَحْتَاجُ إِنْتَاجُ كِيلُو جَرَامٍ وَاحِدٍ مِنَ الْفَضْةِ بِوَاسِطَةِ التَّحْلِيلِ الْكَهْرَبَائِيِّ إِلَىِ طَاقَةِ كَهْرَبَائِيَّةٍ أَقْلَىَ مِنْ إِنْتَاجِ كِيلُو جَرَامٍ وَاحِدٍ مِنْ أَيُونَاتِ الْأَلُومِنِيُومِ؟

- أَوْلًا : يَحْتَوِي كِيلُو جَرَامٍ وَاحِدٍ مِنَ الْفَضْةِ عَلَىِ عَدْدٍ مِنَ الْذَّرَاتِ أَقْلَىَ مَا يَحْوِيهِ كِيلُو جَرَامٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَلُومِنِيُومِ ،  
لَأَنَّ الْكَتْلَةَ الْمُوَلَّيَّةَ لِلْفَضْةِ أَكْبَرَ مِنَ الْكَتْلَةَ الْمُوَلَّيَّةَ لِلْأَلُومِنِيُومِ .

ثَانِيًّا : تُعَدُّ عَمَلِيَةُ اخْتِرَالِ الْفَضْةِ أَسْهَلُ مِنْ عَمَلِيَةِ اخْتِرَالِ الْأَلُومِنِيُومِ ،  
لَأَنَّ جَهْدَ اخْتِرَالِهَا يَسْاُوِي  $V_{+0.07796}$  ، فِي حِينَ يَسْاُوِي جَهْدَ اخْتِرَالِ الْأَلُومِنِيُومِ  $1.662$  .

(28) احْسَبْ جَهْدَ خَلِيَّةِ دَاوَنَ بِاستِعْمَالِ الجَدُولِ 1-5 ، وَهُلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْجَهْدُ مُوجَّاً أَوْ سَالِبًا؟

- يَكُونُ التَّفَاعُلُ فِي خَلِيَّةِ دَاوَنَ غَيْرَ تَلَقَّائِي ، لَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْجَهْدُ سَالِبًا .



$$E_{Cell}^0 = -2.71 \text{ V} - (+1.35827 \text{ V}) = -4.07 \text{ V}$$

29) لخص اكتب فقرة تتطرق بكل هدف من الأهداف الثلاثة للبند 3-2 بلغتك الخاصة .

- يمكن عكس التفاعلات التلقائية في الخلايا الكهروكيميائية بوساطة تزويدها بجهد كهربائي خارجي .
- إن عمليتي اختزال أيونات الصوديوم  $\text{Na}^+$  وتأكسد أيونات الكلور  $\text{Cl}^-$  تحدثان على الأنود والكتنود على التوالي وفي أثناء عملية تحطيل ماء البحر ، تحدث تفاعلات جانبية أخرى مرافقة ، حيث على الأنود يُختزل الماء إلى غاز الهيدروجين  $\text{H}_2$  وغاز الأكسجين  $\text{O}_2$  .

إن عملية التحطيل تُعد من إحدى طرائق فصل الفلزات من خاماتها وتنقيتها .....

**حلول كيمياء 4**  
**التعليم الثانوي**  
**نظام المقررات**  
**الفصل 5 التقويم**

## إنقاذ المفاهيم

(30) ما الخواص التي تسمح بـاستعمال تفاعلات الأكسدة والاختزال في توليد تيار كهربائي؟

- انتقال الإلكترونات بين الذرات.

(31) صفات العملية التي تنتج الإلكترونات في الخلية الجلخانية حارصين - نحاس.

- تأكسد الحارصين من  $Zn$  إلى  $Zn^{+2}$  مُنتجة  $2e^-$ .

(32) ما وظيفة الفنطرة الملحيّة في الخلية الجلخانية؟

- تكمّل الفنطرة الملحيّة الخلية، وتمنع تكثّس الشحنات الموجبة والسلبية في أنصاف الخلايا.

(33) ما المعلومات اللازمة لتحديد الجهد القياسي للخلية الجلخانية؟


- جهد الاختزال القياسي لكل خلية.

(34) في الخلية الجلخانية الممثلة بالرموز الآتية:  $Al | Al^{+3}_{(LM)} \parallel Cu^{+2}_{(LM)} | Cu$  ، ما الذي يتأكسد ، وما الذي يختزل عندما يمر التيار في الخلية؟

- يتأكسد  $Al$  ، في حين يختزل  $Cu$ .

(35) عدد أي ظروف يتم قياس جهد الاختزال القياسي؟

$1M$  و  $1\text{ atm}$  و  $25^\circ C$  -



الشكل 5-24

(36) حدد كلاً من الفلز الذي تأكسد والكافود في الشكل 5-24.

- يتأكسد الحارصين  $Zn$  ، واللحاس هو الكافود.

(37) تتماًل الفنطرة الملحيّة ب  $KNO_3$  . فسر لماذا يُعد من الضروري أن تتحرّك أيونات البوتاسيوم عبر الفنطرة الملحيّة إلى الكافود؟

تحسّن حركة الأيونات في الفنطرة الملحيّة للتيار بالتدفق وإن لم تكن المتفاعلات على اتصال مباشر معًا.

حيث تحمل الأيونات التيار الكهربائي وتمنع تكثّس الشحنات الموجبة على الأنود والشحنات السلبية على الكافود.







(38) تذكّر أن العامل المختزل هو المادّة التي تتأكسد وأن العامل المؤكسد هو المادّة التي تُختزل.

استعمل الجدول 5-1 لاختيار العامل المؤكسد الذي سيحوّل  $Au^{+3}$  إلى  $Au^{+2}$  ولا يحوّل  $CO^{+2}$  إلى  $CO^{+3}$  .








$MnO_4^-$  ,  $Au^+$  ,  $H_2O_2$  -

## إنقان حل المسائل

39) استعمل الجدول 1-5 في كتابة رمز الخلية القياسية لكل نصف خلية مما يأتي ومصلحة بقطب الهيدروجين القياسي .



40) اكتب معادلة كيميائية موزونة لكل ترميز يمثل الخلية القياسية الآتية :



الشكل 5-25

41) يوضح الشكل 5-25 خلية جلفانية تتكون من قطعة خلرسين 1.0 من محلول نترات الخلرسين ، وقطعة فضة في 1.0 من محلول نترات الفضة . استعمل الشكل والجدول 1-2 في الإجابة عن الأسئلة الآتية :

a. حدد الأنود

b. حدد الكاثود

c. أين تحدث الأكسدة ؟

d. أين يحدث الاختزال ؟

e. ما اتجاه مرور التيار خلال أسلاك التوصيل ؟

f. ما اتجاه مرور الأيونات الموجبة خلال القطرة الملحية ؟

g. ما جهد الخلية عند 25°C و 1 atm ؟

h. ما جهد الخلية عند 25°C و 1 atm ؟

الحل : a. الأنود هو الخارصين . b. الكاثود هو الفضة .


c. يحدث التأكسد عند قطب الخارصين d. يحدث الاختزال عند قطب الفضة .

e. يتدفق التيار من قطب الخارصين إلى قطب الفضة .


f. تتدفق الشحنات الموجبة من نصف خلية الأنود إلى نصف خلية الكاثود .

$$E^0 = +0.7996 V - (-0.7618 V) = +1.5614 V . h$$


(42) بالرجوع إلى الجدول 5 ، احسب جهد الخلية لكل من الخلايا البطفانية الآتية :



$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0 = E_{Ag^+}^0 - E_{Pb^{+2}}^0 = + 0.7996 V - (-0.1262 V) = +0.9258 V$$



$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0 = E_{Ni^{+2}}^0 - E_{Mn^{+2}}^0 = - 0.257 V - (-1.185 V) = +0.928 V$$



$$E_{Cell}^0 = E_{Cathode}^0 - E_{anode}^0 = E_{I_2}^0 - E_{Sn^{+2}}^0 = + 0.5355 V - (-0.1375 V) = +0.673 V$$

## 5-2

### إنقاذ المفاهيم

(43) أي جزء في خلية الخارصين والكربون الجافة يمثل الأنود ؟ وما التفاعل الذي يحدث عنده ؟

- تمثل طبقة الخارصين الأنود ، حيث تتأكسد ذرات الخارصين  $Zn$  إلى أيونات  $Zn^{+2}$  .

(44) كيف تختلف البطاريات الأولية عن الثانوية ؟

- يتم التخلص من البطاريات الأولية ، إذ يصعب عكس التفاعل فيها ،

في حين يعاد شحن البطاريات الثانوية حيث يمكن عكس التفاعل فيها .

(45) بطارية الرصاص الحمضية ما المادة التي تخترل في بطاريات تخزين المراكم الرصاصية ؟


وما المادة التي تتأكسد ؟ وما المواد التي تنتج في كل تفاعل ؟

- يُختزل  $PbO_2$  ، في حين يتآكسد  $PbSO_4$  ، وينتج  $Pb_{(s)}$  وماء .

(46) خلية الوقود الحيوي يختزل  $Fe^{+3}$  عند كاثود خلية الوقود الحيوي في بوتاسيوم سداسي سيانيد الحديد III ( $K_3[Fe(CN)_6]$ )

إلى  $Fe^{+2}$  في بوتاسيوم سداسي سيانيد الحديد II ( $K_3[Fe(CN)_6]$ ) . ويختزل عند الأنود نيكتين أميد- أدين- ثئاني

النيوكليوتيد ( $NADH$ ) الذي يتآكسد إلى  $NAD^+$  . استعمل جهود الاختزال القياسية الآتية لتحديد جهد الخلية :



$$E_{Cell}^0 = + 0.36 V - (- 0.320 V) = + 0.38 V$$

(47) خلايا الوقود اذكر طرفيتين تختلف فيما خلية الوقود عن البطارية العاديّة .

- تستخدم تأكسد الوقود في خلية الوقود لإنتاج الكهرباء ويجب استبدال البطارية أو إعادة شحنها .  
ويمكن إنتاج التيار والحفاظ على استمراره ما دام مصدر الوقود مستمراً .

(48) الجلفنة ما الجلفنة ؟ وكيف تحمي الجلفنة الحديد من التآكل ؟

- الجلفنة : تغطية الفلزات المعرضة للتآكل بفلزات الحماية الذاتية لمنع التآكل . حيث تعمل الجلفنة على الحفاظ على الفلز الموجود أسفلها بوساطة منع الرطوبة والهواء من الاتصال معه .  
وعند تلف طبقة الجلفنة تستطيع هذه الطبقة الاستمرار في حماية الفلز بوساطة العمل كأنود أضحيّة يتآكسد ذاتياً بدلاً منه .

(49) البطاريات فسر لماذا لا تنتج بطاريات المراكم الرصاصية التيار عند انخفاض تركيز  $H_2SO_4$  ؟

- يساهم حمض الكبريتيك في التفاعل ، عند انخفاض تركيزه يتوقف التفاعل .

(50) الصوف حزمة من الشعيرات الفولاذية المصنوعة من الفولاذ ، وهي سبيكة من الحديد والكربون .

ما أفضل طريقة لتخزين سلك المواتين المستعمل في غسل الأواني ؟

- a. تخزينه في الماء
- b. تخزينه في الهواء الطلق
- c. تخزينه في وعاء التجفيف .

- الجواب : c ، حيث يعد الماء من المتقاعلات في عملية الصدأ ، وتمتص المواد المحففة الماء من الهواء .

(51) الحماية من التآكل اذكر ثلاثة طرائق لحماية الفلز من التآكل ؟

- الجلفنة ، الطلاء ، الأنود المضخي .

## إنقاذ حل المسائل

(52) فيما يأتي أنصاف تفاعلات بطاريات تخزين المراكم الرصاصية :





ما جهد الخلية القياسي في بطارية السيارة ؟

$$E^0 = +1.685\text{ V} - (-0.356\text{ V}) = +2.041\text{ V}$$



الشكل 5-26

(53) التركيب في الشكل 5-26 يعمل عمل بطارية .



حدّد الأنود .

قطعة النحاس


c. حدّد الكاتود .

d. حدّد الأنود .

e. احسب جهد الخلية القياسي لهذه البطارية .

(54) إذا قمت بتصميم بطارية تستعمل نصف خلية تتكون من  $Cu^{+2}$  و  $Cu^0$  ، ونصف خلية أخرى تتكون من  $Sn^{+2}$  و  $Sn^0$  ، مع العلم أن قطب النحاس هو الكاتود وقطب القصدير هو الأنود .

فارسم البطارية ، ثم اكتب أنصاف التفاعل التي تحدث في كل نصف خلية . ما أكبر جهد يمكن أن تنتجه هذه الخلية ؟



$$E^0 = +0.3419 V - (-0.1375 V) = +0.4794 V$$

### 5-3

#### إنقاذ المفاهيم

(55) كيف يمكن عكس تفاعل الأكسدة والاختزال التلقائي لخلية جفافية ؟

- يتم ذلك بتتمرير تيار كهربائي من خلال الخلية في الاتجاه المعاكس .

(56) أين يحدث تفاعل الأكسدة في خلية التحليل الكهربائي ؟

- عند الأنود

(57) خلية داون ما التفاعل الذي يحدث عند الكاتود في أثناء التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم ؟

- تختزل أيونات  $Na^+$  إلى ذرات .

(58) صناعة فستر لماذا يستعمل التحليل الكهربائي لماء البحر في جميع أنحاء العالم بكميات كبيرة ؟

- نواتج التحليل الكهربائي للماء المالح : غاز الهيدروجين وغاز الكلور وهيدروكسيد الصوديوم ، وهي نواتج مهمة تجارياً .

(59) إعادة تدوير فسر كيف تحفظ عملية إعادة تدوير الألومينيوم الطاقة ؟

- لأنها تتطلب طاقة أقل مقارنةً مع الطاقة اللازمة لاستخلاصه من خاماته الأصلية .


(60) صف ماذا يحدث عند الأنود والكتود في التحليل الكهربائي لمطول  $KI$  ؟

- تُخترق أيونات البوتاسيوم  $K^+$  عند الكتود إلى ذرات البوتاسيوم  $K$  ، في حين تأكسد أيونات اليوديد  $I^-$  عند الأنود إلى جزيئات يود  $I_2$  .



(61) الطلاء بالكهرباء يوضح الشكل 5-27 مفتاحاً يطل على كهربائياً بالنحاس في خلية تحليل كهربائي . فلين تحدث الأكسدة ؟ فسر إجابتك .

- تحدث الأكسدة عند الأنود وهو قطب النحاس  $Cu$  . وتتحرّك الإلكترونات منه إلى الطرف الموجب للبطارية .



الشكل 5-28

(62) اعتماداً على الشكل 5-28 ، أجب عن الأسئلة الآتية :

a. أي الأقطاب يزداد حجمه ؟ اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث عند هذا القطب .

b. أي الأقطاب يقل حجمه ؟ اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث عند هذا القطب .

الحل : a. يزداد حجم قطب الخارجيين  $Zn$  .

b. يقل حجم قطب النحاس  $Cu$  .

(63) مستعيناً بالشكل 5-28 ، فسر ماذا يحدث لأيونات النحاس في المطول ؟

- تتجذب أيونات النحاس  $Cu$  إلى الكاتود وتترسب عليه وتعطيه .

### مراجعة عامة

(64) لماذا تتدفق الإلكترونات من قطب إلى آخر في الخلية الجلفانية ؟

- في الخلية الجلفانية تكتس الأيونات في المطول عند الكاتود الإلكترونات بسهولة أكبر من الأيونات عند الأنود ،

و عند وضع القطرة الملحيّة والأسلاك في أماكنها يحدث تفاصيل التأكسد والاختزال التلقائي وتتدفق الإلكترونات من الأنود إلى الكاتود ، بسبب وجود فرق في الجهد بين القطبين .

(65) إنتاج الألومنيوم ما المادة التي يتم تحليلها كهربائياً في العملية الصناعية لإنتاج فلز الألومنيوم ؟


- أكسيد الألومنيوم .  $Al_2O_3$

(66) اكتب أنساف تفاعل الأكسدة والاختزال للخلية الجافانية فضة - كروم ، وحدد الأنود والكاثود واتجاه تدفق الإلكترونات .




تدفق الإلكترونات من الأنود (الكروم  $Cr$ ) إلى الكاثود (الفضة  $Ag^+$ ) .


(67) حدد ما إذا كانت تفاعلات الأكسدة والاختزال الآتية تلقائية أو غير تلقائية :




$$E_{Cell}^0 = -1.185 \text{ V} - (+0.744 \text{ V}) = -2.251 \text{ V} \quad \text{التفاعل غير تلقائي لأن } 0 < E_{Cell}^0$$



$$E_{Cell}^0 = -0.1375 \text{ V} - (+0.771 \text{ V}) = -0.908 \text{ V} \quad \text{التفاعل غير تلقائي لأن } 0 < E_{Cell}^0$$




$$E_{Cell}^0 = -0.257 \text{ V} - (-2.372 \text{ V}) = +2.115 \text{ V} \quad \text{التفاعل تلقائي لأن } 0 > E_{Cell}^0$$




$$E_{Cell}^0 = -0.1262 \text{ V} - (+0.153 \text{ V}) = -0.279 \text{ V} \quad \text{التفاعل غير تلقائي لأن } 0 < E_{Cell}^0$$

(68) حدد جهد الخلية المكونة من كل نصف خلية مما يأتي مرتبطة مع نصف خلية :




$$E_{Cell}^0 = +0.7996 \text{ V} - (-1.847 \text{ V}) = +2.647 \text{ V}$$



$$E_{Cell}^0 = +0.7996 \text{ V} - (-0.47627 \text{ V}) = +1.2759 \text{ V}$$



$$E_{Cell}^0 = 1.692 \text{ V} - (+0.7996 \text{ V}) = +0.892 \text{ V}$$





$$E_{Cell}^0 = +0.7996 \text{ V} - (+0.5355 \text{ V}) = +0.2641 \text{ V}$$

69) التناكل فسر لماذا بعد وجود الماء ضروريًا لحدوث تناكل الحديد ؟

- تناكسد ذرات الحديد  $Fe$  إلى أيونات الحديد  $Fe^{+2}$  في المحلول المائي ، ثم تناكسد هذه الأيونات مرة أخرى إلى أيونات الحديد  $Fe^{+3}$  III الذي تتحدد مع غاز الأكسجين  $O_2$  المُخترل لإنتاج الصدأ  $Fe_2O_3$ .

70) السفر عبر الفضاء تستخدم السفن الفضائية خلايا الوقود  $H_2/O_2$  في إنتاج الكهرباء.

a. ما التفاعل الذي يحدث عند الأندود والكلنود ؟



b. ما جهد الخلية القاسية لخلية الوقود ؟

$$E_{cell}^0 = +0.401\text{ V} - (-0.8277\text{ V}) = +1.229\text{ V}$$

71) خلايا الوقود فسر الاختلاف بين تناكسد الهيدروجين في خلية الوقود وتناوله عند احتراقه في الهواء .

- يتم الحكم في تناكسد الهيدروجين في خلية الوقود حيث تتحول معظم الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية بدلاً من طاقة حرارية .


72) تقيية النحاس عدد نصفة النحاس بالتحليل الكهربائي ، ما العوامل التي تحدد أي ملحمة نحاس هي الأندود ، وأيها الكلنود ؟

بحسب الجدول التالي في الخلية أن النحاس غير القاسي سيكون هو الأندود .

73) بطاريات التخزين تسمى المراكم الرصاصية وعمرها من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها أحجاماً بطاريات التخزين ،

فما الذي يخزن في هذه البطاريات ؟

- طاقة الوضع الكيميائية



الشكل 5-29

74) منع التناكل بوضوح الشكل 5-29 كيف تم حماية أدبيب الحديد المدفونة من التناكل ،

إذ توصل هذه الأدبيب بطراف أكثر شاططاً بناكل بدلاً من الحديد .

a. حدد الكلنود والأندود .

- الكلنود : الأنبوب الحديد ، والأندود : الماغسيوم  $Mg$  .

b. فسر كيف يحمل الماغسيوم على حماية الأدبيب .

بعد الماغسيوم  $Mg$  أكثر شاططاً ، لذا فهو أكثر عرضة لتفاعل التناكسد والاحتراق ، وهذا ما يسبب تناكل الماغسيوم قبل أدبيب الحديد .

75) التوقع افترض أن العلماء قد اختاروا نصف الخلية  $Cu^{+2}_{(M)} | Cu | H_2O_{(M)}$  على أنها خلية قاسية بدلاً من نصف الخلية  $H_2$  .

فما مقدار جهد طلب الهيدروجين إذا كان طلب النحاس هوطلب القاسي ؟ وكيف يمكن أن تغير العلاقات بين جهود الاحتراق الفيزيائية ؟

- سنتخbir فهم جدول جهود الاحتراق الفيزيائية بمقدار  $V = 0.342$  ، وسيصبح جهد طلب الهيدروجين  $V = 0.342$  .

ولكن تبقى العلاقات دون أن تتغير ، إلا أن فهم الجهد سنتخbir .

76) طبق افترض أن لديك خلية جلافية تكون أحد أصنافها من فلحة من الفصدير محموسة في محلول من أبوات الفصدير II .

a. كيف تعرف من قياس جهد الخلية إذا كانت شريحة الفصدير تمثل الكالود أو الأئود ؟

- بوضع مقاييس فرق الجهد لدفي الالكترونيات من فلحة الفصدير أو إليها .

b. لما يمكن معرفة ما إذا كانت الفلحة تمثل الكالود أم الأئود ، بتأكسد الفصدير إذا كان الجهد موجباً

c. كيف تعرف عن طريق الملاحظة البسيطة ما إذا كانت شريحة الفصدير تمثل الكالود أو الأئود ؟


- بوضع الترسيبات الملحوظة عدد الكالود اختران  $Sn^{+2}$  . وإذا تأكسد  $Sn$  عدد الأئود فسينخفض حجم الفلحة .

77) ضع فرضية لما كان جهد نصف الخلية يتغير بتغير تركيز المتفاعلات والدوائع فإن الجهود الفياسية نفس عدد تركيز  $M$  .

كما ان الحفاظ على ضغط  $atm$  له أهمية خاصة في أصناف الخلايا التي تحتوي على غازات بوصفها متفاعلاً أو دوائعاً .

فمثلاً بعد ضغط الغاز نقطة حرجة في هذه الخلايا ؟

- يُعد الضغط دلالة على التركيز ، لذا فهو يُعد من عوامل التركيز في أصناف الخلايا التي تحتوي على غازات .



الشكل 5-30

78) حل نم اكتشاف وعاء فخاري سنة 1938 م بالقرب من بغداد . وكان هذا الوعاء القديم يحتوي على قضيب من الحديد محاط بأنسطوانة من الدحاس ، كما في الشكل 30-5 . وعدد ملء هذا الوعاء بمحلول موصل كالخل فإنه قد بعمل بطارية .

a. حدد الكالود . b. حدد الأئود .

c. احسب جهد الخلية الفياسي لهذه البطارية .

$$E^0 = -0.447 \text{ V} \quad \text{b. قضيب الحديد}$$

$$E^0 = +0.3419 \text{ V} \quad \text{الحل : a. أنسطوانة الدحاس}$$

$$E_{cell}^0 = +0.3419 \text{ V} - (-0.447 \text{ V}) = +0.789 \quad \text{c.}$$

79) طبق نتائج خلية تحليل كهربائي أخيره البروم وغاز الهيدروجين خلال عملية تحليل كهربائي . وقد ثبت بعد انتهاء التحليل الكهربائي أن الخلية تحتوي على محلول مركز من هيدروكسيد البوتاسيوم . ما محتويات الخلية قبل عملية التحليل الكهربائي ؟



- بروميد البوتاسيوم  $KBrO_2$  ، والماء  $H_2O$  .

80) ضع فرضية افترض أنه في إحدى عمليات الجلفنة نم طلاء الحديد بالدحاس بدلاً من الخارصين ، فهل يمكن للدحاس أن يحمي الحديد من الذ الكل مثل الخارصين ، حتى لو نصعدت طيفه الدحاس ؟ فسر إجابتك .


- إذا نصعد الدحاس نصبح هذه الأماكن معرضة للذ الكل .

ولا يمكن للدحاس أن يحمي الحديد بدلاً من الخارصين ، لأن الحديد بتأكسد بسهولة أكثر من الدحاس ، لذلك ستدفعه الحمامة .

81) تم تركيب بطارية باستعمال القصدير والرئيق ، وكانت أنصاف تفاعلات الاختزال فيها على النحو الآتي :



a. اكتب معادلة موزونة لتفاعل الخلية .





b. ما الذي تأكسد ؟ وما الذي اختزل ؟ حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل .

- اختزل الرئيق  $Hg$  ، في حين تأكسد القصدير  $Sn$  .

العامل المؤكسد : الرئيق  $Hg$  ، والعامل المختزل : القصدير  $Sn$  .

c. ما التفاعل الذي يحدث عند كل من الأنود والكاثود ؟



d. ما جهد الخلية ؟ استخدم الجدول 5-1 .

$$E_{Cell}^0 = +0.851 V - (-0.1375 V) = +0.989 V$$

e. إذا كانت القنطرة تحتوي على محلول كبريتات الصوديوم ، ففي أي اتجاه تتحرك أيونات الكبريتات ؟

- ستتحرّك أيونات الكبريتات نحو اتجاه نصف خلية القصدير .

### مراجعة تراكمية

82) فسر ، لماذا تجد الكرسي المصنوع من الألومنيوم أكثر سخونة من الكرسي المصنوع من الخشب عند

وضع الكرسيين تحت أشعة الشمس الفترة الزمنية نفسها .

- لأن الحرارة النوعية لكرسي المصنوع من الألومنيوم أقل منها للخشب .

83) علام تدل الإشارة السالبة للطاقة الحرة لتفاعل ؟

- تدل الإشارة السالبة على أن التفاعل تلقائي .

84) اعتماداً على نموذج التصادم لتفاعلات الكيميائية ، فسر كيف يمكن لجزيئين أن يتصادما ولا يتفاعلا ؟

- قد لا يكون تصادهما وفق الاتجاه الصحيح ، أو قد لا يتضمن التصادم الطاقة الكافية لتكوين المعدّ النشط .

85) عدد خمسة عوامل تؤثر في سرعة التفاعل .

- طبيعة المواد المتفاعلة ، ومساحة سطح التماس ، ودرجة الحرارة ، والتركيز ، والعوامل المحفزة .

86) يصل تفاعل التفكك  $A_2B \rightarrow 2A + B$  إلى الاتزان عند  $499^\circ C$  ، ويوضح تحلييل خليط الاتزان أن

?  $K_{eq} = [A]^2 [B] / [A_2B] = 1.026 \text{ mol/L} = [B]$  و  $2.045 \text{ mol/L} = [A]$  و  $0.855 \text{ mol/L} = [A_2B]$

$$K_{eq} = \frac{[A]^2 [B]}{[A_2B]} = \frac{(2.045)^2 (1.026)}{(0.855)} = 5.02$$

(87) ما ذائبية يوديد الفضة  $AgI$  بوحدة  $mol/L$  إذا علمت أن قيمة  $K_{SP}$  ل يوديد الفضة تساوي  $3.5 \times 10^{-15}$  ؟  
 الحل :  $s = [Ag^+] = [I^-]$

$$K_{SP} = [Ag^+][I^-] = 3.5 \times 10^{-15} \Rightarrow s^2 = 3.5 \times 10^{-15}$$

$$s = \sqrt{3.5 \times 10^{-15}} = 5.9 \times 10^{-8} mol/l$$

(88) إذا كان لديك محلول من حمض قوي ، فهل يعني ذلك أن لديك محلولاً مركزاً من ذلك الحمض ؟ فسر إجابتك .  
 - ليس بالضرورة ، فالحمض القوي يفكك كلياً في المحلول المائي ، وقد يكون المحلول مخفقاً أو مركزاً ،  
 ويعتمد ذلك على عدد مولات الحمض في المحلول .

(89) ما أعداد التأكسد لكل عنصر في الأيون  $PO_4^{3-}$  ؟  
 - كل أكسجين عدد تأكسده = 2 ، وعدها 4 أي بما مجموعها -8 .  
 عدد تأكسد  $P$  :  $P + 4(-2) = -3 \Rightarrow P + (-8) = -3$   
 $\Rightarrow P = (+8) + (-3) = +5$

### نقويم إضافي الكتابة في الكيمياء

السفن الغارقة كشفت دراسة سفينة التيتانك الغارقة في المحيط مجالاً لاحتمال أن سبب تلف الهيكل الحديد يعود جزئياً إلى وجود بيئات ملائمة للصدأ .

ابحث كيف يؤدي هذا النشاط الحيوي إلى تأكسد الحديد ، واتكتب مقالاً تصف فيه دور المجتمعات الملائمة للصدأ في تدمير التيتانك .  
 - يمكنكم الاطلاع على الموضوع في الرابط الآتي :

<http://archive.arabic.cnn.com/2010/scitech/12/12/metal-eating.titanic/>


(91) العملات المعدنية الأخرى : تتعرض العملات المعدنية الأخرى لعمليات الصدأ الذي ينتج عن تفاعل المعدن مع الأكسجين في وجود الرطوبة وعوامل مساعدة أخرى .

ابحث عن المواد التي صيغت منها العملات المعدنية ، ولماذا تأكلت بصورة سيئة جداً ؟  
 اكتب تقريراً تفسر فيه العمليات الكيميائية التي حدثت وجعلت العملات المعدنية الأخرى تبدو في هذه الصورة .

- ينتج أخطر أنواع التأكل عن خلية كهروكيميائية تحدث طبيعياً ويتضمن هيكلًا حديداً داخلياً يدعم الغلاف النحاسي .

## أسئلة المستنذات

التفاعلات البيولوجية الكهروكيميائية<sup>2</sup> : يتضمن الجدول 2-5 قائم بجهود الاختزال الفياسية لبعض الفاعلات الحيوية المهمة ، وبعد الأكسجين أقوى العوامل المؤكسدة الموجودة في الأنظمة الحيوية . تأمل تأكيد مادة نيكوتين أميد - أدين - شائي النيوكليوئيد (NADH) المخزنة بواسطة جزيء أكسجين ، والـ1ي مكن تمثيله على النحو الآتي :





الجدول 5-2	
E°	القطب
-0.4141	$2\text{H}_{(\text{aq})}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_{2(\text{g})}$
-0.320	$\text{NAD}^+ + \text{H}_{(\text{aq})}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NADH}$
+0.19	$\text{HOOCCH}_3^* + 2\text{H}_{(\text{aq})}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{HOOCCHOHCH}_3^{**}$
+0.769	$\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$
+0.8147	$\text{O}_{2(\text{g})} + 4\text{H}_{(\text{aq})}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$

\*  $\text{HOOCCH}_3$  (حمض البيروفيك)

\*\*  $\text{HOOCCHOHCH}_3$  (حمض اللاكتيك)

92) أكتب نصف التفاعل اللذين يحدثان في هذا التفاعل .



. 5-2 و 5-1 احسب جهد الخلية لهذا التفاعل باستعمال الجداولين . 93

$$E_{\text{Cell}}^0 = 1.229 \text{ V} - (-0.320) = +1.549 \text{ V}$$

94 هل يستطيع  $\text{NAD}^+$  أكسدة  $\text{Fe}^{+3}$  إلى  $\text{Fe}^{+2}$  ؟ فسر إجابتك .

- لا ، فجهد اختزال  $\text{NAD}^+ = -0.320 \text{ V}$

$$E_{\text{Cell}}^0 = -0.320 \text{ V} - (+0.771 \text{ V}) = -1.091 \text{ V}$$

فهو تفاعل غير ثقلي .

## اختبار مفزن

أسئلة الاختيار من متعدد

استخدم الجدول الآتي للإجابة عن الأسئلة من 1 إلى 4 .





جهود الاختزال القياسية لبعض أنصاف الخلايا عند 25°C و 1M	
E° (V)	الاسم
-2.372	$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$
-1.662	$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$
-0.1262	$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$
0.7996	$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$
0.851	$Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg$

(1) أي الأيونات الآتية أسهل اختزالاً ؟



الجواب : **b**

(2) اعتماداً على جهود الاختزال القياسية الموضحة في الجدول ، أي رمز للخلية يمثل خطيته الجلفانية بصورة صحيحة ؟



الجواب : **b**

(3) خلية جلفانية تتكون من قضيب من الماغنيسيوم مغموس في محلول أيونات  $Mg^{+2}$  ، 1 M تركيزه ،

وقضيب من الفضة مغموس في محلول أيونات  $Ag^+$  1 M تركيزه . ما الجهد القياسي لهذه الخلية ؟



الجواب : **b**

$$E_{cell}^0 = +0.7996 V - (-2.372 V) = +3.172 V$$

طريقة الحل :

(4) لو افترضنا توافر الشروط القياسية ، فـأـيـ الـخـلـاـيـاـ الـآـتـيـةـ تـعـطـيـ جـهـدـاـ مـقـارـهـ  $V$  ؟  $2.513 V$  ؟



الجواب : **a**

a.  $[1.662 - (-0.851) = 2.513 V]$  : الحل

b.  $[0 - 0.851 = -0.851 V]$

c.  $[-2.372 - (-1.662) = -0.711 V]$

d.  $[-0.1262 - (0.7996) = -0.9258 V]$

(5) أي العبارات الآتية غير صحيحة ؟

a. البطاريات نماذج مضغوطة من الخلايا الجلفانية .

b. البطاريات الثانوية من بطاريات التخزين .

c. يمكن أن تكون البطاريات من خلية واحدة .

d. تفاعل الأكسدة والاختزال في البطاريات التي يمكن إعادة شحنها تفاعلاً معكوس .

الجواب : **c**

(6) ما الذي تتوقع حدوثه إذا غمرت شريحة من الفضة في محلول مائي يحتوي أيونات  $Cu^{+2}$  ؟

a. عدم حدوث تفاعل b. تأكيد الفضة

c. يترسب النحاس على شريحة الفضة d. اختزال أيونات النحاس .

الجواب : **a**

(7) ما المادة التي تتكون على المهبط عند التحليل الكهربائي لمحلول مائي من  $NaCl$  ؟

a. اليود b. الأكسجين

c. الهيدروجين d. البوتاسيوم

الجواب : **c**

(8) ما الذي يحدث عند وضع قطعة من الخارصين  $Zn$  في محلول  $1.0 M Cu(NO_3)_2$  في محلول  $Zn$  ؟

a. يقل  $[Cu^{+2}]$  b.

c. يزداد  $[NO_3^-]$  d. لا يحدث تغير

الجواب : **a**

## أسئلة الإجابات القصيرة


استعمل الشكل الآتي للإجابة عن الأسئلة من 9 إلى 11 .



9) حدد القطب الموجب والقطب السالب في هذا الجهاز .

- القطب الموجب : النحاس ، القطب السالب : الخارجيين .

10) اكتب نصف تفاعل الأكسدة .



11) اشرح وظيفة القطرة الملحيّة في هذا الجهاز .

- إكمال الدائرة الكهربائية ، ونقل الأيونات .

## أسئلة الإجابات المفتوحة

استعمل الجدول الآتي في الإجابة عن السؤال 12 .

جهود اختزال قياسية عند $25^\circ\text{C}$ و $1\text{atm}$ و تركيز $1\text{M}$	
0.7996	$\text{Ag}^+ + e^- \rightarrow \text{Ag}$
-0.744	$\text{Cr}^{+3} + 3e^- \rightarrow \text{Cr}$

12) إذا وصل قطب فضة بقطب كروم في خلية جلافية فأي القطبين سيتآكسد ، وأيهما سيختزل ، اعتماداً على جهد الاختزال أعلاه ؟ فسر إجابتك .

- جهد تفاعل الفضة القياسي موجب ، في حين يكون جهد الكروم الاختزالي القياسي سالباً أكثر .

لأي قطبين : يعمل القطب الذي له أقل جهد اختزال قياسي في الاتجاه العكسي كما هو موضح في الجدول . في هذه الحالة هو الكروم ، لأنه سوف يفقد إلكترونات و يتآكسد . أما القطب الذي له أكبر جهد اختزال قياسي فسيختزل ، وفي هذه الحالة سيكون قطب الفضة .